

# BOLLETTINO

DEI

## Musei di Zoologia ed Anatomia comparata

della R. Università di Torino

---

---

Numero 677 — Volume XXVIII

---

---

### Escursioni Zoologiche del Dr. Enrico Festa nell'Isola di Rodi.

Dr. BRUNO PARISI

Coadiutore presso il Museo Civ. di Storia Nat. di Milano.

#### DECAPODI.

Il fatto che i Decapodi raccolti dal Dott. E. Festa nell'isola di Rodi, e da lui gentilmente inviati in esame, sono rappresentati da tre sole specie non deve meravigliare, perchè scopo del viaggio era esclusivamente quello di raccogliere materiali per lo studio della fauna terrestre ed in piccola parte anche d'acqua dolce.

Però tutte e tre le specie qui menzionate sono nuove per l'isola ed una, costituendo una nuova varietà, offre un certo interesse anche sistematico.

#### **Maja verrucosa** Milne-Edwards.

*Maja verrucosa* Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. v. I (1834), pag. 328, Pl. 3.

*Maja verrucosa* Heller, Crust. südl. Europ. (1863), p. 50.

*Maja verrucosa* A. Milne-Edw. e E. - L. Bouvier, Expéd. Travailleur et Talisman (1900), p. 127.

Rodi, 1 ♂ adulto, che, compreso il rostro e gli aculei, misura 9,5 cm. di lunghezza su 7.5 di larghezza.

#### **Eriphia spinifrons** (Herbst.)

*Cancer spinifrons* Herbst, Nat. Krabben u. Krebse (1790), v. I, p. 185, Tab. XI, fig. 65.

*Eriphia spinifrons*, Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. v. I (1834), p. 426.

*Eriphia spinifrons*, Heller, Crust. südl. Europ. (1863), p. 75, Taf. II fig. 9.

*Eriphia spinifrons* Ortmann, Zool. Jahrb. Abth. Syst. v. 7 (1894), p. 479.

Rodi, 1 ♂.

**Potamon (Potamon) edulis** Latr. var. **rhodia** n. var.

Koskino, 1 ♂ e ♀.

Kattabia, numerosi esemplari.

Aghios Isidoros, numerosi esemplari.

Dal confronto di questi Potamonidi dell'Isola di Rodi con una ricca serie di *P. edulis* dell'Italia, risulta che pur concordando nell'aspetto generale hanno delle caratteristiche proprie che permettono di farne una varietà ben distinta.

Il loro carapace è superiormente più piano e più largo: il rapporto fra la sua larghezza massima e la lunghezza è di 1 : 0.77-0.79, mentre in quelli nostrani è di 1 : 0.85-0.87. La larghezza epibranchiale nei giovani è superiore alla lunghezza, negli adulti è pressochè eguale.

La porzione protogastrica della cresta postfrontale è molto marcata, tagliante e debolmente incisa dalla sutura cervicale, ch'è poco pronunciata.

Il bordo frontale è più incurvato in basso e maggiormente concavo nel mezzo.

I fianchi del carapace sono rigonfi e regolarmente arcuati fino al suo margine inferiore, mentre nel *P. edulis* al di sotto della sutura epimerale si ripiegano in dentro in modo da formare una specie di canale.

Le parti infero-anteriori del corpo sono meno rugose, o bitorzolute ed altrettanto dicesi dei chelipedi e specialmente della faccia esterna del braccio e di quella inferiore ed interna della mano.

*Dimensioni in mm.*

	♂	♂	♂	♀	♂
Lunghezza	53	50	40.6	38	35.4
Larghezza massima	68	63	52	48.5	45.7
Larghezza epibr.	51.6	50	41	38	37.5
Rapp. fra la largh. e la lungh.	1:0.77	1:0.79	1:0.78	1:0.78	1:0.77
Lungh. VI seg. add.	7.3	6.7	6.1	—	5.5
Largh. distale VI seg. add.	11	10.8	8.5	—	7.6

---

Publicato il 21 Novembre 1913

Prof. LORENZO CAMERANO, *Direttore responsabile*

2602 Tip Gerbone. Torino