This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



https://books.google.com





Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги — это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

#### Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы — лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них — это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

#### О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу http://books.google.com.



ol. Tressfer

# 300ЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ.

e to a to a constant of the co

# СПУТЕШЕСТВІЕ,

07

зоологическою цълью,

R'B

## Съверному берегу чернаго моря и въ крымъ,

ВЪ 4858 ГОДУ

De e Vingeren hopake.

Написаль

К. Кесслеръ.

KIEB'b.

Въ Университетской Тепографіе. 1860.

Digitized by Google

По опредълению Совъта Императорскаго Университета Св. Владимира
19 Августа 1860 года печатать позвужиется.

Ректоръ Университета Н. Бунке.



#### BCTYNAEHIE.

Занимаясь въ теченіе последнихъ пяти леть изследованіемъ рыбъ, которыя встрвчаются въ водахъ, принадлежащихъ къ бассейнамъ Дивира, Буга и Дивстра, я усивлъ собрать относительно ихъ довольно интересныя и богатыя свёдёнія, публикованныя мною частью въ фаунъ губерній Кієвскаго Учебнаго Округа, частью въ Бюлетенъ Московскаго Общества испытателей природы. Свъдънія эти однаво все еще оставались не совершенио полными, потому что я не имълъ возможности распространить свои разысканія до устьевъ означенныхъ ръкъ, тогда какъ устья ръкъ имъютъ въ ихтіологіи важное значеніе. Съ одной стороны существують рыбы, которыя предпочтительно придерживаются рачных устьевъ, или даже исключительно въ нихъ имъютъ свое пребываніе, а съ другой стороны рвчныя устья чрезвычайно важны для производства наблюденій надъ періодическими передвиженіями рыбъ, вверхъ и внизъ по ръкамъ, въ особенности тъхъ изъ нихъ, которыя для метанія икры возврания и потомъ опять изъ ръкъ возврания и потомъ опять изъ ръкъ возврания щаются въ море. Въ слъдствіе того я и приняль намъреніе воспользоваться первымъ удобнымъ случаемъ для посъщенія и изученія устьевъ Дивпра, Буга и Дивстра, чтобы такимъ образомъ пополнить и довершить прежнія свои изследованія о рыбахъ этихъ ръкъ.

Кромъ того мнъ хотълось давно уже ближе ознакомиться съ рыбами Чернаго моря и добыть экземпляры всёхъ видовъ ихъ для Зоодогическаго собранія Университета Св. Владиміра. Черное море въ древнія времена славилось обиліемъ разной рыбы, и рыбная промышленность процевтала въ Греческихъ и Римскихъ колоніяхъ, пасположенныхъ по его берегамъ, а между тъмъ извъстія, полученныя нами въ новъйшее время о рыбахъ и рыболовствъ Чернаго моря, весьма малочисленны и неполны. Въ сочиненияхъ Палласа. 1 Эйхвальда, 2 Ратке в и Нордмана в описаны конечно. болве или менве подробно, рыбы, которыя были наблюдаемы ими въ Черномъ моръ, но свъдънія, сообщаемыя этими естествоиспытателями объ образъ жизни и распространеніи черноморскихъ рыбъ. а также о способахъ для довли ихъ, чрезвычайно скудны и (въ чемъ я уже прежде имълъ случай убъдиться) отчасти даже не Знаменитый археологъ Кэлеръ въ 1832 году издалъ исторію рыболовства при сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, но его разысканія имъють болье значенія въ отношеніи историкофилологическомъ, нежели естественно-историческомъ, служатъ болве для возбужденія любопытства, нежели для удовлетворенія ему. Поэтому во мив родилось желаніе заняться подробнымъ изследованіемъ рыбъ и рыболовства, на первый разъ хоть той части Чернаго моря, которая въ видъ широкаго залива простирается отъ

Pallas, P. Zoographia rosso-asiatica T. III. 1831.

Pallas, P. Reisen in die südlichen Provinzen des russischen Reiches, in den Jahren 1793 und 1794.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eichwald, E. Zoologia specialis T. III. 1831

Eichwald, E. Fauna Caspio-caucasica (Nouveaux Mémoires de la société des Naturalistes de Moscou T. VII. 1841).

Rathke, H. Ein Beitrag zur Fauna der Krym (Mémoires presentés à l'Academic des sciences de St. Petersbourg par divers savans.T. III. 1837).

<sup>4</sup> Nordmann. Observations sur la Faune pontique (Voyage dans la Russie meridionale par A. Demidoff, T. III. 1840).

<sup>5</sup> Koehler. Tarichos ou Recherches sur l'histoire et les antiquités des pêcheries de la Russie méridionale (Mémoires de l'Academie des sciences de St. Petersbourg. VI serie. T. I. 1832).

южнаго берега Бессарабіи и Херсонской губерніи до западныхъ береговъ Таврическаго полуострова. Въ этотъ заливъ изливаются также Днъпръ, Бугъ и Днъстръ, и потому точное узученіе его было для меня особенно интересно, такъ какъ оно могло мнъ послужить къ върнъйшему разръшенію разныхъ трудныхъ вопросовъ касательно ихтіологическихъ отношеній означенныхъ ръкъ.

Въ 1858 году наконецъ мив представилась возможность удвить ивсколько мъсяцевъ на путешествіе къ устьямъ Дивстра, Буга, Дивпра, и къ западнымъ берегамъ Крыма, для производства предположенныхъ мною ихтіологическихъ изслъдованій. Составленный мною для этой цъли планъ удостоился одобренія Совъта Университета, который вмъстъ съ тъмъ, по моей просьбъ, прикомандировалъ ко миъ, въ помощь при моихъ занятіяхъ, студента разряда естественныхъ наукъ, Константина Ельскаго.

Само собою разумѣется, что я предполагалъ, въ теченіе путешествія, не ограничиться одними только ихтіологическими изслѣдованіями, но также предполагалъ производить и другія зоологическія наблюденія и разысканія, какія окажутся возможными и полезными, и кромѣ того приложить всѣ старанія къ собиранію всякихъ
животныхъ, для пополненія зоологич скаго кабинета Университета.
Отчетъ мой покажетъ, въ какой степени я успѣлъ исполнить свои
предположенія; но считаю нужнымъ замѣтить, что я представляю
отчетъ такъ поздно именно потому, что коллекціи, мною привезенныя, по своей значительности, требовали продолжительнаго времени для разбора ихъ и приведенія въ должный порядокъ.

#### часть первая.

Путенисствіе вдоль севернаго берега Чернаго моря, къ устыямъ Дябстра, Буга и Дябпра.

#### 1. Бълая церковь.

Мы выбхали изъ Кіева утромъ 18-го Іюня, и въ тотъ ке день после обеда прибыли въ местечко Белую церковь, где решились на одинъ день остановиться, какъ для того, чтобы осмотреть Александрію — знаменитый садъ Графовъ Браницкихъ, такъ и для того, чтобы собрать некоторыя справки касательно рыбъ, которыя водятся въ речке Роси, протекающей чрезъ Белую церковь.

Дорога отъ города Василькова до самой Бълой церкви пролегаетъ степью, гдв мив частенько случалось, въ прежніе мои провзды по этому пути, любоваться пятнистыми сусликами (Spermophilus guttatus Temm.), которые быстро перебъгали чрезъ дорогу, или сидъли на заднихъ лашкахъ по окраинамъ ея, готовясь въ случав опасности стремглавъ броситься въ свои норы. На сей разъ однако вовсе не было видно этихъ игривыхъ грызуновъ, которые такъ часто являются злайшими врагами нашего степнаго хозяйства.

Въ Бълой церкви намъ сдълалъ самый радушный пріемъ тамошній Аптекарь Г. Піотровскій, который уже прежде былъ мнъ

извъстенъ какъ мобитель естественныхъ наукъ, и неоднократно сосбидаль инъ свои наблюденія надъ перелетомъ птицъ. У него мы видъли косматую цаплю (Ardea comata l'all.), которая была имъ убите 15 Мая при верховью одного пруда въ окрестностяхъ Бълой церкни. Косматая цапля во множествю водится при устьяхъ Дивстра и Дивпра, но весьма редко попадается далье къ съверу, такъ, что мню никогда еще не случалось ее встречать около Кіева. По свидътельству Г. Піотровскаго птицъ этихъ было 9 штукъ, изъ которыхъ 7 постоянно летали вместе, составляли какъ бы одно стадо. Фактъ этотъ также довольно замечателенъ, потому что мосматая цапля держится обыкновенно по одиночкю или попарно, не любить соединяться стадомъ.

Рось ръчка довольно значительная, береть свое начало въ гранитной полосъ Кіевской губерніи и вливается въ Дивпръ не много ниже города Канева. Въ самой Бълой церкви по берегамъ Роси выступають сплошныя массы грашита, такъ что мъстечко это, въ южномъ направленія, составляеть ближайшій отъ Кіева пункть, на которомъ обнаруживается существование гранитной полосы. Я уже въ прежнія свои поъздки по Кіевской губерніи успъль собрать свъдънія о рыбахъ, которыя водятся въ Роси, или въ нее заходять, но желаль воспользоваться новымъ случаемъ для пополненія своихъ замътокъ. По приглашенію Г. Піотровскаго явился ко мить одинъ рыбакъ, который уже въ теченіи многихъ леть занимелся довлею рыбы въ Березовскомъ ставъ, находящемся на притокъ Роси, и также въ самой Роси; онъ мив назвалъ около тридцати породъ рыбъ, которыя попадаются или въ ставъ, или въ рвчкв. Между показаніями его следующія заслуживають особаго упоминенія: а) въ Роси, въ недальнемъ разстояніи отъ Бълой цериви, ивсколько деть тому навадь, была поймана бълуга (Асіpenser huse L.) въ 5 пудовъ въсомъ; b) подустъ (Chondrostoma првиз 4.) называется здёсь жесть (каковое название по Дийстру употребляется для означенія бълизны (Aspius rapax Ag.) с) очень прумныя щуки — называются березовками, потому что нерестятся поздные малыхы щукы, вы ту пору, когда изы березы сокы течеты; d) народъ (Cypriaus garpio L.) въ Роси доходитъ въсомъ до одного

пуда и трется около дня Св. Николая (9 Мая); е) авдюшка (Cobitis barbatula L.) именуется лежень или леженокъ, потому что держится постоянно на днъ воды, лежитъ въ подводной тинъ.

Вздили мы также въ сопровождени Г. Піотровскаго осматривать місто, около самой Кіевской дороги, гді незадолго предъ тимъ было отрыто нъсколько маммонтовыхъ костей и зубовъ, и гдъ таковыхъ еще оставалось значительное число, какъ намъ гово-По описанію, намъ сдъланному, можно было думать, что въ означенномъ мъстъ лежитъ одинъ цъльный остовъ маммонта, который въ такомъ случав стоило сполна выкопать. Вышло однако Маммонтовыя кости находились въ красной песчанной глинъ, приблизительно на глубинъ двухъ саженей, но были разбросаны неправильно, и перемъщаны съ костями нъкоторыхъ другихъ ископаемыхъ животныхъ; а поэтому мы пожальли времени и денегъ для производства дальнъйшей раскопки. Замътимъ только, что вырытые въ Бълой церкви коренные зубы маммонта отличались необыкновенно узкою, нъсколько изогнутою формою и очень правильнымъ дъленіемъ эмалеваго края отдъльныхъ ихъ пластинокъ на три допасти.

#### 2. Вознесенскъ.

Изъ Бълой церкви мы отправились въ дальнъйшій путь подъ вечеръ 19-го Іюня, имъли на двухъ станціяхъ Херсонской губерній обычную задержку отъ недостатка лошадей и прівхали такимъ образомъ въ Вознесенскъ только утромъ 22-го числа.

Путешествіе по Херсонской губерніи чрезвычайно скучно и утомительно. Въ Кієвской губерніи конечно уже встрічаются обширныя поля и степи, но все же оні везді пересінаются и опоясываются рощами и лісами, которые привлекають и развлекають глазь путешественника; холмистый Звенигородскій утіздь даже представляеть очень красивые и живописные виды. Совсімь другое въ Херсонской губерніи: тамь чистая степь растилается неоглядно во всі стороны и развіт только голые курганы могуть остановить

на себъ блуждающій взоръ. Правда, что въ настоящее время уже значительная часть этой степи взборозджена плугомъ и засъяна хлъбами, но все же она является однообразною и безжизненною, тьмъболье, что всъ селенія расположены близко подлъ ручьевъ, вьющихся по глубокимъ балкамъ, и такимъ образомъ совершенно скрываются отъ глазъ. Исключеніе мъстами составляютъ деревни военныхъ поселеній, которыя, ради возможности правильной постройки ихъ, бываютъ болье или менье далеко выдвинуты въ степь; но эти длинные, прямые ряды одноформенныхъ домиковъ, безъ садовъ и огородовъ, обдаютъ какимъ-то холодомъ и уныніемъ.

Въ Херсонскихъ степяхъ, въ особенности начиная отъ станціи Песчанаго брода, намъ уже частенько стали попадаться суслики, а нъсколько далъе, именно отъ станціи Благодатной (подъ 48° широты) также короткопалые жаворонки (Alauda brachydactyla Leisl.). Короткопалый жаворонокъ довольно похожъ на жаворонка полеваго, но меньше ростомъ, и отличается отъ него обычаями; онъ любитъ стадиться, и, подобно степному жаворонку (Alauda calandra L.) охотно держится по столбовымъ дорогамъ. Въ Кіевской губерніи мнъ никогда еще не случалось встръчать короткопалаго жаворонка.

Военный городъ Вознесенскъ, съ широкими прямыми улицами и большимъ садомъ по серединъ, раскинутъ на лъвомъ, плоскомъ берегу Буга, въ томъ мъстъ, гдъ въ него впадаетъ ръчка Мертвоводъ. По причинъ сильнаго разлива Буга въ весеннее время, городъ отдвинутъ отъ него слишкомъ на двъ версты, такъ что между нимъ и ръкою лътомъ остается широкая, песчанная низменность. Самый Бугъ, когда совершенно уйдетъ въ свои берега, весьма незначителенъ, имъетъ въ ширину едва ли больше 40 сажень, но впрочемъ течетъ довольно быстро. На правомъ высокомъ берегу его выступаетъ наружу гранитъ.

Тотчасъ по прівздв въ Вознесенскъ мы принялись хлопотать о томъ, чтобы къ намъ былъ приглашенъ хорошій, надежный рыбакъ. Какъ одного изъ опытнійшихъ рыбаковъ назвали намъ Семена Тударашка, который и явился къ намъ въ тоже утро. Свідівнія, которыя мы отъ него получили, касательно рыбъ Буга и различныхъ обстоятельствъ ихъ ловли, оказались однако весьма непол-

ными и неудовлетворительными. Онъ очевидно почему то боялся нашихъ распросовъ, и не смотря на наши увъренія, что мы собираемъ справки изъ одной любознательности, старался только носкоръе отъ насъ отдълаться.

Изъ показаній Тударашка во всякомъ случай выходило, что рыбная ловля бываеть нісколько значительна подъ Возмесенскомъ только весною, когда Бугъ начинаетъ разливаться отъ прибывающей воды, и вмісті съ тімъ, для метанія икры, приходить въ движеніе рыба. Тогда изъ димана подходять къ Вознесенску коропъ, шаранъ, тарань, вырезубъ, білизна, синецъ, клепецъ, рыбецъ, лещь, чеконъ, шамая (скубрія), селедка, которыя въ другое время бывають очень рідки, или совсімъ исчезають. Послів Понрова, какъ выражался Тударашко, и на лекарство рыбы не сыщешь. Щука въ Бугів рідка, попадаеть туда лишь случайно изъ его притоковъ; сепретъ (Lucioperca volgensis) также составляеть різдкость, и потому его не уміноть и отличить хорошенько оть судака.

По причинъ малой ширины Буга неводы употребляются небольшіе, отъ 70 до 90 сажень длиною, или еще короче. Для ловли рыбца по преимуществу служить плавная съть.

Такъ какъ мы интерессовались также бычками и другими мелкими рыбками, о которыхъ Тударашко, какъ рыбакъ, занимающійся довлею крупной рыбы, намъ почти ничего не могъ сообщить, то мы отправились послъ объда на берегъ Буга и на Мертвоводъ. чтобы поискать удильщиковъ или бреденьщиковъ, отъ которыхъ надвались получить въ этомъ отношении болве точныя сведения. На самомъ Бугъ мы нашли одного только удильщика, который сверкъ того оказался мало сообщительнымъ и никакой рыбки не успъть еще выудить, но счастливъе были на Мертвоводъ, гдъ застали двухъ женщинъ, ловившихъ рыбу небольшимъ густымъ волокомъ. У нехъ было наловлено значительное количество разной мелкой рыбы, такъ что онъ уже собирались прекратить ловлю, но по нашему желанію ее продолжали и потомъ согласились съ волокомъ своимъ перейти на Бугъ, и тамъ также сдълать нъсколько заходовъ. Это было важно для насъ въ томъ отношения, что дно Мертвовода чрезвычайно тинистое, тогда напъ Бугъ имветь дно болже песчанное,

и мы такимъ образомъ могли ознакомиться съ мелкою рыбою изъ двухъ разнородныхъ мъстностей.

Главную массу пойманной рыбы составляль бычки, которыхъ при внимательномъ пересмотръ оказалось 6 видовъ, а именно: Gobius marmoratus Pall., Gobius fluviatilis Pall., Gobius melanostomus Pall., Gobius gymnotrachelus Kessl., Gobius platycephalus Kessl. и Gobius batrachocephalus Pall. Кромъ того тутъ было довольно много горчаковъ (Rhodeus amarus Bl.), верховодовъ (Alburnus lucidus Heckel), молодыхъ селедовъ (Clupea pontica Eichw.), тюлевъ (Alosa cultiventris Nordm.), нъсколько штукъ выюновъ (Cobitis fossilis L.), щинововъ (Cobitis taenia L.) и морскихъ иголъ (Syngnathus bucculentus Rathke).

И такъ добыча наша вышла очень интересною, въ особенности мы были удивлены тъмъ, что нашли подъ Вознесенскомъ морскихъ иголъ. Иглы считаются обыкновенно рыбами чисто морскими, и - нигдъ намъ не случалось встръчать показанія, чтобы онъ вдавались также въ ръки.

Вознесенскъ же ръкою отстоить отъ Николаева, т. е. отъ верховья лимана, приблизительно на 90 версть, и вода туть, какъ въ Вугь, такъ и въ Мертвоводъ совершенно пръсная. Пухлощекая игла, Syngnathus bucculentus, въ первый разъ была описана Ратке, отврывшимъ ее при западныхъ берегахъ Крыма, и потомъ была находима въ другихъ частяхъ Чернаго моря Нордманомъ.

Выходить такимъ образомъ, что она имъетъ общирное распространеніе и принадлежить къ числу рыбъ, способныхъ жить и въ соленой водъ и въ пръсной, чъмъ и отличается отъ другихъ видовъ иголъ. Всъ добытыя нами въ Вознесенскъ недълимыя были молодыя, въроятно отъ предшествующиго года, и имъли въ длину не много болъе трехъ дюймовъ, но говорили намъ, что попадаются и вдвое длиннъйшія. Женщины, намъ ихъ доставившія, называли ихъ вворлучами.

Между бычками въ особенности были изобильны Gobius platycephalus, Gobius gymnotrachelus и Gobius fluviatilis, изъ которыхъ последній почти исключительно только попадался въ Буге. Все эти три вида вполив относятся къ рыбамъ речнымъ, до сихъ поръ по крайней мере не были еще наблюдаемы въ море. Gobius торый между всеми бычками Чернаго моря достигаеть наибольшаго роста и называется въ Одессъ киутъ, намъ попался только одинъ, намъ небольшой, но все же онъ послужить намъ доказательствомъ тому, что и этотъ видъ не чисто-морской, канимъ его до сихъ поръ считали.

Очень любопытно также намъ было встратить подъ Вознесенскомъ тюлекъ. Тюлька есть маленькая селедка, которая въ первый разъ описана Нордманомъ и очень изобильно ловится въ лимана Буга; но вовсе неизрастно было, чтобы она поднималась и выше по этой ракъ.

Горчакъ въ Вознесенска называется пукасомъ, подобно вакъ во всей Полтавской губерніи; онъ весьма обиленъ въ тихой водъ Мертвовода. Кстати я разскажу здёсь объодномъ замёчательномъ явленіи въ жизни этой маленькой рыбки, которое неоднократно было мною наблюдаемо, но требуеть еще дальныйшихъ разысканій для полнаго его разъясненія. Діло въ томъ, что у горчака развитіе икры не идеть равном'врно во всей массв, какь у другихь рыбъ, а одни зерна-или правильнъе янчки развиваются быстръе, другія медлениве. Такимъ образомъ весною, во время нереста, каждый янчникъ, на подобіе того какъ у птицъ, получаеть форму грозда, составленнаго изъ ягодокъ весьма различной величины; когла одни янчки имъють въ діаметръ уже до 1-й линіи, другія бывають еще такъ малы, что едва могуть быть усмотрыны простымъ глазомъ. Изъ этого очевидно надобно заключить, что горчакъ не мечеть всей икры сразу, а выпускаеть янчки въ разныя времена, постепенно, съзначительными промежутками, и что поэтому нересть его долго должень продолжаться; и въ самомъ деле мне сдучалось находить у него спалыя янчки, начиная отъ половины Апрыля до первыхъ чисель Іюня. Кромы того горчакъ, по всей

въроятности не выпускаеть явчекъ въ воду безразлично, а заботится о помъщени ихъ въ особыя изста, наиболье благопріятныя для дальнъйшаго, безопаснаго ихъ развитія; по крайней міръ такимъ образомъ, какъ мнв кажется, легче всего можно объяснить назначеніе особой вившней яйцепроводной трубочки, которая существуеть у всвиь женских недвимых во продолжение нереста. Трубочка эта выставляется наружу позади задняго прохода, имветь цилиндрическую форму и содержить спиральныя поперечныя силадин, позволяющія ей попеременно удлиняться и укорачиваться; въ свернутомъ виде она бываетъ длиною отъ 3-хъ до 4-хъ линій. Нанонець еще любопытный факть, по отношеню къ горчаку, заключается въ томъ, что женскія недвиямыя значительно уступають въ величинъ мужескимъ, тогда какъ между другими рыбами обыкновенно самки бывають росле самцовь. Мужескіе горчаки въ продолженін всей весны чрезвычайно красивы; блестящіе, радужные - прета перемежаются продольными полосами на широкомъ ихъ теле, большое ярко-красное пятно занимаеть почти весь заднепроходній - плавникъ, до черной его каймы. Довольно странно, что всв горчаки, добытые нами въ Вознесенскъ, были исплючительно мужескіе, и притомъ находились еще въ полной красъ, какъ во время нереста. Можеть быть, что и въ самомъ дълв еще продолжался нересть, но недостатовъ въ женскихъ неделимыхъ не позволелъ намъ окончательно въ томъ убъдиться.

Изъ интересныхъ птицъ были замъчены нами на лугу, между городомъ и Бугомъ, черноголовыя желтыя трясогузки, которыя тамъ находились въ довольно значительномъ числѣ. По всей въроятности онъ относились къ той разности, которая описана Лихтенштейномъ подъ названіемъ Motacilla melanocephala ', и Крыницкимъ подъ названіемъ М. Kaleniczenkii 2, но такъ какъ мы не имѣли съ собою ружья, то и не могли ни одной убить, чтобы удостовъриться въ справедливости нашего предположенія.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eversmann, Reise nach Buchara. Anhang. p. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou. T. XII. p. 239.

### 3. Одесса.

Мы вывхали изъ Вознесенска утромъ 23 Іюня и къ вечеру того же дня прибыли въ Одессу, гдв предполагали провести отъ 10 до 14 дней.

Одесса, не смотря на короткое время ея существованія, успіла сділаться однимь изъ самыхъ населенныхъ и оживленныхъ Русскихъ городовъ. Быстрому развитію ея конечно много содійствовали разныя случайныя обстоятельства и искуственныя правительственныя мізры, но все же главная причина этого явленія заключается въ благопріятныхъ условіяхъ естественныхъ: съ одной стороны она составляетъ природный торговый центръ той плодородной степи, которая растилается между Прутомъ и Дибпромъ, съ другой стороны находится почти какъ разъ въ серединъ большаго съверозападнаго залива Чернаго моря. Возникновеніе Одессы, можно сказать, сділалось необходимостью, какъ скоро только покореніе Крымскихъ Татаръ и оттісненіе Турокъ за Дунай доставили нужное спокойствіе Новороссійскому краю и позволили ему употребить въ діло производительныя силы своей дівственной почвы.

Физигномія Одессы во многих отношеніях трезвычайно интересна. Почти весь городъ расположент на довольно ровной площади, которая возвышается надъ уровнемъ моря безъ малаго на 100 футовъ. Всё дома построены изътого мягкаго, легко распилимаго, третичнаго известняка, который образуетъ высокій морской берегъ, и служитъ основою всей смежной степи. Часть города, ближайшая къ пристани, обстроена отлично, и имъетъ характеръ совершенно Европейскій. Невольно однако поражаетъ новопріважаго то обстоятельство, что здёсь, гдё тёснятся блистательные магазины и общирныя гостиницы, гдё кипитъ шумная жизнь портоваго гогода, многія великолізиныя зданія лишены всёхъ вывісокъ и стоятъ въ какомъ то запустёній; а между тёмъ эти то необитаемыя зданія и содержать въ себё главное богатство Одессы, бывають снизу до верху насыпаны пшеницею. Другія части города въ красотів

далеко уступають первой; съ удаленіемъ оть гавани дома постепенно уменьшаются въ величинъ и ръдъють, а улицы и площади все болъе и болье расширяются, какъ бы принаравливаясь въ просторной степи, въ которую открываются. - Пойдете вы на набережную, и предъ вами откроется общирная пристань, полная судовъ, и далве неоглядное море, съ мелькающими по немъ бъльни парусали и съ стоящими надъ нимъ длинными полосами дыма, которыми обозначаются пути пароходовъ; выйдете вы за одну изъ заставъ и вамъ представится необозримая степь съ безконечными, завернутыми въ пыль обозами, которыя приходять съ пиленицею, часто изъ-за многихъ сотень версть. Эти обозы составляють впрочемъ очень непріятную черту въ публичномъ бытв Одессы; они загромождають нередко лучшія улицы, разбивають и портять мягкую мостовую и увеличивають вдкую, известковую пыль, безъ того уже сильную. Мальйшій дождикъ конечно увичтожаеть пыль, но за то обращаеть ее въ самую скверную слякоть. Народонаселеніе Одессы самое пестрое, самое разноплеменное; вы туть встретите представителей всехь націй Европы и западной Азін, услышите всякіе языки и нарічія. Главную массу рабочаго власса составляють Великороссы и Малороссы, Молдоване и Татары, между купцами въ особенности много Евреевъ и Грековъ, Итальянцевъ и Армянъ.

Публичная жизнь въ Одессъ болье развита, нежели въ другихъ мив знакомыхъ городахъ Россіи; притомъ-же здъсь формен ные наряды военные и гражданскіе, менье выступаютъ на лицо, теряются въ массъ другихъ разнообразныхъ костюмовъ, и потому общественная жизнь не имъетъ того ръзкаго оффиціальнаго оттънка, какъ въ другихъ Русскихъ городахъ, болье дышетъ просторомъ и свободою.

Одесса вовсе не имъетъ ръки, и потому должна довольствоваться водою колодезною и ключевою. Самый богатый ключъ, посредствомъ трубъ снабжающій городъ водою, находится отъ него въ разстояніи 12 верстъ къ югу, около самаго морскаго берега; онъ называется большимъ фонтаномъ. Стоящія въ гавани суда получають воду изъдругаго, болье близкаго ключа, именуе-

маго малымъ фонтаномъ. Кромъ того во всемъ городъ весьмъ тщательно собирается дождевая вода, и для этой цъли на дворъ каждаго дома бываетъ устроена цистерна, въ которую сходится всъ водосточныя трубы съ крыни дома.

Для Ихтіолога, который желаеть ознакомиться съ рыбами Чернаго моря и ръкъ, въ него впадающихъ, Одесскій рыбиый базаръ заслуживаетъ особеннаго вниманія. На Одесскій базаръ привозять рыбу не только съ окрестнаго побережья Чернаго моря, но также отъ устьевъ Дивстра, Буга, Дивпра, и съ близкихъ соленыхъ озеръ, или лимановъ; а въ следствие того, почти во всякое время года, онъ бываетъ обильно обставленъ самою разнообразною рыбою. Чельзя только бываеть найти здёсь, за весьма рёдкимъ исключеніемъ, такихъ рыбъ, которыя или по незначительной своей величинъ, или по другимъ причинамъ не употребляются въ пищу, каковы напримъръ колюшки (Gasterosteus), иглы (Syngnathus), скаты, акулы. Для полученія полныхъ схеденій о всехъ рыбахъ, которыя встрачаются при саверномъ берега Чернаго моря, нельзя стало быть ограничиться посъщениемъ одного рыбнаго базара, а следуеть также бывать на самыхъ рыбныхъ заводахъ и присутствовать при вытаскивании неводовъ и другихъ снастей, употребляемыхъ для ловли рыбъ.

Ловля рыбы по съверному берегу Чернаго моря производится вообще слъдующими снастями: 1) неводами; 2) мережами; 3) подъемными сътями; 4) самоловами; 5) удочками.

Неводы бывають очень различной величины, имъють въ длину отъ 200 до 1500, а въ вышину отъ 2 до 4 сажень. Ими ловится почти всякая рыба, но они могутъ быть употребляемы въ дъло только тамъ, гдъ берегъ отлогій, песчаный. Подобный берегъ находится на съверной сторонъ Одессы, на такъ называемой Пересыпи, и тамъ дъйствительно расположенъ цълый рядъ неводныхъ рыбныхъ заводовъ, т. е. куреней, служащихъ для жительства рыба-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Я имълъ случай нъсколько ознакомиться съ Одесскимъ рыбнымъ базаромъ еще въ 1856 году, и помъстилъ статью о немъ въ Въстникъ Естественныхъ наукъ за 1857 годъ.

намъ и снабженныхъ всеми принадлежностями для ловди рыбы меводами. При каждомъ заводе устроена вышка, т. е. врыть въ землю, въ несколько наклонномъ положеніи, высокій деревянный столбъ, съ поперечными ступеньками и съ сиденіемъ на верху. На вышкахъ этихъ днемъ почти постоянно сидятъ сторожевые рыбаки и зоркимъ глазомъ осматриваютъ море; какъ скоро они заметятъ подходящее къ берегу стадо скомбріи, то тотчасъ подаютъ товарищамъ условный знакъ, чтобы те успеди заблаговременно набрать и закинуть неводъ. Замечательно, что подобныя вышки находились въ употребленіи уже у древнихъ Грековъ, у к эторыхъ оне назывались ихтіоскопами или тиноскопами (Thynoscopus).

Къ югу отъ Одессы берегь, на значительномъ протяжении, тажъ крутъ и скалистъ, что недопускаетъ употребления неводовъ, а потому и рыбные заводы въ этомъ направлении начинаются только за Люстдорфомъ.

Мережа есть съть, состоящая изъ очень крупныхъ петлей или очковъ (содержащихъ въ поперечникъ до ¼ аршина). Она дълается изъ кръпкихъ бичевокъ, имъетъ въ длину болъе 100 сажень, а въ ширину до 1-й сажени. Посредствомъ привязанныхъ къ ней грузилъ съть эта разставляется по дну моря, и оставляется тамъ въ течени нъсколькихъ дней, или даже цълой недъли. Зацъпляются въ ней почти исключительно только крупныя камбалы и скаты. Значительная ловля камбалъ мережами производится въ немногихъ верстахъ къ югу отъ Одессы, около малаго фонтана.

Подъемныя свти двлаются изъ очень густой ткани и представляють собою какъ бы исполинскіе саки или хватки. Онв бывають четыреугольныя или круглыя и, помощію блоковъ и воротовъ, утвержденныхъ на берегу, погружаются на дно воды, въ горизонтальномъ положеніи; но оставляются тамъ не долго, обыкновенно не болве 10 или 15 минутъ, и потомъ опять быстро изъ воды вытягиваются, или върнъе сказать, приподымаются. Нъсколько такихъ подъемныхъ свтей находятся на самой Одесской пристани и служатъ для ловли разной мелкой рыбы, въ особенности атеринокъ, тюлекъ, сарделекъ, барбулекъ и бланкетовъ.

Самодовами называются большіе жельзные крючки, посред-

ствомъ връпкихъ поводковъ привязанные къ толстой веревив—требмилл. Называются подобные крючки самоловами потому, что употребляются въ дъло безъ всякой насадки; крупныя рыбы, въ
особенности осетры и севрюги подходятъ къ крючкамъ, въроятно
изъ любопытства, трутся около нихъ и такимъ образомъ зацъплиются за нихъ различными частями тъла. Такъ какъ многія
рыбы повреждаются крючками, получаютъ глубовія раны, но тъмъ
не менъе съ нихъ срываются, то, сколько мнъ извъстно, закономъ
воспрещается употребленіе самолововъ на ръкахъ, а дозволяется
только въ открытомъ моръ. Рыбные заводы, на которыхъ главною снастью служатъ самоловы, именуются крючковыми. Около
самой Одессы такихъ заводовъ нътъ, но находятся крючковые
заводы подлъ устьевъ Дивстра и Дивпра, гдъ по преимуществу
и держится красная рыба.

Ловля рыбы удочками весьма развита въ Одессъ и ея окрестностяхъ; ежедневно можно встрътить многочисленныхъ удильщиковъ какъ на самой пристани, такъ и на скалистомъ морскомъ берегу къ югу отъ города. Удочками ловятся по пренмуществу разныхъ видовъ бычки, а также скомбрія, глосса и нѣкоторыя другія рыбы. Насадкою или наживкою на удочки главнымъ образомъ служатъ морскіе рачки (изъ родовъ Crangon и Palaemon) и разныя мелкія рыбки, какъ напримъръ атеринки и сардельки.

Съ самаго прівзда въ Одессу мы стали ежедневно, рано утромъ, посвіщать рыбный базаръ, тщательно пересматривали привозимую туда рыбу, и выбирали ту, которая казалась намъ, въ какомъ нибудь отношеніи, интересною, заслуживающею ближайшаго изследованія. Кромѣ того почти ежедневно мы бывали на пристани, чтобы видёть добычу удильщиковъ и хозяевъ подъемныхъ сётей, или же выѣзжали за городъ то на Пересыпинскіе рыбные заводы, то на малый фонтанъ, чтобы присутствовать при вытягиваніи неводовъ и мережъ. Притомъ же вездѣ, гдѣ къ тому представлялся случай, мы вступали въ разговоръ съ рыбаками и старались получить отъ нихъ справки и замѣтки касательно образажизни рыбъ, способовъ и времени ихъ ловли и такъ далѣе. Танкихъ образомъ намъ удалось собрать множество данныхъ, кото-

рыми значительно разширяются и пополняются свъдънія, изложенныя въ Черноморской фаунъ Профессора Нордмана.

Въ самой гавани мы нашли двухъ маленькихъ рыбокъ, которыя не только ускользнули отъ вниманія Г. Нордмана, но вообще оказались совершенно новыми, никъмъ еще не были описаны.

Одна изъ нихъ колюшка съ 9 или 10 спинными шипами, которая отличается въ особепности весьма сильнымъ развитіемъ, въ длину и ширину, костянаго брюшнаго щита, почему мы и назвали ее Gasterosteus platygaster. Она бываетъ длиною едва болъе двухъ дюймовъ и держится преимущественно между морскими травами, довольно обильными въ нъкоторыхъ частяхъ гавани. Рыбаки по цвъту спины называютъ ее зеленою колюшкою и очень хорошо отличаютъ отъ трехъиглой колюшки, Gasterosteus aculeatus, которая также тутъ встръчается, и которую называютъ бълою колюшкою.

Другая изъ нихъ, еще меньшая, ростомъ едва доходящая до полутора дюймовъ, относится къ семейству бычковъ и можетъ служить между ними типомъ для новаго рода. Этотъ крошечный бычокъ имъетъ зубы двоякаго свойства, одни мелые, коническіе, другіе большіе, цилиндрическіе, и покрытъ чешуею чрезвычайно крупною, но вмъстъ съ тъмъ нъжною, легко сходящею; первый спинной плавникъ содержитъ 5 лучей, второй отъ 12 до 14, заднепроходній 14 или 15 лучей. Въ водъ онъ является стекловатаго цвъту, съ сърыми крапинками вдоль спины и боковой линіи, и бываетъ почти совершенно прозраченъ, а потому мы и окрестили его предварительно Gobius pellucidus; рыбаки же называютъ его бланкетомъ. 1 Объ образъ жизни бланкета мы получили слъдующія справки: онъ приходитъ въ Одесскую гавань въ льтнюю пору, почти всегда большими стаями; очень боится сладкой воды, и потому при продолжительномъ съверо-восточномъ вътръ, который

<sup>&#</sup>x27; Названіе бланкеть по всей віроятности заимствовано Одесскими рыбаками у иностранных магросовь; оно употребляется въ разныхъ містахъ, по побережью Средиземнаго моря, для мельчайшихъ рыбокъ білаго цивту, по преимуществу изъ семейства сельдевидныхъ.

нагониеть подъ Одессу рачную воду изъ устья Днапра, удалиется въ открытое море; не придерживается дна морскаго, какъ это далають другіе бычки, а плаваеть ближе къ поверхности воды. Въ начала Іюля масяца многіе бланкеты, которыхъ я ближе разсматриваль, были еще съ икрою. Изъ бланкетовъ, какъ намъ говорили, готовится какое-то особое лакомое блюдо у Греческихъ кущовъ, которые нарочно ихъ заказывають у рыбаковъ. Ловля же ихъ производится исключительно только посредствомъ подъемныхъ сатей. Подробное описаніе объихъ этихъ рыбокъ, колюшки и бланкета, уже въ прошедшемъ году было сообщено мною въ Бюлетенъ Московскаго Общества испытателей природы.

Между морскими рыбами, привозимыми лѣтомъ на Одесскій базаръ, по количеству, въ которомъ привозятся, и по хорошимъ качествамъ мяса, первенствуютъ слѣдующія:

1. Скомбрія, скумбрія или баламуть (Scomber scombrus L.). Эта знаменитая рыба, которая составляєть важный предметь рыбной промышленности почти по всему побережью западной Европы, и извъстна тамъ подъ названіемъ макрели, встръчается при съверномъ берегь Чернаго моря въ продолженіи цълаго льта. Она ходитъ почти всегда большими табунами, подъ самою поверхностью воды, такъ что море отъ появленія ея мутится, какъ бы черньеть; вотъ отъ чего и произошло Молдаво-русское ея названіе—баламуть. Черноморская скомбрія не достигаетъ большаго роста, ръдко бываетъ болье 7 вершковъ, но имъетъ очень нъжное мясо. За десятокъ скомбріи въ Одессв платится отъ 15 до 30 копъекъ, смотря по улову ея и по времени года. Ловля скомбріи производится преимущественно неводами, но она берется легко и на удочки.

<sup>•</sup> По изследованіямъ Профессора Гасстагена вода на Одесскомъ рейде, при южномъ вётрё, имѣетъ относительный вёсъ 1,01351, при сёверномъ же вётрё только 1,01266 (при температурё 14° R.). Морская вода при южномъ берегё Крыма имѣетъ относительный вёсъ 1,01372. Смотри: Результаты химическихъ изследованій морскихъ, озерныхъ и лиманныхъ водъ в грязей Новороссійскаго края, Хр. Гасстагена. Одесса. 1852.

Молодая скомбрія, которая всегда держится отдільными табунами, называется чибрикь (у Грековъ чирусь).

2. Кефаль (Mugil). Названіе Кефаль не есть видовое, а родовое, собирательное; подъ названіемъ этимъ разумъются всв виды рода Mugil, которые встрвчаются въ Черномъ морв и которыхъ считается не менъе четырехъ: М. Cephalus Cuv., M. Chelo Cuv., M. auratus Risso, M. saliens Risso. Изъ нихъ М. Cephalus бываеть ростомъ почти въ аршинъ и достигаетъ болъе 10 фунтовъ въса, а М. saliens напротивъ того не больше 1/4 аршина и въсить менъе полуфунта, но не смотря на то они всё такъ сходны между собою, и по внутреннему строенію и по наружной формъ, что довольно трудно бываеть ихъ между вобою различить. На Одесскій базаръ чаще другихъ привозится М auratus. Кефаль рыба круглая, крупночешуйчатая, крышкая, но не имьеть вовсе зубовь, способныхь для схватыванія и раскусыванія добычи, а потому питается предпочтительно веществами мягкими, растительными, или же червяками и медкими насъкомыми. Подобно скомбрін, она ходить большими табунами, и въ продолжении всего лета вращается нодъ сввернымъ берегомъ Чернаго моря, проникая нервдко и въ соленыя озера, посредствомъ ериковъ связанныя съ моремъ. Ловятъ кефаль въ окрестностяхъ Одессы неводами, котя этотъ способъ довли въ отношении къ ней и не совсъмъ удобенъ: она имъетъ свойство перепрыгивать чрезъ край невода, такъ что если и удастся обхватить неводомъ большой табунъ кефали, то всегда значительная часть ея успаваеть изъ него выскочить, въ особенности днемъ. Мы заказали однажды подъ вечеръ тоню на одномъ изъ Пересыпинскихъ неводныхъ заводовъ и имъли при этомъ случай подивиться большимъ, искуснымъ прыжкамъ кефали: изъ 100 штукъ, находившихся первоначально въ тони, къ концу осталось въ ней не болъе 20.

По вкусу мяса кефаль ставится выше самой скомбріи; за десятокъ средней кефали платится на Одесскомъ базаръ отъ 50 копъекъ до 1 рубля.

3. Камбала (Rhombus maeoticus Pall.). Черноморская камбала бываеть очень велика, достигаеть 2 футовъ въ длину и 11/5 фута

въ вышину, а въсомъ доходить до одного пуда. Цвъть ея лъваго бока, на которомъ находятся оба глаза, подлежить значительнымъ изивненіямъ, зависящимъ ввроятно отъ возраста и отъ места жительства, вообще же бываеть твмъ однородиве и темиве, чвмъ больше недълимое; правый безглазый бокъ не всегда чисто бълый, а неръдко содержитъ нъсколько большихъ черноватыхъ пятенъ. Число и очертаніе костяныхъ жучекъ, неправильно разсвянныхъ на бокахъ твла, также значительно измвняются, и потому мы полагаемъ, что Rhombus torosus Rathke и въ особенности Rhombus rhombitis Rathke едва ли можно признать самостоя гельными видами, а скорже слъдуеть считать разностями отъ Rhombus maeoticus. Камбала, въ особенности крупная, почти постоянно держится на значительной глубинъ и потому объ образъ жизни ея мало извъстно. Она рыба какъ бы осъдлая; переходить конечно изъ одной мъстности въ другую, смотря по возрасту и времени года, но дальныхъ путешествій не предпринимаетъ. Мечетъ икру довольно рано весною. Крупная камбала ловится почти исключительно мережами, мелкая также неводами и на удочки.

4. Бычки (Gobius). Родъ бычковъ чрезвычайно характеренъ для Чернаго моря: изъ 25 видовъ до сихъ поръ найденныхъ въ бассейнъ Чернаго моря, только 2 или 3 выходятъ за предълы этого бассейна, общи морямъ Черному и Средиземному.

Притомъ же Черноморскіе бычки, вообще говоря, отличаются отъ Средиземноморскихъ большимъ ростомъ и сильнымъ развитіемъ плавниковъ, въ особенности втораго спиннаго и заднепроходняго. Главную особенность бычковъ составляетъ безъ сомнёнія странная форма ихъ брюшнаго плавника. Вмёсто двухъ раздёльныхъ брюшныхъ плавниковъ у нихъ находится одинъ, имёющій видъ плоской, широкой воронки, снабженной глубокою выемкою на передней сторонъ. Воронка эта, будучи придвинута близко къ горлу, служитъ вёроятно, во время плаванія, для поддерживанія головы, которая почти у всёхъ бычковъ бываетъ очень велика.

Бычки въ несмътномъ множествъ населяютъ прибрежную полосу Чернаго моря и лиманы впадающихъ туда ръкъ, многіе водятся также въ самыхъ ръкахъ или же обитаютъ въ смежныхъ съ моремъ соленыхъ озерахъ. Одни изъ нихъ держатся предпочтительно между каменьями, другіе охотнѣе вращаются между подводными травами, но всѣ избѣгаютъ такихъ мѣстъ, гдѣ дно совершенно голое, песчаное. Они отличаются необыкновенною заботливостію о сохраненіи схоихъ яицъ, выбираютъ для метанія икры безопасныя и узкія пещеры подъ камнями, или даже строятъ искуственныя гнѣзда, куда ее помѣщаютъ; но съ другой стороны весьма хищны, и взаимно другъ друга истребляютъ: крупные бычки пожираютъ мелкихъ, не щадя даже своего собственнаго потомства.

Въ окрестностяхъ Одессы встрвчаются въ морв следующіе виды бычковъ: а) бычокъ-кнутъ (G. batrachocephalus Pall.), доходящій ростомъ до 10 дюймовъ и болье; b) бычокъ-сирмань (G. Syrman Nordm.), ростомъ до 9 дюймовъ; с) бычокъ-рыжикъ (G. cephalarges Pall.), ростомъ до 8 дюймовъ; d) бычокъ-песочникъ (G. melanostomus Pall.), длиною до 7 дюймовъ; е) бычокъ-ратанъ или ратанчикъ (G. Ratan Nordm.), длиною въ 5 дюймовъ; f) бычокъ-коваль или кузнецъ (G. melanio Pall.), длиною до 7 дюймовъ; д) бычокъ-цуцикъ (G. marmoratus Pall.), едва болве 3 дюймовъ; h) бычокъ длиноволосый (G. Jozo L.); i) бычокъ-бланкеть (G pellucidus), о которомъ мы уже имъли случай говорить. Кромъ того на Одесскій базаръ съ устыя Дивстра и съ ближайшихъ соленыхъ озеръ привозятся еще слъдующіе виды: k) бычокъ травяной (G. ophiocephalus Pall.), ростомъ до 8 дюймовъ; 1) бычокъ-головачъ (G. platycephalus Nob.), длиною до 7 дюймовъ; m) бычокъ-ръчной или бълый (G. fluviatilis Pall. et G. lacteus Nordm.).

Одесскій базаръ ежедневно бываеть заваленъ цёлыми грудами бычковъ, которые расходятся обыкновенно по рукамъ торговокъ для мелочной ихъ распродажи. Бычки принадлежатъ вообще къ числу самыхъ дешевыхъ рыбъ, хотя нъкоторые изъ нихъ, какъ напримъръ сирманъ, рыжикъ, песочникъ, травяной и бълый бычки имъютъ мясо довольно нъжное и пріятное на вкусъ. — Бычокъ-цуцикъ и бычокъ длинноволосый, по причинъ малой величины, вовсе не поступають въ продажу; они впрочемъ ръже другихъ и попадаются подъ Одессою, такъ, что даже, подобно бланкету, ускользнули отъ вниманія Профессора Нордмана. Что касается до бълаго

бычка (G. lacteus Nordm.), который доставляется въ Одессу съ устья Днъстра, и котораго Г. Нордманъ описалъ какъ самостоятельный видъ, то изъ нашихъ разысканій выходитъ, что онъ, по всей въроятности, составляетъ лишь разность ръчняго бычка. Ловля бычковъ въ окрестностяхъ Одессы производится почти исключительно удочками, въ озерахъ же и въ ръчныхъ лиманахъ также бредниками или волоками.

Изъ другихъ морскихъ рыбъ на Одесскомъ базаръ попадаются слъдующія:

- 1. Морской скорпіонз (Trachinus draco L.). Рыба эта довольно р'вдка при с'вверномъ берег'в Чернаго моря, такъ что намъ удалось добыть одинъ только экземпляръ, длиною въ 8½ дюймовъ. Рыбаки обращаются съ нею, пока она жива, очень осторожно, опасаясь быть уколотыми кръпкими колючками перваго спиннаго плавника или острыми зубцами жаберной крышки; иные даже считаютъ ее ядовитою.
- 2. Морская корова (Uranoscopus scaber L.). Она также довольно ръдка при съверномъ берегъ и, въ бытность нашу въ Одессъ, ни разу не была привозима на базаръ; но всъ рыбаки ее знаютъ и разсказывали намъ объ ней.
- 3. Морской пьтухъ (Trigla hyrax Pall.). Тупомордая эта рыба одна изъ самыхъ красивыхъ. Спина у ней съровато-бурая съ зеленоватымъ отливомъ, бока туловища блъдно-оранжевыя съ золотистымъ отливомъ, брюхо бълое. Огромные грудные плавники съ верхней стороны зеленовато-синяго цвъта съ широкою темноголубою каймою, съ нижней оранжевобураго цвъта съ свътло-оранжевыми полосками вдоль отдъльныхъ лучей. Изъ другихъ плавниковъ, которые всъ болъе или менъе красноваты, особенною пестротою отличается второй спинной: онъ зеленовато-фіолетовый съ двумя рядами красныхъ пятенъ и красною полосою близъ верхняго края; хвостовый плавникъ въ средней, выемчатой части своей является синеватымъ. Морской пътухъ принадлежитъ къ числу ле тучихъ рыбъ, то есть такихъ, которымъ сильно развитые грудные плавники даютъ способность подниматься на воздухъ и пролетать по немъ нъкоторое пространство. При съверномъ берегъ Чернаго

моря рыба эта довольно рёдка, но все таки, въ продолженіи нашего пребыванія въ Одессі, намъ случилось добыть 6 экземплировъ, изъкоторыхъ самый большой иміль въ длину около 15 дюймовъ. Морской пітухъ иміть отлично нітичное и вкусное мясо, и потому, при різдкости своей, очень дорого цінится: за самый большой пришлось намъ заплатить 1 /2 рубля серебромъ. Желудокъ морскихъ пітуховъ, нами изслідованныхъ, постоянно бываль набить рачками изъ родовъ Сгандоп и Palaemon.

- 4. Барбуля или барбунь (Mullus barbatus L.). Рыба эта, прославленная за отличный вкусъ древними Римлянами, довольно обильна въ Черномъ моръ, но бываетъ въ немъ меньше ростомъ и менъе красива, нежели въ моръ Средиземномъ. Самыя большія недълимыя, какихъ намъ случалось видъть, имъли въ длину едва отъ 6 до 7 дюймовъ, да и тв были ръдки. Барбуля ходитъ почти всегда большими табунами и совершаетъ въроятно, подобно другимъ табуннымъ рыбамъ, правильныя періодическія путешествія, но мы не могли получить на этотъ счетъ никакихъ върныхъ свъдъній, такъ какъ рыбаки, по причинъ малой ея величины, не обращають на нее особаго вниманія, не занимаются спеціально ея ловлею. Свъжую барбулю привозять конечно на базаръ, когда случайно захватять неводомъ табунь ея, но нъть обычая приготовлять ее въ прокъ, солить ее. О томъ, чтобы особо собирать усики и печенки барбули, которыя у древнихъ Римлянъ почитались однимъ изъ самыхъ лакомыхъ блюдъ, въ Одессъ нътъ и помину. Въ подъемныхъ свтяхъ намъ случалось иногда находить, въ значительномъ числъ, очень мелкихъ барбулекъ, длиною нъсколько менъе 2 дюймовъ, которыя, по всей въроятности, выклюнулись изъ явить въ томъ же году. Если предположение это справедливо, то барбуля должна метать икру подъ съвернымъ берегомъ Чернаго моря довольно рано весною.
- 5. Помамида (Pelamys sarda Cuv.). Эта рыба, которая чрезвычайно сходна съ скомбрією, только что гораздо больше ростомъ, попадается подъ съвернымъ берегомъ Чернаго моря довольно ръдко, и почти всегда по одиночкъ. Въ бытность нашу въ Одессъ только однажды (11 Іюля) двъ штуки были доставлены на базаръ, да и

тъхъ мы не успъли захватить, котя и явились на базаръ весьма рано.

6. Ставрида (Caranx trachurus L.). Она, подобно паламидъ, принадлежитъ къ семейству скомбріовидныхъ рыбъ (Scomberoidei), по тълосложенію и обычаямъ даже довольно близко подходитъ къ настоящей скомбріи, но значительно меньше ростомъ, ръдко бываетъ длиннъе 6 дюймовъ. Главный отличительный признакъ ставриды заключается въ томъ, что у ней съ каждой стороны тъла, вдоль боковой линіи, начиная отъ жабернаго отверстія до основанія хвостоваго плавника, тянется рядъ костяныхъ, звъздовидныхъщитиковъ.

Кювье и Валансіень, въ большомъ своемъ ихтіологическомъ, сочиненіи, і подробно разбирая Линеевскій видъ Сагапх trachurus, различають въ немъ, по числу и формѣ означенныхъ костяныхъ щитиковъ, три разности и склоняются къ тому мнѣнію, что эти разности могуть даже быть самостоятельными породами. Черноморская ставрида относится ко второй разности Кювье и Валансьена: пересматривая большое число недѣлимыхъ, мы находили постоянно на каждомъ боку тѣла отъ 83 до 88 умѣренной ширины костяныхъ щитиковъ. Ставрида, въ продолженіи всего лѣта, густыми табунами вращается около сѣвернаго берега Чернаго моря; на Одесскій базаръ привозится нерѣдко цѣлыми возами, но впрочемъ не имѣетъ большой пѣнности.

- 7. Луфарь (Temnodon saltator Cuv.) также принадлежить къ семейству скомбріовидныхъ, но складомъ тѣла отступаетъ отъ скомбріи и ставриды, подходя нѣсколько къ селедкѣ. Путешествующіе табуны луфари встрѣчаются подъ сѣвернымъ берегомъ наичаще въ Августѣ мѣсяцѣ, но не бываютъ такъ многочисленны, какъ табуны скомбріи и ставриды. Луфарь бываетъ ростомъ до 1 фута, и мясо ея очень уважается; на Одесскій базаръ ее привозятъ иногда осенью въ значительномъ количествѣ.
- 8. Атеринка или феринка (Atherina pontica Eichw.). Эта маленькая рыбка нъсколько сродна съ кефалью, но отличается отъ кефали

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuvier et Valenciennes, Histoire naturelle des poissons. IX. 246.

уже на первый взглядъ сжатостію тіла и серебристою полоскою, которая на подобіе ленты тянется, на каждомъ боку тіла, отъ жабернаго отверстія до основанія хвостоваго плавника. Она встрівчается во множестві при всіхъ берегахъ Чернаго моря, но, по причині малаго роста, не иміт цінности. Самыя большія неділимыя, попадавшіяся намъ въ руки, были не длинні 4 дюймовъ. Въ Одесской гавани ее ловять подъемными сітями и сущать для боріца, или же употребляють наживкою на удочки.

Кстати еще можно замътить здъсь, что Atherina pontica Eichw. очень близко подходить къ Atherina presbyter Cuv. Средиземнаго моря, отличается отъ этой послъдней только меньшею шириною тъла и въ особенности хвоста.

- 9. Морской налими (Gadus euxinus Nordm.). Рыба эта, открытая и описанная подробно Г. Нордманомъ, по устройству непарныхъ плавниковъ ближе подходитъ къ трескъ, нежели къ ръчному налиму. Она, по видимому, не достигаетъ значительнаго роста и довольно ръдка; намъ случилось найти на базаръ одинъ только небольшой экземпляръ.
- 10. Глосса (Platessa luscus Pall.) принадлежитъ къ семейству рыбъ камбаловидныхъ (Pleuronectae), но значительно продолговатъе настоящей камбалы. Глаза у ней находятся на правой сторонъ твла, которая бываеть свроватобурая или свроватозеленая, съ болъе или менъе примътными темными цятнами. На той же правой сторонъ находятся особыя звъздовидныя, обсаженныя чешуйки при основаніи спиннаго и заднепроходняго плавниковъ, и другія бугровидныя чешуйки по краямъ боковой линіи, которыя однако у различныхъ недълимыхъ бываютъ въ весьма различной степени развиты; вся вообще чешуя правой стороны нъсколько - крупнъе чешуи лъвой стороны. Костяное ребро, раздъляющее глаза, и проходящее оттуда къ боковой линіи, то бываетъ очень бугорчато, то напротивъ того является довольно гладкимъ. обще глосса подлежить многочисленнымь видоизмоненіямь, и ноть сомивнія, что Pleuronectes flesus Pall. и Platessa glabra Rathke coставляють также лишь разности отъ Platessa luscus.

Глосса водится обильно какъ въ самомъ Черномъ моръ, такъ



и въ смежныхъ съ нимъ соленыхъ озерахъ; но такъ какъ она далеко не достигаетъ такой величины, какъ камбала (самый большій изъ видънныхъ нами экземпляровъ имълъ въ длину 10 дюймовъ), и кромъ того тоньше, менъе мясиста, то и не придаютъ ей никакой важности. На Одесскомъ базаръ она попадается постоянно и продается по самой сходной цъвъ.

11. Морской языкъ (Solea nasuta Pall.) также рыба камбаловидная, но еще болье продолговатая, и сильные сплющенная, нежели глосса, такъ, что имъетъ форму овальной лепешки и вполнъ заслуживаетъ даваемое ей Русское названіе. Носъ у ней примътно выдается, ротъ кривой, глаза находятся на правой сторонь, на которой и чешуя значительно крупные, нежели на лывой сторонь; у однихъ недылимыхъ правая сторона однороднаго, сфраго или сыровато-бураго цвыта, у другихъ бываетъ испещрена черноватыми пятнами. Ростомъ языкъ меньше глоссы, не длинные 8 дюймовъ. По нашему мныню водящаяся въ Средиземномъ моръ Solea lascaris Risso тождественна съ Solea nasuta Pallas.

Рыба эта ловится у съвернаго берега довольно часто, но, по причинъ малоцънности своей, ръдко привозится на Одесскій базаръ.

12. Морской бекаст (Belone rostrata Faber) названъ такъ по причинъ длиннаго, остраго рыла, имъющаго нъкоторое сходство съ клювомъ кулика. Именуютъ впрочемъ эту рыбу также и морскою щукою, на томъ основании, что спинной плавникъ ея подвинутъ далеко взадъ, находится, подобно какъ у щуки, насупротивъ плавника заднепроходняго.

Морской бекасъ своимъ длиннымъ, тонкимъ и гибкимъ тъломъ нъсколько походитъ на змъю; ростомъ доходитъ до 1 аршина. Онъ питается рачками, насъкомыми, мелкими рыбками, и, при преслъдовании своей добычи, дълаетъ иногда огромные прыжки надъ водою. Ходитъ небольшими табунами и въ продолжении всего лъта встръчается у съвернаго берега Чернаго моря. Долженъ метатъ икру очень поздно, потому что былъ съ икрою еще около половины Іюля мъсяца. Ловится неводами.

13. Черноморская селедка или оселедецъ (Clupea pontica Eichw.). Главная довля селедки бываетъ весною, во время ея нереста, отъ

конца Марта до конца Апръля, когда она густыми массами подходить къ свверному берегу и проникаеть въ самыя ръки; въ небольшомъ количествъ впрочемъ она попадается у съвернаго берега въ продолжения всего льта. Самыя большия селедки, доходящія ростомъ свыше 13 дюймовъ, называются руссаками і, среднія, длиною отъ 5 до 8 дюймовъ, по всей віроятности годовалыя и двугодовалыя, пувеньками или пувиньками. Иные рыбаки считають руссака и пузенька различными породами, на томъ основаніи, что они ходять отдільными табунами и нерестятся разновременно, пузенёкъ раньше, руссакъ поздиже, но я не могъ открыть никакихъ видовыхъ различій между ними. Притомъ же подобное явленіе замівчено также между многими другими рыбами, въ особенности между ръчными: такъ напримъръ лещи соединяются между собою въ различные табуны, смотря по росту, и нерестятся въ различное время; мелкія щуки трутся раньше большихъ щукъ и такъ далве. Черноморская селедка, имвя очень примътные зубчики не только на костяхъ челюстныхъ, но также на небныхъ, на соховидной и на языкъ, принадлежитъ безъ сомнънія къ роду Clupea Valenc., а такъ какъ Каспійская селедка едва ли отлична оть Черноморской, то не когу понять, какимъ образомъ Г. Академикъ Беръ относитъ Каспійскую селедку къ роду Alosa. 2

Молодыя селедки отъ того же года, которыя въ большомъ количествъ встръчаются у всего съвернаго берега, неръдко смъшиваются съ другими, сродными съ ними, рыбками. Селедки, ловимыя по близости отъ Одессы, частью поступаютъ въ продажу свъжими, частью солятся.

14. Тюлька (Alosa cultiventris Nordm) водится во множествъ при всемъ съверномъ берегъ Чернаго моря и входитъ также въ устъя ръкъ; въ Бугъ, какъ мы видъли, доходитъ до Вознесенска.

Тюлька рыбка очень небольшая, редко бываеть длиннее 3-хъ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Руссакъ имъетъ въ водъ спину ярко-зеленую, а брюхо серебристобълое, и потому очень красивъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulletin de la classe physico-mathematique de l'Academie de St. Petersbourg. XVI. 327.

дюймовъ. Отъ молодой селедки она отличается не только отсутствиемъ зубовъ на всёхъ костяхъ, образующихъ пасть, но также боле крепкими брюшными шипами, и кроме того бываетъ немного шире теломъ. Чешуя сходитъ съ нея чрезвычайно легко, такъ что нетъ почти возможности получить совершенно сохранный экземпляръ.

Въ Одесской гавани тюлька ловится подъемными сътями и продается сушенною, или же употребляется какъ наживка на удочки. Зимою привозять на базаръ мерзлую тюльку изъ Николаева.

- 15. Сарделька (Alosa delicatula Nordm.), подобно тюлькъ, совершенно не имъетъ зубовъ, но гораздо продолговатъе тюльки; при
  томъ же и брюшные шипы у сардельки менъе развиты, нежели
  у тюльки. Ростомъ спрделька бываетъ немного болъе 4 дюймовъ.
  Сарделька ходитъ лътомъ большими табунами подъ съверномъ берегомъ Чернаго моря, но въ ръки, кажется, никогда не вдается.
  Такъ какъ она по тълосложенію нъсколько походитъ на анчоуса,
  то смъшиваютъ ее иногда съ этою рыбою и даже называютъ мъстами анчоло. По всей въроятности она могла бы быть приготовляема въ прокъ, на подобіе кильки Балтійскаго моря, и составлять
  предметъ выгодной промышленности, но до сихъ поръ спеціальною
  ловлею ея ръшительно нигдъ по берегамъ Чернаго моря не занимаются.
- 16. Анчоусъ (Engraulis encrasicholus Cuv.), какъ говорятъ, также иногда попадается у съвернаго берега и привозится на Одесскій базаръ, но намъ не случалось ни разу его находить.

Мы уже сказали выше, что не всё морскія рыбы привозятся на Одесскій базаръ. Одни не привозятся потому, что действительно не съёдобны, другія потому, что имеють жесткое мясо и считаются погаными. Къ числу первыхъ принадлежатъ рыбки изъ отдела Пучкожаберныхъ (Lophobranchii), у которыхъ тонкое тёло кругомъ покрыто твердыми, костеобразными табличками; къ числу вторыхъ относятся Поперечноромыя (Plagiostomi), т. е. скаты и акулы.

Изъ пучкожаберныхъ рыбъ въ Одесской гавани встрвчаются три вида морскихъ иголъ (Syngnathus L. et Scyphicus Risso) и одинъ морской конёкъ (Hippocampus L.) Исторія развитія морских в иголь ознаменована однимь весьма замінательнымь фактомь. Во время тренія, выпускаемыя женскими неділимыми янчки не падають въ воду, а приліпляются къ тілу мужеских веділимых у мужеских веділимых одного рода иголь (Syngnathus), для принятія анчек служить длинное корыто, которое занимаєть нижнюю сторону хвоста и закрывается двумя продольными, широкими, кожистыми складками; у мужеских неділимых другаго рода иголь (Scyphicus) для той же ціли находится плоскій, открытый жолобь на нижней стороні туловища. Какъ у тіхь, такъ и у других иголь янчки остаются прикріпленными къ тілу мужеских неділимых до тіхь порь, пока не успіноть выклюнуться изъ нихъ молодыя рыбки, и такимъ образомь на мужеских неділимых лежить, въ извістномь смыслі, обязанность насиживанія янчекъ.

1. Изла серебристая ' (Syngnathus argentatus Pall.) достигаетъ значительной величины, бываетъ толщиною почти въ маленькій палецъ и длиною до 11 дюймовъ. У ней рыло сильно сплющено съ боковъ и очень длинно, всегда составляетъ гораздо больше половины всей головы; туловище семигранное, хвостъ четырехгранный, къ концу утонченный, съ небольшимъ плавникомъ. Цвътъ спины красноватобурый или съроватозеленый, цвътъ брюха серебристо-бълый, иногда съ зеленоватымъ или желтоватымъ оттънкомъ.

Игла эта встрвчается въ Одесской гавани въ большомъ числъ, и часто попадаеть въ подъемныя съти. У мужескихъ недълимыхъ хвостъ постоинно бываеть шире и длиннъе, нежели у женскихъ, такъ что почти всегда, уже на первый взглядъ, можно бываетъ ихъ различить между собою. Въ продолжени всего нашего пребывания въ Одессъ мы почти всегда встръчали въ корытовидномъ подхвостномъ приемникъ мужескихъ недълимыхъ или янчки или молодыхъ рыбокъ, очень ръдко находили приемникъ уже опорожненнымъ. Число янчекъ или молодыхъ рыбокъ бываетъ тъмъ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По нашему мявнію Syngnathus viridis Risso (Histoire naturelle de l'Europe meridionale IV. 179.) и Syngnathus rhynchaenus Michachelles (Isis. 1829. р. 1014) тождественны съ видомъ Syngnathus argentatus Pallas.

значительные, чыть больше ростомы старая игла; такы напримыры: у одной иглы, длиною въ 6 дюймовъ мы насчитали 185 янчекъ, у другой, длиною въ 71/, дюймовъ, 214 дитенышей, у третьей, ростожь въ 81/2 дюймовъ, 380 личевъ. Только что выклюнувшілся изъ личекъ молодыя рыбки этого вида, даже тогда, когда еще остаются въ подхвостномъ пріемникв, бывають уже снабжены вполив-развитыми плавниками, и не подлежать стало быть такому превращению, какое было замічено Фрисомів и Катрфажеми в від отношеній къ молодымъ рыбкамъ видовъ Scyphicus lumbriciformis m Scyphicus ophidion. Кромъ того намъ постоянно попадалось почти одинаковое число и мужескихъ и женскихъ недвлимыхъ, такъ что наблюденія Экштрема, в касательно значительнаго преобладанія женскихъ недвлимыхъ надъ мужескими (на 10 женскихъ недълимыхъ 1 мужеское) у вида Syngnathus acus L., вовсе непримънины къ виду Syngnathus argentatus.

Въ желудив серебристой иглы мы почти всегда находили остатии небольшихъ рачковъ изъ рода Palaenion, хотя трудно понять, какимъ образомъ эта рыбка, кмён очень слабын челюсти и не большой ротикъ, можетъ совладать съ такою добычею:

2. Ина пухлощекая (Syngnathus bucculentus Rathke) трлосложеніемъ очень сходна съ серебристою иглою, но у ней рыло менье сплющено, уже и короче. Жаберныя крышки болье выпуклы, нежели удругихъ иголь. Цвътъ тъла оливково-зеленый или веленовато-сърый, ръже краснобурый. Въ особенности же характерны для этого вида поперечныя, свътлыя полоски, которыя находится на бокахъ туловища и хвоста и слъдуютъ одна за другою чрезъ ровные промежутия. — Пухлощеная игла гораздо меньше серебристой иглы, бываетъ не длиннъе 6 или 7 дюймовъ, и немного лишь толще очина гусинаго пера. Въ подхвостномъ пріемникъ мужескихъ недълимыхъ мы насчитывали отъ 70 до 85 янчекъ, у женсимъ недълимыхъ мы насчитывали отъ 70 до 85 янчекъ, у женсимъ недълимыхъ постоянно находили правый янчникъ болье объ-

<sup>1</sup> Archiv für Naturgeschichte von Wiegmann. 1838. p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales des sciences naturelles, 1842, p. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ekström, Die Fische in den Scheeren von Mörkö. p. 133.

емистымъ, нежели лъвый. Между множествомъ недълимыхъ, нами пересмотрънныхъ, число самцовъ приблизительно было равно числу самокъ.

Пухлощекая игла подъ Одессою встръчается еще чаще серебристой иглы. Любимыми пристанищами ея служать, по видимому, такія мъста, гдь дно бываеть болье или менье иловатое. Она же, какъ мы уже видъли, въ ръкь Бугь поднимается до Вознесенска, и можеть, стало быть, прожить и въ пръсной водъ.

- 3. Игла круглая (Scyphicus teres Rathke) заслуживаеть названіе иглы еще больше предшествующихъ рыбокъ, потому что тыло ея несравненно тонше и кругиве, да при томъ же на заостренномъ концъ хвости вовсе нътъ плавника. Тонкое рыло имъетъ форму конуса, на вершинъ усъченнаго, и составляетъ не много менъе половины всей головы. У мужескихъ неделимыхъ брюхо снизу приплющено и образуеть открытый, плоскій жолобокь, въ которомъ помъщаются два или три ряда яичекъ. Мы насчитывали обыкновенно около 90 яичекъ, которыя были окружены липкою слизью и такимъ образомъ довольно плотно держались въ брюшномъ жодобав. Во всякомъ случав однако молодыя рыбки, какъ скоро выклюнутся изъ явчекъ, не могутъ уже найти убъжища въ брюшномъ жолобкъ, тогда какъ у тъхъ иголъ, которыя снабжены закрытымъ подхвостнымъ пріемникомъ, молодыя рыбки и по выходъ и отиж вмене продолжають еще нъкоторое время жить и прятаться въ томъ пріемникъ. Круглая игла наичаще бываетъ цвъта зеленаго или зеленоватожелтаго, съ красивыми синими полосками по сторонамъ затылка и съ голубоватыми точками на брюхв. Она имветъ въ длину до 81/, дюймовъ и встречается въ Одесской гавани довольно часто, котя впрочемъ въ меньшемъ числъ, нежели дръ пругія иглы.
- 4. Морской конёкъ (Hippocampus guttulatus Cuv.) поврыть очень връпкими, поперечными костяными пластинками. Туловище у него сильно сжато съ боковъ и гораздо шире хвоста, отъ котораго та-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По нашему мизыю видъ Scyphicus teres Rathke едва ли отличенъ отъ вида Scyphicus ophidion Fries.

кимъ образомъ ръзко бываетъ разграничено. На высушенной рыбкъ туловище всегда такъ изгибается, что уподобляется шейной части лошади, отъ чего и произошло самое названіе рыбки.

Конёкъ встръчается подъ Одессою довольно ръдко, по одиночкъ. Намъ удалось добыть одинъ только небольшой высушенный экземпляръ, да и тотъ нъсколько былъ попорченъ.

Изъ семейства скатовъ (Rajae Cuv.) подъ съвернымъ берегомъ Чернаго моря встръчаются два вида, и именно слъдующіе:

Морская лисица (Raja clavata Rond., Raja pontica Pall.). 1 Плоское тъло имъетъ довольно правильную ромбоидальную форму и густо усъяно сверху и снизу зерновидными, игольчатыми чешуйками, между которыми не совсъмъ симметрически разбросаны толстые костяные кружки, служащіе основаніемъ кръпкимъ, эмалевымъ, слегка загнутымъ шипамъ. Всегда однако на верхней сторонъ тъла находится средній продольный рядъ шиповъ, который начинается на затылкъ и потомъ продолжается по хвосту, до втораго спиннаго плавника. Два ряда шиповъ, болъе или менъе параллельные среднему ряду, находятся также на каждой сторонъ хвоста. Хвостъ вообще довольно тонокъ и немного приплющенъ; два спинные плавника, почти одинаковой формы и величины, подвинуты далеко взадъ и отъ втораго плавника кожистая кайма тянется до конца хвоста.

Объ челюсти покрыты кръпкими, многочисленными, поперечноовальными, зерновидными зубами. Носогубной парусъ, съ каждой стороны пасти, образуетъ свободную, широкую, зубчато-надръзанную оторочку. На днъ как дой носовой полости находится овальная, хрящеватая ръшетка, состоящая изъ одной средней, продольной пластинки и 30 паръ пластинокъ поперечныхъ. На передней стънкъ

<sup>&#</sup>x27; Г. Ратке (Beitrag zur Fauna der Клут. 309) полагаеть, что Raja pontica Палласа составляеть самостоительный видь, по цвыту близко подходищій къ Raja rubus L., но наши собственныя наблюденія подтверждають миние Мюллера (Müller und Henle, System. Beschreibung der Plagiostomen. 135.), состоящее въ томъ, что какъ Raja pontica, такъ и Raja rubus L. слыдуетъ считать лишь разностями вида Raja clavata Rond.

важдато брызгательнаго прохода расположень жабровидный органь, подпираемый горизонтальнымы хрящеватымы полукольцомы, съ си-

Нижняя сторона тела постоянно былая, верхняя же сторона бываеть окрашена очень различно: иногда бываеть красноватострая съ неправильными темнострыми и черными пятнышками и крапинками, иногда на буроватозеленомъ грунтъ бываетъ испещрена большими желтыми и мелкими черными пятнами, и такъ далъе. Вообще однако намъ казалось, что у большихъ недълимыхъ верхняя сторона бываетъ болъе темнаго цвъта, нежели у малыхъ недълимыхъ.

Приводимъ здъсь размъры (въ оранцузскихъ дюймахъ и лимяхъ) двукъ морскихъ лисицъ, тщительно нами измъренныхъ:

	I n
Отъ вершины рыла до конца хвоста	34"3""26"
Отъ вершины рыла до задняго прохода.	17"6"12"6"
Отъ вершины рыла до пасти	5"3"-10,5"
Отъ вершины рыла до линій глазъ	5"8"
Наибольшая ширина тыла	25"19"-6"
Разстояніе между глазами	2"
Разстояніе между брызгательными отверстіями	11"5,5"'-1"9,5"
Разстояніе между носовыми отверстіями .	3"2"
Ширина пасти	3"4"'-2"-4,5"
Продольный діаметръ глаза	11,8"'
Большой діаметръ брызгательнаго отверстія	10,7′′′-——10,5′′′′
Передняя сторона ромба	17"13"
Задиня сторона ромба	15"11"

Изъ показаній Нордмана и Ратке можно было бы заключить, что морская лисица встрічается въ Черномъ морів довольно різдко, но напротивъ изъ нашихъ наблюденій и справокъ выходить, что она водится въ большомъ числів даже подъ сівернымъ берегомъ. Не привозять ее на Одесскій базаръ потому, что считають поганою (хотя она и несеть яйца, а не рождаетъ живыхъ дітеньшей, подобно другимъ скатамъ и акуламъ); попадается же она очень часто какъ въ мережи, разставляемыя на камбалу, такъ и на крючки, служащіе для ловли присной рыбы. Намъ случалось нісколько

разъ присутствовать при выниманіи мережъ на маломъ фонтанъ, и видёть, какъ ее выкидывали десятками обратно въ море.

Морская лисица питается преимущественно различными морскими раками, но также рыбками и другими животными.

Морской кото (Trygon pastinaca Cuv.) цёлымъ складомъ довольно походить на морскую лисицу, но отличается оть нея большимъ, кинжаловиднымъ, зазубреннымъ съ боковъ, роговымъ отросткомъ, который выставляется изъ основной части хвоста; притомъ же у него хвостъ тонше, не содержить плавниковъ, и кожа на всемъ тёлё гладкая.

Морской котъ встрвчается подъ съвернымъ берегомъ также довольно часто, но рыбаки имъютъ къ нему совершенное отвращене, какъ потому, что онъ производить на свътъ живыхъ дътенышей, такъ и потому, что они боятся быть уколотыми его хвостовымъ кинжаломъ. Когда морской котъ попадается въ мережи или на крючья, то стараются поскоръе отъ него отдълаться, тотчасъ бросаютъ его обратно въ море и не вывозятъ даже на берегъ. По этой причинъ намъ не удалось ни разу получить въ руки морскаго кота.

Изъ семейства хищныхъ акулъ (Squali) подъ Одессою попадается, сколько мы могли узнать, одинъ только видъ:

Морская собака (Spinax acanthias Cuv.), ростомъ отъ 1 до 1½ аршинъ. Хотя акула эта, подобно морскому коту, рыба живородящая и мясо ея считается поганымъ, но тъмъ не менье иногда вывозять ее на берегъ, такъ какъ шероховатая ея шкура употребляется столярами для полированія мебели. Намъ не посчастливилось однако ее получить.

Что касается до рыбъ семейства *осетровых*, каковы осетръ, севрюга, стерлядь, бълуга, то ихъ нельзя причислить къ настоящимъ морскимъ рыбамъ: онъ занимаютъ средину между рыбами морскими и рыбами рѣчными.

Каждогодно осетровыя рыбы совершають два большія путешествія, два перехода, изъ моря въ ръки и изъ ръкъ обратно въ море, такъ что вполнъ заслуживають названіе рыбъ проходныхъ, даваемое имъ рыбаками. Весною, для метанія икры, онъ соедивнются табунами, вступають въ ръки и поднимаются по нимъ вверхъ, часто на огромныя разстоянія, а потомъ лътомъ возвращаются опять назадъ въ море. Въ самомъ морт впрочемъ онт не живутъ повсемъстно, а придерживаются почти и плиочительно тъхъ заливовъ, тъхъ частей, куда вливаются большія ръки, никогда, можно сказать, не отходять далеко отъ устьевъ ръкъ; съ другой стороны многія изъ нихъ, застигнутыя въ ръкахъ мълководіемъ, остаются тамъ до следующей весны, или же даже совствиъ поселяются въ ръкахъ и озерахъ, а въ особенности въ ръчныхъ устьяхъ.

Подъ самою Одессою нътъ лова осетровыхъ рыбъ, но привозятся онъ въ большомъ количествъ на Одесскій базаръ отъ устьевъ Днъпра и Днъстра, въ особенности севрюги и стерледи. Въ концъ Іюня продавался фунтъ свъжей осетрины по 12 копъекъ, а фунтъ бълуги по 5 копъекъ. Мы не имъли однако ни времени, ни средствъ, чтобы заняться подробнымъ изучениемъ привозимыхъ въ Одессу осетровыхъ рыбъ, и потому не можемъ сообщить касательно ихъ ничего новаго.

На Одесскомъ базаръ, кромъ рыбы морской, постоянно также бываетъ въ значительномъ количествъ разная рыба ръчная, которая туда доставляется съ Днъстра, Буга и Днъпра. Въ продолжени нашего пребывания въ Одессъ мы ежедневно находили на базаръ судаковъ, короповъ (Cyprinus carpio et hungaricus), лещей, густеру (Abramis blicca), рыбцовъ (Abramis vimba), бълизну (Aspius гарах), щукъ. Въ особенности почти всегда попадались въ большомъ числъ судаки и коропы, и между послъдними неръдко встръчались недълимыя исполинской величины, которыя продавались по частямъ, по 10 копъекъ за фунтъ.

Вообще Одесскій рыбный базаръ, сообразно съ потребностими народонаселенія, бываетъ примътно лучше обставленъ по середамъ и особенно по пятницамъ, нежели въ другіе дни.

Занимаясь, въ продолжении нашего пребывания въ Одессъ, по преимуществу изслъдованиемъ и собираниемъ морскихъ рыбъ, мы въ тоже время постоянно старались получить свъдъния также о другихъ морскихъ животныхъ и ознакомиться съ ними, по мъръ возможности. Сообщаемъ въ этомъ отношении нъкоторыя замътки,

въ особенности такія, которыя могутъ служить къ ноясненію обрана жизни рыбъ.

Изъ илекопитающихъ животныхъ въ Черномъ моръ встречеются некоторые виды тюленей и дельфиновъ. Тюлени вирочемъ
мелочисленны и лишь изръдка, въ одиночку, подходятъ въ съверному берегу; напротивъ того дельфины, которые носятъ здъсь новсе не поэтическое название морскихъ свиней, подплываютъ иногда
пълыми стадами въ самой Одессъ. Дельфины бываютъ двухъ видовъ, тупомордыя (Delphinus phocaena L., Phocaena communia Cuv.)
и остромордыя (Delphinus delphia L.); но и тв и другіе питаются
почти исключительно рыбою, и потому сопутствуютъ обывновенно
табунемъ нефали и скомбріи, во встать ихъ переходахъ, вторгалсь
безирерывно въ густые ихъ ряды за легкою добычею. Такимъ
образомъ появленіе въ какомъ нибудь мъсть стам дельфиновъ почти всегда служитъ върнымъ признакомъ, что по близости находится большой табунъ или кефали, или скомбріи.

Какъ дельонны принадлежать къ числу самыхъ стращныхъ враговъ рыбъ, и истребляютъ ихъ въ огромномъ количествъ, такъ напротивъ того разные морскіе раки составляютъ для весьма многихъ рыбъ главнъйшую добычу, служатъ для ихъ прокориленія.

Изъ десятиногихъ раковъ встръчаются короткохвостые, мягкохвостые и долгохвостые. Главнымъ представителемъ короткохвостыхъ, которымъ иногда по наружному ихъ виду даютъ названје морскитъ пауковъ, есть обыкновенный крабъ (Carcinus moenas L.), распространенный по всъмъ Европейскимъ морамъ. Онъ бываетъ довольно значительной величины, почти до 3 дюймовъ въ длину (не считая подогнутаго подъ грудь хвоста) и до 4 дюймовъ въ щирану, держится въ мъстахъ каменистыхъ, и питается небольшими рачками, моллюсками и другими медкими животными. Водится подъ самою Одессою въ большомъ числъ, часто объъдаетъ наживку съ удочекъ, а иногда и самъ попадается на удочки; предметомъ особой ловли впрочемъ не служитъ. На сушъ бъгаетъ довольно проворно и долго остается живымъ внъ воды. Значительно ръже этого краба встръчаются прибрежный канцеръ (Cancer rivulosus Risso) и шиловатый пилюмиъ (Pilumnus spinulosus Nobis), которые вмъстъ осы підне роскомъ горавно спо меньціс. Послідній изъ нихъ, сконню мы знасмь, никімъ еще не быль описань.

Магноквостые раки составляють переходь оть пороткожносжыхь въ долгохвостымь. Изъ нихъ подъ съвернымъ берегомъ водятов долюцова визидія (Pisidia s. Porcellana longicornis Leach) и ракъ-отщельнике черноморский (Pagurus ponticus Nob.). У пиний жвость щирокъ и на концъ снабженъ влавникомъ, ванъ у настоя-- МИХЪ ДЛИНОХВОСТЫХЪ РОВСОВЪ, НО СНИЗУ ДОВОЛЬНО МЕГОКЪ, И ПОЧТИ мостоянно бываеть подогнуть подъ переднюю часть тыва, подобно вакъ у раковъ короткохвостыхъ. Она очень мала ростомъ, дери (eulity) импідим импідим покрытыми мидіями (Mytilus) и нодзаеть весьма медленно. Черноморскій ракь-отшельникь виветь постоянно въ пустыхъ удижахъ трубороговъ (Buccinum retiсизим L.), отчето и магкое его туловище бываеть улитнообразно свернуто, и многія части развиты не симметринески; правая жления гораздо женьше даной, которою онь закрываеть отверскіе улитки, догда совершенно въ нее уходить при видь накого нибудь врага. Г. Ратке называеть Черноморского рака-отшельника Радига Віоgenes, но внимательное разсмотрение его поназало намъ, что овъ отличень отъ всёхъ до сихъ поръ описанныхъ видовъ, и потому мы дали ему наименование Pagurus ponticus. Изъвидовъ, водящихся въ средиземномъ моръ, наиближе въ нему подходятъ Pagurus misanthropus Risso u Pagurus ornatus Rond.

Представителями долгохвостыхъ раковъ въ Черновъ меръ деляются нъкоторые виды изъ семейства горбуновъ (Carides, Salicaçues), которые здъсь извъстны подъ общимъ названиемъ морскихъ рачковъ. У горбуновъ все тъдо бываетъ сжато съ боковъ, и кромъ того длинный хвостъ загнутъ тавимъ образомъ, что образустъ по серединъ болъв или менъе примътный горбъ. Черноморскіе горбуны бываютъ двухъ родовъ: 1) у одникъ находится на дбу лицы небольшой жолобовидный отростокъ, внутренніе сажки снабрены каждый двума многосуставчатыми нитами, и длинныя переднія ноги оканчиваются широкою булавою съ подвижнымъ, складнымъ ноготкомъ на вершинъ; они составляютъ родъ кранчовъ, Сгладрод Гарг.; 2) у другихъ добъ вытанутъ въ большой, треуголь

ный отростокъ, сверху и снизу зубчато надръзанный, внутренніе сяжие раздвияются каждый на 3 многосуставчатыя инти, ноги второй пары имвють наибольшую длину и оканчиваются узкою, но довольно правильною клешнею; они относятся къ роду полемоиз, Palaemon Fabr. Г. Ратке описаль три вида горбуновъ, найденныхъ имъ при берегахъ Крыма: Crangon maculosus, Palaemon elegans и Palaemon adspersus. Тъ же три вида встрвчаются на всемъ свверномъ берегу и именно также подъ Одессою. Горбуны вообще не велики, ръдко бысають длиниве 21/, дюймовъ, но тамъ не менъе имъють весьма важное значеніе. Съ одной стороны они составляють для человъка весьма пріятную и здоровую пищу, и потому цвании возами доставляются на базаръ Одесскій, а съ другой стороны играють важную роль въ экономіи другихъ морскихъ животныхъ, служатъ между прочимъ для прокориленія весьма. многихъ рыбъ. Нътъ, можно сказать, ни одной плотоядной морской рыбы, малой и средней величины, которая не питалась бы горбунами, если не постоянно, то хоть временно. Поэтому также горбуны составляють отличную наживку на удочки, и дъйствительно часто употребляются для этой цёли.

Ръчные раки (различные виды рода Astacus) въ море не выходять, но встръчаются во множествъ въ лиманахъ и озерахъ, откуда цълыми возами привозятся на Одесскій базаръ. Раки, ловимые въ лиманъ Диъстра, отличаются отъ всъхъ другихъ своимъ бъловатымъ цвътомъ.

Изъ разноновихъ раковъ (Isopoda) водится при съверномъ берегъ въ большомъ числъ одна Идотел (Idothea Basteri), которая складомъ тъла довольно походитъ на обыкновенную мокрицу. Она доходитъ ростомъ до <sup>3</sup>/<sub>4</sub> дюйма, и бываетъ весьма различныхъ цвътовъ, темнозеленая, свътлозеленая, желтая, бурая, и притомъ почти всегда испещгена черными или бълыми пятнышками или полосками. Изъ разряда раковъ-прызуновъ (Amphipoda) намъ попадались два вида: Gammarus locusta Leach и Amathia carinata Rathke. Первый имъетъ въ длину до 10 линій и водится повсюду въ нессмътномъ множествъ, въ огобенности же въ мъстахъ каменистыхъ, потому что любитъ прятаться между и подъ каменьями; прыгаетъ

очень проворно, такъ что трудно бываеть въ водъ схватить его рукою. Атаніа сагіпата, открытая Ратке въ Валаклавской бухтъ и подробно имъ описанная, держится болье между морскими травами, но впрочемъ также довольно многочисленна подъ съвернымъ берегомъ. Она немного менъе, нежели Gammarus locusta (длиною до 8 линій) и хуже прыгаетъ. По близости Одессы, непосредственно за Пересыпью, находится небольшой, сильно соленый лиманъ, извъстный подъ названіемъ. Андреевскаго. Въ немъ итъ вовсе рыбъ, но въ концъ Іюня онъ былъ преисполненъ, можно сказать, несмътнымъ множествомъ маленькихъ листоновихъ раковъ краснаго цвъта. Рачки эти казались намъ тождественными съ тъми, которые были доставлены г. Ратке въ Крыму изъ Сакскаго озера и причисляются имъ къ виду Artemia salina Leach (См. Rathke, Beitrag zur Fauna der Krym. 335. Tab. VI. fig. 14—21.).

Такъ называемыя усоновія животныя (Cirripedia), на основанів способа ихъ развитія и внутренняго ихъ строенія, также должны быть причислены въ ракообразнымъ; хоти они съ другой стороны и приблежаются къ слезнякамъ, имъютъ, подобно этимъ послъднимъ, епанчу и раковину. Изъ нихъ подъ съвернымъ берегомъ Чернаго моря встрвчаются мелкіе баланы (Balanus) съ усвченно-коническою раковинкою. Раковинка эта широкимъ своимъ основаніемъ приростаеть неподвижно къ разнымъ подводнымъ тъламъ (въ особенности къ верхней створкъ мидій, часто также къ черепкамъ короткохвостых раковъ), а на вершинъ содержить широкое отверстіе, чрезъ которое животное выдвигаетъ роговые свои усики, служащіе ему для кватанія пищи, и которое закрывается о обою тупоконическою крышкою, когда усики бывають втянуты въ раковину. Мы не имъли однако достаточно времени, чтобы заняться подробнымъ разсмотреніемъ этихъ интересныхъ обитателей моря, и потому не можемъ сназать, принадлежать ли всё одному виду, или же относятся къ разнымъ видамъ.

Червями Черное море очень бёдно и намъ удалось добыть только иёсколько эксемпляровъ изъ рода Lycoris (L. pulsatoria?) между мидіями, вываленными на берегь на маломъ фонтанъ.

Что касается до слизняковъ или моллюсковъ Чернаго моря,

то они бывають двухь разрядовь брюконогіе (Gasteropoda), сы ракованою улитковидною, и пластинчато-жаберные (Lamellibranchiata), заключенные въдвустворчатой раковинъ. Изъ первыхъ подъ съверныхъ берегомъ встръчаются преимущественно разные виды родовъ Buccinum, Cerithium, Conus, Trochus, Phasianella, Neritina, Rissou, Calyptraea, изъ последнихъ некоторые виды родовъ Ostrea, Mythus, Tellina, Peeten, Donax, Venus a Soleni. Bouting Cardium, Lucina, однако какъ тв, такъ и другіе очень небольшаго роста и жизвять большею частью на невоторой глубина, такъ что трудно! бываеть добыть ихъ живыми, а приходится обыкновенно ограничиваться пустыми ихъ раковинами, волнами прибиваемыми къ берету. Между двустворнами въ особенности замичательны устрица (Ostrea edulis, var. pontica) u mudia (Mytilus edulis, var. ponticus), notomy uto употребляются въ пищу, и составляють предметь спеціальнаго промысла. Какъ устрица, такъ и мидія привръплиются неподвижно къ подводнымъ сналамъ. Первая приростаетъ къ скаламъ одном' створною самой раковины, вторая посредствомъ нучка тяжистыхы волоковъ, выходящихъ изъ задинго конца той части тела, которын называется ногою. Срывають ихъ со скаль жельяными, нацочно принаровленными для этой цели, граблями. Черноморскай устрица: приметно меньше той, которая водится въ моряхъ западной Европыс. и добывается только въ извъстныя времена года, ловъ же индіи производится во всякое время, также и летомъ. Последняя вирочемъ, сколько мы могли узнать, употребляется въ пищу только простымъ народомъ и не сырая, а варенная.

Различные классы и разряды лучистыхъ животныхъ или вовсе не имъютъ представителей въ Черномъ моръ, или весьма немногихъ представителей. Такъ на примъръ, сколько намъ невъсчно, ни морскіе ежи, ни морскія звъзды до сихъ поръ не были находимы въ Черномъ моръ. Изъ морскихъ крапивъ или акалефъ (Acalephae) подъ съвернымъ берегомъ попадается одна медува (по всей въроятности Medusa aurita), которая достигаетъ очень значительной величины, до 1 фута въ поперечникъ; но появление ея бываетъ какое-то періодическое, такъ что въ иное время она коходится въ несмътномъ числъ, а въ другое время совсъть исчезаетъ. Въ бытность нашу въ Одессъ о ней вовсе не было слышно. Полипы также малочисленны и почти исключительно только встръчаются при берегахъ Таврическаго полуострова.

Отсутствіе приливовъ и отливовъ въ Черномъ морѣ, по нашему мнѣнію, составляетъ одну изъ причинъ, обусловливающихъ бъдность этого моря въ отношеніи къ низшимъ животнымъ; оно же вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ и важною помѣхою для производства наблюденій и разысканій надъ образомъ жизни тѣхъ немногихъ прибрежныхъ животныхъ, которыя тутъ встрѣчаются.

Сверхъ того вссь съверный берегъ Чернаго моря образуется известняками, которые или непосредственно орошаются морскими волнами, или же отдъляются отъ воды лишь болъе или менъе широкою, песчаною каймою, а извъстно, что известняки гораздо менъе благопріятствуютъ развитію различныхъ морскихъ растеній и низшихъ морскихъ животныхъ, нежели граниты и имъ подобныя каменныя породы.

При загородныхъ нашихъ экскурсіяхъ въ Люстдороъ, на малый фонтанъ, на Лицейскій хуторъ и на Пересыпь, мы имѣли случай нѣсколько ознакомиться также съ птицами, водящимися въ окрестностяхъ Одессы, и собрать нѣкоторое количество жуковъ. ¹ Надобно впрочемъ замѣтить, что время года въ этомъ отношеніи было намъ крайне неблагопріятно. Въ концѣ Іюня почти всѣ птицы, которыя гнѣздятся въ нашихъ мѣстахъ, еще бываютъ или заняты кормленіемъ молодыхъ или подвержены линянію, и потому мало выказываются, болѣе или менѣе таятся, а птицы перелетныя не успѣваютъ еще воротиться изъ дальнихъ сѣверныхъ странъ, куда направились весною; жуки же, и тощивъ свои силы и жизненную дѣятельность на производство потомства, большею частію вымираютъ, или по крайней мѣрѣ перестаютъ летать, прячутся въ землю и въ другія мало доступныя убѣжища.

Вездъ по берегу морскому и даже въ самой гавани Одесской можно бываетъ видъть, во всякое время дня, различныхъ рыбо-



<sup>·</sup> Собираніе, опредъленіе и укладку жуковъ спеціально на себя принплъ г. Кльскій.

лововъ (Larus) и крячковъ ' (Sterna), которыя носятся надъ водяною поверхностію, отъ времени до времени бросаются внизъ, и болъе или менте глубоко окуниваются въводу, чтобы схватить клювомъ высмотрвнныхъ ими рыбокъ. Изъ рыболововъ наичаще встрвчаются: морской (L. marinus L.) 2, сельделовь (L. fuscus L.), сизый (L. canus L.), обыкновенный (L. ridibundus L.) и малый (L. minutus l'all.); изъ крячвовъ: морской (St. macrura Naum.) и черный (St. nigra L.). рыболовы, такъ и крячки собираются въ большомъ числъ тамъ, гдъ находится много рыбъ верхоплавныхъ; цълыми шумиыми стадами они сопутствують густымь табунамь скомбрін, медкой кефали, сарделекъ, анчоусовъ, и такимъ образомъ для рыбаковъ бываютъ въстниками о приближеніи подобныхъ табуновъ. Морскіе крячки отличаются необыкновенною сметливостію и безбоязненностію въ отношенія къ человъку: когда днемъ закидывается тоня, то они слетаются въ ней со всёхъ сторонъ, съ громкимъ врикомъ вьются надъ пространствомъ воды, обхваченнымъ неводомъ, безпрестанно кидаются внизъ за легкою добычею, и даже садятся на верхнюю веревку невода, чтобы схватить рыбокъ, которыя норовять изъ него выскочить.

Рыболовы и крячки держатся также во множествь около всъхъ соленыхъ озеръ, находящихся по близости моря. Нъкоторые изъ нихъ, руководимые въроятно удобствами пищедобыванія, совершають въ теченіи дня нъсколько болье или менье празильныхъ перемъщеній, перелетая то съ озера на поморье, то обратно съ поморья на озеро. Рыболовы неръдко также вылетають въ ближайшія степи и тамъ занимаются ловлею разныхъ гусеницъ, кузнечиковъ, мышей, землероекъ; большіе рыболовы даже преслъдують и пожирають сусликовъ. Такъ называемый малый рыболовь (С. minutus), который относится къ красивъйшимъ видамъ

<sup>·</sup> l'оворять и крячеко и крячка, но чаще однако употребляють первое названіе.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Стравво, что г. Нордменъ, въ своей Понтійской фаунт, не упомиваетъ вовсе о морскомъ рыболовть. По нашимъ наблюденіямъ наъ большихъ рыболововъ морской едва ли не чаще встать другихъ попадается по стверному берегу Чернаго мор:1.

своего рода, и который рѣдко залетаетъ въ западную Европу, придерживается болѣе озеръ и рѣкъ, нежели моря. На пути въ Одессу мы стали его встрѣчать довольно часто, около озеръ, уже въ 50 верстахъ отъ города. ¹

На нъкоторыхъ соленыхъ озерахъ намъ попадались также нырцы (Podiceps), чаще другихъ именно нырецъ-красношейка (Podiceps rubricollis L.).

Изъ голенастыхъ птицъ случалось намъ встръчать на песчаныхъ мъстахъ морскаго берега, по одиночкъ или попарно, залстушника (Aegialites hiaticula L.) и камнешарку <sup>2</sup> (Strepsilas interpres L.), кругомъ озеръ, маленькими стадами, турухтановъ (Machetes pugnax L.) и улитъ (Totanus calidris L. et glareola L.), на степи и на самыхъ столбовыхъ дорогахъ неръдко въ большомъ числъ чибесовъ (Vanellus cristatus Meyer) и тиркушекъ (Glareola melanoptera Nordm.).

Изъ медкихъ пъвчихъ птицъ въ особенности обратили на себя наше вниманіе слъдующія: 1) чернохвостый чекканчик (Saxicola rubicola L.), котораго звонкій голосокъ часто раздавался изъ кустарниковъ, покрывающихъ уступы морскаго берега позади малаго фонтана; 2) плышивый чекканчик или плышанка (Saxicola leucomela Pall.), которую мы встръчали около дороги, ведущей въ Люстдороъ; 3) короткопалый жаворонокъ (Alauda brachydactyla Leisl.), который цълыми небольшими стадами бъгалъ и перелетывалъ на всъхъ степныхъ дорогахъ; 4) степной жаворонокъ (Alauda calandra L.),

<sup>&#</sup>x27; Къ съверу, до Кіева, малый рыболовъ чрезвычайно ръдко долетаетъ; мнъ самому даже никогда не случалось его сстръчать тутъ, но двъ молодый птицы были убиты на Днъпръ, въ 20 верстахъ отъ Кіева, въ началъ Севтября 1858 года, во время моего путешествія, и доставлены консерватору зоогическаго кабинета Университета.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Нордманъ показываетъ, что камнешарка бываетъ въ окрестностяхъ Одессы только въ Апрълъ и въ Октябръ на пролетъ, но это ръшительно несправедино. Въ первую мою поъздку въ Одессу, въ 1856 году, я находмаъ камнешарку на морскомъ берегу въ первые дни Августа, нынче встръчалъ ее въ ковцъ Іюня, какъ на морскомъ берегу, такъ и около озеръ, и потому я убъждевъ, что она должна гиъздиться въ этихъ мъстахъ.

который болье въ одиночку попадался на тъхъ же дорогахъ, и котораго уже издали можно бывало узнать, между другими жаворонками, по большому его росту.

Красные скворцы (Merula rosea Briss.), которые прославились тёмъ, что сопутствуютъ полчищамъ саранчи въ ихъ странствованіяхъ и истребляютъ этихъ вредныхъ насёкомыхъ по мёрё силъ своихъ, и которые часто встрёчаются большими стадами въ окрестностяхъ Одессы, нынче вовсе не были замёчены нами. Не можемъ однако сказать положительно, дёйствительно ли ихъ вовсе не было, или только они были въ маломъ числё и намъ не попадались на глаза.

Кстати замътимъ здъсь, что въ Одессъ птичій базаръ находится рядомъ съ рыбнымъ. Нъсколько торговцовъ занимаются
спеціально продажею всякихъ дикихъ птицъ, убиваемыхъ нанятыми у нихъ охотниками въ окрестностяхъ города. Торговцы эти
до сихъ поръ вспоминають о Профессоръ Нордманѣ, и разсказываютъ, какъ они всякую, попадавшуюся имъ ръдкую птицу для
него сберегали или къ нему отсылали. Особенность Одессы, въ
которой выражается разноплеменный составъ ея жителей, заключается въ томъ, что здъсь почти всъ птицы почитаются съъдобными: причисляются къ дичи не только цапли, чибесы, скворцы и
всъ мелкія пъвчія птицы, но также кукушки, удоды и имъ подобныя.

Между жуками, собранными по пути въ Херсонской губерніи и потомъ въ окрестностяхъ Одессы, заслуживаютъ болье быть упомянутыми сльдующіе: Cicindela chiloleuca Fisch (по берегу Андреевскаго лимана), Cimindis miliaris F. (подъ камнями), Cimindis lateralis Fisch. (въ Херсонской губерніи подъ камнями, часто въ несмътномъ множествъ), Cimindis lineata Schönh. (подъ камнями), Ditomus calidonius F. (подъ камнями), Aristus obscurus Dej. (подъ камнями), Pogonus littoralis Duff., brevicollis Gebl et depressus Motsch. (по берегу Андреевскаго лимана), Philanthus xantholoma Grav. (на морскомъ берегу около Одессы), Bledius taurus Germ. (на берегу Андреевскаго лимана), Saprinus semipunctatus F. (около Одессы), Ateuchus sacer L. (въ Херсонской губерніи и около Одессы),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Этотъ широкій, плоскій жукъ, котораго изображенія встрѣчаются на древнихъ Египетскихъ памятинкахъ, распространенъ по всей южной Россіи до

Gymnopleurus Mopsus Pall. et cantharus Fabr. (очень обыкновенны во всей Херсонской губернін, въ пометь, Ochodeus chysomelinus Fabr. (въ Люстдоров, влетвлъ поздно вечеромъ въ палатку), Melolontha orientalis Laporte ' (на морскомъ берегу, около Одессы), Blaps reflexicollis Fisch. et confluens Fisch. (подъ камнями въ Херсонской губернін, во множествы), Nyctipates obtusa Fabr (тысячи мертвыхъ недълимыхъ валялись на берегу Андреевскаго лимана, но не было найдено нами ни одного живаго), Asida grisea Ol. (около Одессы), Phaleria cadaverina Fabr. (на морскомъ берегу около Одессы, подъ выброшенными волнами морскими травами), Cistela sp.? (въ окрестностяхъ Одессы во множествъ, на цвътахъ разныхъ сложноцвътныхъ растеній), Cerocoma Schaefferi L. et Schreberii Fabr. (на крестоцвътныхъ растеніяхъ около Вознесенска), Mylabris variabilis Pall. et melanura Pall. (тамъ же и на тъхъ же растеніяхъ), Alosimus syriacus L. et chalybaeus Tausch. (также подъ Вознесенскомъ на крестоцвътныхъ растеніяхъ, во множествъ).

Прежде нежели разстаться съ Одессою, нельзя намъ не упомянуть объ лицахъ, оказавшихъ покровительство и содъйствіе ученымъ цълямъ нашего путешествія: г. Новороссійскій Генералъ-Губернаторъ, графъ А. Г. Строгановъ, которому мы были рекомендованы г. Попечителемъ Кіевскаго Учебнаго Округа, снабдилъ насъ открытымъ предписаніемъ ко всъмъ начальствующимъ лицамъ Херсонской и Таврической губерній, чтобы была оказываема намъ всякая законная помощь въ нашемъ предпріятіи. Н. И. Пироговъ,

Кіевской губерніи, глѣ одинъ экзомпляръ былъ найденъ мною, въ 1849 году, въ мѣстечкѣ Каменкѣ, Чигиринскаго уѣзда. Вездѣ однако онъ бывастъ рѣдокъ; на Лицейскомъ хуторѣ подъ Одессою такой жукъ шумпо влетѣлъ однажды вечеромъ въ компату, въ которой и находился, и такимъ образомъ достался мнѣ въ добычу.

<sup>&#</sup>x27; Хрущъ этотъ въ множествъ быль встръченъ наин на морскомъ берегу, за Пересынью, 27 Іюня. Мы вытхали туда подъ вечеръ, чтобы присутствовать при вытягиваніп тонь. Съ наступленіемъ сумерокъ восточные хрущи стали летать въ несивтномъ числъ и въ особенности образовали густыя стан около соломенныхъ крышъ рыбачьихъ куреней; попадались между ними также хрущи—мельники (Meloloniha fullo L.), но однако въ гораздо меньшемъ числъ.

бывшій тогда Попечителемъ Одесскаго Учебнаго Округа, приняль насъ весьма любезно и далъ намъ рекомендательныя письма къ тг. Директорамъ Херсонской и Симферопольской гимназій. Повздки въ Люстдоров, гдв проводилъ лето г. Пироговъ, останутся для насъ навсегда пріятнымъ воспоминаніемъ. Директоръ Ришельевскаго Лицея П. В. Беккеръ сдълалъ намъ самый радушный пріемт, и старался всячески спосившествовать нашимъ разысканіямъ. Между прочимъ онъ снабдилъ насъ подробными картами Херсонской и Таврической губерній, и приняль на себя всі хлопоты касательно отправленія въ Кіевъ, чрезъ контору транспортовъ, ящика съ собранными нами рыбами и другими предметами, такъ какъ мы встрътили въ этомъ дёлё нёкоторыя затрудненія со стороны таможеннаго начальства. Много пріятныхъ вечеровъ провели мы у г. Беккера на Лицейскомъ хуторъ, находящемся на самомъ морскомъ берегу, непосредственно подав малаго фонтана. Гг. Профессоры Лицея Д. А. Байковъ и Xp. Гассгагенъ, отъ которыхъ мы надвялись получить справки о некоторыхъ интересныхъ вопросахъ, насъ занимавшихъ, къ крайнему нашему сожальнію находились въ отлучкъ, одинъ въ С. Петербургъ, другой въ Крыму. Но мы имъли удовольствіе познакомиться у г. Беккера съ бывшимъ Профессоромъ Лицея Бруномъ, который сообщилъ намъ нъсколько любопытныхъ данныхъ касательно мъстностей, куда мы направляли путь, и обратиль наше внимание на сочинение знаменитаго археолога Кэлера о древнемъ рыболовстви Чернаго моря, не бывшее дотоль намь извъстнымь.

Мы пробыли въ Одессъ до 12 Іюля, стало быть почти три недъли, но изъ нихъ употребили нъсколько дней, съ 4-го по 9-е Іюля, для поъздки къ устью Днъстра, въ Аккерманъ. Я былъ уже однажды въ Аккерманъ, въ Августъ 1856 года, когда тамъ засъдали Комиссары, долженствовавшіе опредълить новыя границы Бессарабской Области, но тогда разныя неблагопріятныя обстоятельства помъщали моимъ занятіямъ, и я желалъ теперь по возможности пополнить прежде собранныя мною свъдънія. Къ описанію нашей поъздки въ Аккерманъ теперь и переходимъ.

## 4. Поъздка въ Аккерманъ.

Отъ Одессы до Овидіополя, містечка, лежащаго на лівомъ берегу Дивстровского лимана насупротивъ Аккермана, считается 36 вер тъ. Дорога пролегаетъ чистою степью, тамъ и сямъ проръзанною разной глубины балками. Въ нъкоторыхъ изъ этихъ балокъ расположены нъмецкія колоніи, обсаженныя вербами и акація ми, окруженныя садами и общирными огородами. Путешественнику въ особенности бросаются въ глаза многочисленные вороты, которые приводятся въ движеніе лошадыми или волами, и служать для подниманія изъ колодцевъ воды, потребной для орошенія огородовъ. Около общирной колоніи Гроссъ-Ливенталь саман дорога, на значительномъ протяженія, съ объихъ сторонъ густо окаймлена Намъ попадались по дорогь, во многихъ мъстахъ, сус лини и встречались довольно часто разные соколики (Falco tinnunculus et vespertinus), Ayun (Circus cyaneus et cineraceus), mypan (Merops apiaster), сорокопуды (Lanius minor et collurio), чекканчики (Saxicola, oenanthe et leucomela), жаворонки (Alauda arvensis et brachydactyla) тириушки (Glareola melanoptera) и чибесы.

Такъ какъ мы вывхали изъ Одессы въ первомъ часу дня, то надвялись еще заблаговременно, въ тотъ же день, поспъть въ Аккерманъ, но совершенно ошиблись въ разсчетв. Мы дъйствительно прибыли въ Овидіополь въ исходъ пятаго часа, но тутъ узнали, что переправа въ Аккерманъ пріостановлена, по тому случаю, что изъ Одессы было получено приказаніе ждать прівзда Принца Альберта Прусскаго. Надобно замътить, что ширина лимана между Овидіополемъ и Аккерманомъ составляетъ 9 верстъ, и что переправа производится посредствомъ парохода, ведущаго за собою паромы, на которые ставется экипажи. Совершается конечно перевздъ иногда и на большихъ дубахъ, но такой перевздъ бываетъ удобенъ и благонадеженъ только при попутномъ вътръ, а въ этотъ день дулъ довольно сильный боковой вътеръ. Въ приказаніи, полученномъ въ Овидіополъ было сказано, что Принцъ Альбертъ выбдетъ изъ Одессы во второмъ часу по получим.

Мы были вполит увтрены въ томъ, что тутъ произошла ошибка и что следовало читать во второмъ часу по полуночи, такъ какъ мы слышали въ Одессь, что Принцъ, который возвращался отъ осмотра Севастополя, принялъ приглашение на вечеръ къг. Генералъ-Губернатору, но не могли въ этомъ убъдить гг. агентовъ общества пароходства, и такимъ образомъ находились въ самомъ непріятномъ положенія. Въ Овидіополь ньть ни одного заведенія, имъющаго претензію на названіе гостиницы, и потому намъ предстояла участь провести вечеръ и ночь въ своемъ тарантасъ; но туть г. Овидіопольскій агенть общества пароходства иміль любезность пригласить насъ къ себъ на чай и потомъ распорядиться такъ, чтобы намъ можно было ночевать въ каютъ парохода. Когда мы въ пятомъ часу утра вышли на палубу, то паноходъ находился уже по середина лимана: оказалось, что Принцъ прівхаль въ исхода четвертаго часа и не выходилъ вовсе изъколяски, которая была поставлена на ведомый пароходомъ паромъ. На Аккерманской пристани поджидали Принца всв начальствующія лица города, въ полной парадной формь, и подверглись не малому замъщательству и разочарованію, когда сначала не знали, гдв отыскать Принца, а потомъ были увъдомлены, что онъ и тутъ не намъренъ выйти изъ экипажа.

Аккерманъ широко раскинутъ на возвышенной террасъ праваго берега Днъстровскаго лимана, и издали представляетъ довольно красивый и живописный видъ, но первое пріятное впечатльніе тотчась уничтожается, когда въ него въъдешь и разсмотришь его ближе. Онъ состоить почти весь изъ небольшихъ деревянныхъ домовъ, частью покривившихся отъ ветхости, заключаетъ въ себъ нъсколько общирныхъ площадей и пустырей и вообще дышетъ какимъ-то уныніемъ. У самой пристани высится старая, полуразвалившаяся Турецкая кръпость, въ довольно значительномъ раз-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Пароходное сообщеніе между Аккермановъ и Овидіополевъ, которое прежде содержалось казною, передано вынче въ завъдываніе Россійскаго обществи пароходства и торговли. Общество, кромъ капитава парохода, имъетъ еще двухъ агентовъ, одного въ Аккерманъ, другаго въ Овидіополъ, съ жалованьевъ больше профессорскаго.

стояніи отъ нея къ югу находятся пространныя, каменныя казармы, въ которыхъ помъщается стоящій туть стрълковый батальонъ, а съ съверной стороны примыкаетъ къ городу большой посадъ, который спускается до песчанаго берега лимана. Мы съ трудомъ могли себъ найти пристанище въ единственной небольшой гостиницъ, содержимой однимъ Севастопольскимъ выходцемъ.

При посъщении Аккермана мы имъли въ виду, главнымъ образомъ, двоякую цъль; съ одной стороны хотъли подробно узнать, какія породы рыбъ водятся въ Диветровскомъ лиманв или періодически туда заходить, а съ другой стороны желали спеціально ознакомиться со способомъ и обстоятельствами знаменитой ловли кефали въ ерикахъ Шоболотскаго озера, находящагося въ 15 верстахъ въ югу отъ Аккермана. Для первой цёли мы прибёгли въ распросамъ толковитыхъ рыбаковъ; посъщали ежедневно рано утромъ рыбный базаръ, и многократно присутствовали при ловлъ мелкой рыбы бредниками; для достиженів же второй ціли нарочно совершили повздку къ Шаболотскимъ ерикамъ. Большое содъйствіе при нашихъ разысканіяхъ, оказали намъ, г. Окружной начальникъ министерства государственныхъ имуществъ И нъкоторые изъ прежнихъ слушателей Университета Св. Владиміра, завимавшіе въ Аккерманъ должности по части медицинской и фармацевтической.

Давстровскій лиманъ представляєть видъ совершенно чистаго озера, которое имветь въ длину, по направленію отъ стеров дъ югу, болве 35 версть, а въ ширину отъ 7 до 10 версть. Свверная его оконечность, гдв въ него вливается рвка, замыкается низменными, наносными островами, заросшими тростникомъ и извъстными подъ названіемъ плавней, южная же оконечность отдвляется отъ моря узкою, песчаною пересыпью, именуемою Бугасомъ, и содержащею два прохода или и гирла (каждое приблизительно въ 40 сажень шириною), изъ которыхъ болве восточное называется гирломъ Очаковскимъ, а болве западное гирломъ Пареградскимъ. Лъвый берегъ лимана или Овидіопольскій довольно высокъ, и на всемъ своемъ протяженіи образуется третичнымъ известнякомъ, который поднимается довольно крутою стъною, мъс-

тами только обложенною при основаніи болье или менье широкою, песчаною полосою. Правый берегь или Аккерманскій вообще низмень, за исключеніемь только широкаго известняковаго выступа, на которомь стоить самый Аккермань, ' и песчаныхь холмовь, къ югу оть Аккермана, на которыхь расположена колонія Шаба. Къ съверу оть Аккермана растилаются обширные, болотистые луга, сливающіеся, можно сказать, съ плавнями Днъстра, а къ югу оть Шабы простирается, до самаго взморья, изръзанная озерами, песчаная равнина. Глубина лимана незначительна, составляеть даже по серединь его не болье какъ отъ 7 до 10 футовъ. Вода въ немъ почти совершенно пръсная, только посль продолжительнаго морскаго вътра принимаеть примътный солоноватый вкусь, въ особенности ближе къ бугасу.

Всв рыбаки увъряють, что въпрежнее время Дивстровскій лиманъ изобиловалъ рыбою, но въ продолжении послъдняго десятильтия постепенно сталь болье и болье бъдныть, и наконець въ последніе три года почти совствить опустыль. Не знаемъ, въ какой степени это справедливо, но полагаемъ, что действительно непомерно въ последнее время усилившаяся ловля рыбы не могла остаться безъ вреднаго вліянія на количество и качество рыбы въ Дивстровскомъ лиманъ. Не далъе, какъ два года тому назадъ, на одномъ лъвомъ берегу димана считалось не менъе 25-ти неводныхъ рыбныхъ заводовъ. — На количество и качество рыбы вълиманъ имъютъ впрочемъ также сильноевліяніе, съ одной стороны, время года, и, съ другой стороны, разныя случайныя внёшнія обстоятельства. Такъ на примъръ во время весенняго полноводія, или вообще, когда вода въ Дивстрв сильно поднимется и замутится, то многія рвчныя рыбы выходять въ лиманъ; и на оборотъ, когда при продолжительномъ морскомъ вътръ вода въ лиманъ сдълается солоноватою, то вступаетъ въ него разная рыба морская. Почти всякая рыба, постоянно пребывающая, или долго проживающая вълиманъ, полу-

<sup>.</sup> Непосредственно подлъ Аккермана находится каменоломия, въ которой добывается очень плотный, пригодный для построекъ известнякъ; изъ этого то известняка построена и Турецкая връпость.

чаетъ цвътъ болъе блъдный, противъ нормальнаго, что въроятно зависитъ отъ свойствъ дна, а можетъ быть отчасти также отъ малой глубины лимана. Въ особенности, въ этомъ отношеніи, замъчателенъ цвътъ раковъ, тутъ водящихся: они почти совершенно бълы, и даже, будучи сваренными, принимаютъ лишь блъдный розовый оттънокъ.

Всъ вообще рыбы, встръчающіяся въ Днѣстровскомъ лиманѣ, могутъ быть раздълены на четыре категоріи: а, собственно лиманскія; b, рѣчныя; с, проходныя, и d, морскія; котя впрочемъ между этими различными категоріями, какъ почти всегда бываетъ при подобныхъ раздъленіяхъ, нельзя обозначить совершенно рѣзкихт границъ.

Лиманскими мы называемъ техъ рыбъ, которыя имеють въ лимант полную осталость, т. е. въ немъ выклевываются изъ янчекъ, выростаютъ и остаются постоянно жить. Сюда относятся различные виды бычковъ (Gobius fluviatilis, melanostomus, Ratan, Syrman, cephalarges, platycephalus, ophiocephalus), верховоды (Alburnus lucidus), чехонь (Pelecus cultralus), рыбецъ (Abramis vimba), густера (Abramis blicca), тарань (Leuciscus rutilus), щиповка (Cobitis taenia), глосса (Platessa luscus), пухлощеная игла (Syngnathus bucculentus), а отчасти также суданъ, сепретъ, ершъ, поропъ (Cyprinus carpio et hungaricus), клепецъ и нъкоторыя другія. Но особеннаго вниманія между лиманскими рыбами, касательно закона ихъ распространенія заслуживають: conava (Percarina Demidoffii Nordm.) и лу-10ловка (Benthophilus macroce; halus Pall.). Сопачъ, называемый также бобырчикомъ иди ершикомъ, былъ открытъ и описанъ, назадъ тому около 20 льть, профессоромъ Нордманомъ. По тьлосложенію онъ занимаеть середину между окунемъ и ершомъ, но попрытъ чрезвычайно толстымъ слоемъ густой тягучей слизи, что и послужило поводомъ назвать его сопачомъ. Въ пищу, по причинъ малаго роста (почти не длиннъе 3 дюймовъ) и костлявости, онъ не употребляется, а самъ кормится мелкими рачкими. Пугодовка близко сродна съ бычками, но имфетъ непомфрно широкую голову, такъ что на первый взглядъ очень походить на лягушечью личинку или годовастика. Многіе рыбаки и дъйствительно не признають ее рыбою, а считають молодою лягушкою. Она не имъетъ настоящей чешуи, а почти всегда покрыта шероховатыми, роговыми бородавками, расположенными обыкновенно, на каждой сторонъ тъла, въ три ряда; ростомъ бываетъ отъ 2 до 3 дюймовъ. Объ эти рыбки т. е. сопачъ и пуголовка, сколько извъстно, никогда не встръчаются ни въ открытомъ моръ, ни въ полнопръсныхъ водахъ, а придерживаются исключительно устьевъ большихъ ръкъ, гдъ вода или постоянно или временно бываетъ солоноватою, и потому занимаютъ какъ бы середину между рыбами ръчными и морскими. Сопачъ до сихъ поръ былъ находимъ только при устьяхъ ръкъ, изливающихся въ Черное море, а пуголовка принадлежитъ также устьямъ ръкъ, впадающихъ въ Каспійское море. Въ Диъстровскомъ лиманъ, непосред твенно подъ Аккерманомъ, объ рыбки встръчаются въ значительномъ числъ.

Изъ числа рычных рыбъ болье или менье часто заходять изъ Девстра въ лиманъ: окунь, сомъ, марена (Barbus fluviatilis), красноперка (Scardinius erytrophthalmus), вырезубъ (Leuciscus Friesi), бълизна (Aspius гарах), синецъ (Abramis ballerus), лещъ (Abramis brama), щука, стерлядь или чечуга. Надобно впрочемъ замътить, что некоторыя изъ этихъ рыбъ, въ особенности небольше окуньки, красноперки, бълизнячки и щучки почти во всякое время встръчаются въ диманъ, но только не трутся въ немъ, а поднимаются для этой цели въ реку. Некоторые рыбаки уверяли насъ, будто бы вырезубы, изръдка, попадающеся въ лиманъ, приходятъ сюда моремъ изъ Днъпра, изъ подъ Очакова, но едва ли это справеддиво, темъ более, что въ верхней части Днестра вырезубъ вовсе не составляетъ ръдкости. Что касается до чопа (Aspro zingel), который также въ верхней части Дивстра водится въ значительномъ числъ, то мы не могли положительно узнать, спускается ли онъ когда либо до лимана; по крайней мъръ Аккерманскіе рыбаки, съ которыми намъ случалось бесъдовать, вовсе его не знали и называли чопиками небольшихъ судаковъ.

Къ рыбамъ проходнымъ, живущимъ въ моръ, и только для нереста вступающимъ въ лиманъ и оттуда въ ръку, относятся: селедка, севрюга, визъ (Accipenser Schypa Gûld.), осетръ, бълуга.

Проходныя рыбы особенно бывають въ лимант въ два различные періода; въ первый разъ, когда изъ моря стремятся пройти въ ръку, и во второй разъ, когда изъ ръки, по окончаніи нереста, возвращаются въ море; но впрочемъ эти два періода бываютъ иногда разділены лишь очень короткимъ промежуткомъ времени. Такъ на примъръ селедка начинаетъ появляться въ лимант во второй половинт Марта, около Благовъщенія, но поднимается въ Дивстръ не далеко, не много только выше мъстечка Маяки, и потому уже къ половинт Апртля, или по крайней върт къ Юрьеву дню, успъваетъ опять выйти въ море. Изъ красныхъ рыбъ въ наибольшемъ количествт находится севрюга, которая не вся уходитъ въ море, а частью остается въ самомъ лимант, и такимъ образомъ попадается тутъ во всякое время года.

Къ проходнымъ же рыбамъ слъдуетъ, можетъ быть, отнесть также тюльку (Alosa cultiventris) и сардельку (Alosa delicatula), которыя вступаютъ въ лиманъ въ позднюю осень, зимуютъ въ немъ и потомъ въ Мартъ мъсяцъ выходятъ обратно въ море. Не знаемъ однако — проникаютъ ли эти двъ сельдевидныя рыбы также и въ самый Днъстръ, или нътъ. Ловля тюльки производится зимою въ большихъ размърахъ, такъ что ее солятъ и развозятъ въ боченкахъ по городамъ Бессарабіи и Херсонской губерніи. Какъ тюлька, такъ и сарделька попадаются впрочемъ въ лиманъ также и лътомъ, хотя и въ маломъ количествъ, въ чемъ мы сами имъли случай убъдиться.

Изъ рыбъ морскихъ временно заходять въ лиманъ: скомбрія, ставрида (Caranx trachurus), луфарь (Temnodon saltator), различные виды кефали (Mugil), камбала (Rhombus maeoticus), языкъ (Solea nasuta), анчоусъ и нъкоторыя другія, но рыбы эти почти исключительно только придерживаются южной части лимана, въ ръдкихъ случаяхъ доходятъ до Аккермана.

Повздку на бугасъ и къ Шаболотскимъ ерикамъ мы совершили сухимъ путемъ, 7-го числа Іюля, въ сопровождении г. Помощника Окружнаго начальника Колосовскаго и г. провизора Якутовича, соддержащаго въ Аккерманъ вольную аптеку, при чемъ однако къ крайнему нашему сожалъню, по независящимъ отъ

насъ обстоятельствамъ, мы могли вывхать изъ города не раньше, какъ въ первомъ часу по полудни. Дорога на бугасъ пролегаетъ чрезъ швейцарскую коложно Шабу, которая, какъ уже было свазано, расположена на песчаныхъ холмахъ у самаго берега лимана. Колонія эта находится въ самомъ цвътущемъ положеніи и чрезвычайно славится винодъліемъ. Лучшее бессарабское вино, бълое и красное, извъстное подъ названіемъ Аккерманскаго, производится именно въ колоніи Шабв. Поднятію этой отрасли промышленности въ Шабъ много содъйствовали члены семейства Тарданъ, въ особенности же умершій въ 1857 году поручикъ швейцарской службы Карлъ Тарданъ, который написалъ очень уважаемое руководство по винодълію. 1 Мы имъли удовольствіе познакомится, еще въ Овидіополь, съ племяникомъ поручика Тардана, Карломъ Тардиномъ, который намъ между прочимъ говорилъ, что получаетъ на мъсть за лучшіе сорты своего вина по 6 рублей серебромъ за ведро. Большой погребъ Тардановскихъ винъ находится въ Одессъ.

Къ колоніи Шабѣ (Швейцарской Шабѣ) съ южной стороны непосредственно примыкаетъ посадъ Шаба (Русская Шаба), населенный почти исключительно бѣглыми Русскими людьми. Какъ богата колонія Шаба, такъ напротивъ того бѣденъ посадъ Шаба. Жители посада винодѣліемъ не занимаются, а хлѣбопашество на песчаной почвѣ идетъ у нихъ плохо; многіе промышляютъ рыболовствомъ, или же для заработокъ отправляются лѣтомъ во внутренніе уѣзды Бессарабіи. Насъ увѣряли, что изъ 2500 душъ, числящихся въ Русской Шабѣ, едвали состоитъ на лицо 500 въ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ. 2

<sup>&#</sup>x27; Тотъ же Карлъ Тарданъ напечаталъ также небольшое сочинение о естественныхъ произведенияхъ Бессарабии: Essai sur l'histoire naturelle de la Bessarabie, par Charles Tardent. Lausanne, 1841.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Надобно замѣтить, что въ этомъ году въ южной части Бессарабіи платились рабочямъ весьма высокія цѣны. Чернорабочій получалъ въ день 75 копѣекъ, косарь отъ 1 рубля до 1 рубля 20 копѣекъ серебромъ; женщина, за полевыя работы, отъ 50 до 75 копѣекъ.

За посадомъ Шабою открывается низменная, усвянная озерами и болотами равнина, которая простирается до самаго взморья. Равнина эта, однообразная и пустынная, была для насъ интересна въ томъ отношеніи, что мы нашли на ней множество разныхъ птицъ. На самой дорогъ и по сторонамъ ея бъгали и перепорхивали жаворонки (Alauda brachydactyla) и плешанки (Saxicola leucomela), а надъ нею кружились въ воздухъ тысячами береговыя дасточки (llirundo riparia); многочисленныя щурки (Merops apiaster) привлекали къ себъ взоръ красивыми пріемами своего полета; травянистыя поляны были усъяны тиркушками (Glareola melanoptera) и чибесами (Vanellus cristatus), а берега озеръ ходулочниками (Himantopus rufipes), улитами (Totanus calidris, glareola et glottis) и турухтанами (Machetes pugnax); по болотамъ расхаживали или торчали въ наблюдательномъ положении различныя цапли (Ardea purpurea, alla, garzetta, comata); надъ берегомъ лимана и надъ озерами летали туда и сюда тяжелые рыболовы (Latus) и вертелись быстрые крячки (Sterna hirundo, nigra, leucoptera, leucopareia); на всъхъ дужахъ плавали и ныряли утки, а вдали, на серединъ лимана и на Шаболотскомъ озеръ, красовались стада бълыхъ бабъ (Pelecanus onocrotalus) и видивлись черные бакланы (Carbo cormoranus). При вида такого обилія птицъ, молодые мои спутники, гг. Якутовичъ и Ельскій. пришли въ совершенный восторгъ и пустились съ горячностію за ними охотиться; но отчасти самая ихъ горячность, отчасти недостатокъ въ времени были причиною, что охота ихъ имала очень Провзжая уже чрезъ самые ерики, мы поймали около дороги большаго ежа (Erinaceus europaeus), и при этомъ случав узнали, что животное это встрвчается довольно часто на шаболотской равнинъ, и водится въ большомъ числъ въ шабинскихъ виноградникахъ. Разсказывали намъ также замъчательный фактъ, что въ послъднюю холодную зиму (съ 1857 на 1858 годъ) многіе ежи въ этихъ містахъ замерали.

Донольно обширное соленое озеро, спеціально называемое Шаболотскимъ, имъетъ продолговатую торму и тянется почти параллельно съ берегомъ лимана, отстоя отъ него приблизительно на полверсты. Возвышенная песчаная пересыпь, шириною тоже

около полуверсты, отдёляеть отъ моря южную его оконечность. Оно окаймлено кругомъ, въ особенности съ съверной стороны, высокимъ тростникомъ. Искуственно прорытыя канавы, производящія сообщеніе между лиманомъ съ одной стороны и озеромъ съ другой, называются ериками. Ерики эти имъютъ въ ширину около сажени, въ глубину до двухъ аршинъ. Весною они прочишаются, для того, чтобы рыба свободно могла пройти чрезънихъ изъ лимана въ озеро, а потомъ въпродолжении лета оставляются безъ всякаго вниманія, такъ что заростають осокою и тростникомъ. Подъ конецъ Августа ихъ опять очищаютъ и приспособляють для лова кефали. Для этой цели устроивають въкаждомъ ерикъ трое воротъ, сдъланныхъ изъ тростника. Ворота имъютъ въ вышину до сажени и на глубину полуаршина всаживаются въ грунть, такъ что болве, чвиъ на аршинъ, выставляются изъводы. Каждыя ворота состоять изъ двухъ половинокъ, сходящихся къ серединъ подъ тупымъ угломъ, вершиною обращеннымъ къ лиману. Первыя ворота находятся въ близкомъ разстояніи отъ мъста впаденія ерика въ озеро, и имфють отверстіе, шириною въ руку; вторыя и третьи ворога следують за первыми чрезъ значителяные промежутки и содержать лишь очень узкія отверстія, такъ что рыба, желающая чрезъ нихъ пройти, должна, такъ сказать, насильственно чрезъ нихъ протесниться, и потомъ уже никакъ не можетъ обратно чрезъ нихъ проникнуть, еслибъ захотъла возвратиться въ озеро. Въ самомъ близкомъ разстояніи за третьими воротами устроивается глухая тростниковая перегородка, которая занимаеть всю ширину ерика, и окончательно преграждаеть путь выходящей изъ озера рыбъ. По большей части кефаль спокойно остается жирорать въ озеръ до начала Сентября, а тогда собирается въ большіе табуны и старается выйти въ море. вступаетъ въ ерики и доходитъ до первыхъ воротъ, но тутъ, какъ бы догадываясь, что для нея приготовлена западня, часто останавливается и старается подрыть ворота, а когда не удастся ей этого сдалать, то иногда возвращается въ озеро. Во всякомъ случав однако усиливающіеся постепенно осенніе холода снова вгоняють ее въ ерики; густыми уже массами она проходить чрезъ

первыя ворота, прорывается за тёмъ чрезъ вторыя и третьи ворота и останавливается наконецъ предъ глухою тростниковою перегородкою, переполняя собою промежутокъ, остающійся между нею и послёдними воротами. Изъ этого промежутка, представляющаго собою какъ бы продолговатый садокъ, несчастная кефаль тогда уже выгребается черпаками и ручными сётями.

Число ериковъ, соединяющихъ Шаболотское озеро съ лиманомъ Дивстра и находящихся въ дъйствіи для лова кефали, простирается свыше 100, и почти столько же находится ериковъ совсвиъ запущенныхъ и оставленныхъ, въ особенности ближе къ съверной оконечности озера, которая слишкомъ обмелъла и заросла тростникомъ. Всв они болве или менве параллельны между собою и отделяются одинъ отъ другаго узкими промежутками; случается даже, что два или три ерика, къ сторонъ лимана, сливаются въ одну общую канаву, или имъютъ, по крайней мъръ, одно общее устье. Они принадлежать разнымъ хозяевамъ, которыя являются сюда съ артелями рыбаковъ въ исходъ Августа, а въ остальное время содержать при нихъ только немногихъ сторожей. изъ этихъ сторожей, въ которомъ опытный глазъ нашего спутника, г. Колосовскаго, тотчасъ распозналъ находящагося въ побъгахъ кучера, уроженца одной изъ Великорусскихъ губерній, разсказаль намь подробно о всей ловли кефали, и указаль употребляемыя при этой ловлъ снасти.

Довля кефали, въ ерикахъ Шаболотскаго озера, продолжается обыкновенно около двухъ мъсяцевъ, отъ начала Сентября до исхода Октября или до первыхъ чиселъ Ноября. Жалуются впрочемъ, что ловля эта значительно упала послъ 1834 года и теперь продолжаетъ дълаться, съ каждымъ годомъ, меньше выгодною. Причину тому должно искать, въроятно, въ слишкомъ сильномъ и безпощадномъ истребленіи кефали. Очевидно, что если каждогодно вылавливается сполна вся кефаль, приходящая жировать въ Шаболотскомъ озеръ, то, не смотря на всю плодовитость этой рыбы, должно постепенно уменьшаться количество ея въ западной части Чернаго моря. По нашему мнънію слъдовало бы постановить правиломъ, чтобы на каждые пять или шесть ериковъ, загражден-

ныхъ рыболовными снастями, оставался одинъ ерикъ свободный, или же, чтобы весь довъ въ опредъленный срокъ былъ прекращаемъ. Слёдуетъ еще замётить, что въ Шаболотское озеро приходитъ жировать по преимуществу мелкая кесель (Mugil saliens), для которой здёсь и сохраняется спеціально названіе кефало; крупныя же породы кесели, для которыхъ употребительны здёсь названія лобасъ (Mugil cephalus) и зака или залга (Mugil chelo et auratus), заходять въ озеро въ менъе знанительномъ числъ. Кромъ кесели пробираются чрезъ ерики въ Шаболотское озеро, въ доводьно большомъ количествъ, также глосса (Platessa lusca) и анчоусъ.

Отъ ериновъ мы направились на бугасъ, т. е. на перешеекъ. почти внодна отдаляющій Дивстровскій лимань, отъ открытаго моря. По серединъ бугаса расположены карантиныя строенія, которыя въ последнюю войну были разрушены Англичанами, и досихъ поръ вполив не исправлены. До нихъ однако, по недостатку времени, мы не добхали, а остановились при началь перешейка, гдв находятся два крючковых рыбных завода. На этихъ заводажь производится почти исключительно ловля красной рыбы, севрюги, осетра, бълуги, частью посредствомъ крючковъ, частью мережами. На одной веревк или хребтинь бываеть крючковы отъ 51 до 56, и такихъ хребтинъ, для одного захода, связываютъ между собою до 24. Рыбани, которыхъ мы туть застали, горькожаловались на плохую ловлю и говорили намъ, что теперь имъ чаще попадаются морскія кошки и морскія собаки, нежели осетры и бълуги. Когда мы объявили имъ, что готовы заплатить за морскую собаку отъ одного до двухъ рублей, то они тотчасъ бросились, сделать заходъ, но къ обоюдному нашему сожалению, попытка ихъ къ добытію морской собаки не имъла желаемаго успъха.

На другомъ концъ перешейка, по ту сторону Очаковскаго гирда, находится нъсколько большихъ заводовъ неводныхъ или бадамутныхъ, на которыхъ неводами производится ловля скомбрім (баламута) и кефали. Намъ говорили, что употребляемые на нихъ морскіе неводы имъютъ въ длину до 1500 сажень, въ вышиму 2 косыхъ сажени, и также, что тамъ довольно часто попадаются въ съти морскія собаки, морскія кошки и какіе-то мерскіе чертики:

Мы наміревались отправиться туда на другой день водою, но по причині неблагопріятнаго вітра не могли исполнить этого наміренія. На Дністровскомъ лимані вообще очень мало движенія. Кромі парохода, назначеннаго для буксированія паромовъ между Овидіополемъ и Аккерманомъ, существуетъ лишь небольшое число малыхъ парусныхъ судовъ, изъ которыхъ иныя также ходять между Аккерманомъ и Овидіополемъ, а иныя поддерживають сообщеніе между рыбными заводами, расположенными на бугасть, и сівернымъ посадомъ Аккермана, гді многіе рыбаки иміють жительство. Что касается до плоскодонныхъ галеръ, на поторыхъ шпеница сплавляется по Дністру, то онів не доходять до лимана, а останавливаются у містечка Маяки, лежащаго на лівомъ берегу рібки, въ 10 верстахъ выше впаденія ея въ лиманъ. Поэтому инърокая поверхность водъ лимана почти всегда представляется озпрающему ее глазу пустою, безжизненною.

Г. Ельскій, кром'в участія въ пов'ядк'в на шаболотскіе ерики, предпринималь изъ Аккершана еще двів экскурсіи, частью ботаническія, частью охотничья, одну на низменные луга къ с'вверу отъ города, другую по направленію къ Шабів. По описанію его, озера и болота по близости лимана изобилують разнородными водяными и голенастыми птицами. Въ особенности обратими на себя его вниманіе многочисленныя цапли (Ardea gazetta, comata, nycticorax) и кулики (Limosa melanura, Himantopus rufipes, Machetes pugnax), а между послідними именно летающія длинными вереницами каравайки (Ibis falcinellus), которыхъ туть впервые приплось ему видіть. Кстати туть замітимъ, что на пустыряхъ, находящихся внутри города Аккермана, многократно попадались намъ удоды и плешанки, и что въ развалинахъ Турецкой крівности обитаютъ безчисленные стрижи (Сурѕеlus murarius), которые кругомъ крівности наполняють воздухъ пронзительнымъ своимъ визгомъ.



<sup>&#</sup>x27; Каравайка, очень распространенная по берегамъ Чернаго моря, весьма ръдко залетаетъ во внутреннія губерніи Россіи. На моей памяти только однажды, въ Мат 1858 гола, была замъчена пара караваекъ въ окрестностяхъ Кіева. Одна изъ вихъ, убитан знакомымъ мит охотникомъ, досталась зоологическому кабинету Университета Св. Владиміра.

Отъ г. Шабинскаго Пристава мы получили черепъ, котя немного попорченный, остроносаго дельфина (Delphinus delphis), который весною того же года былъ убитъ около бугаса.

Между немногими жуками, найденными г. Ельскимъ, находились слъдующіе: Cicindela litoralis Fabr. (на берегу лимана), Saprinus semipunctatus Fabr, Anatolica sp.? (на пескахъ). Кромъ того мы собрали довольно много равноногихъ рачковъ, живущихъ подъкамнями на берегу лимана, и на бугасъ запаслить экземплярами всъхъ двустворчатыхъ рановинъ и улитокъ, прибиваемыхъ туда морскими волнами.

На обратномъ пути въ Одессу мы опять имъли въ Овидіополь очень непріятную задержку. Когда мы перевхали туда изъ
Аккермана 9-го Іюля въ третьемъ часу по полудни, то не только
не застали на берегу почтовыхъ лошадей, какъ слъдовало по
положеню, но и когда послали за ними на станцію, получили
грубый отказъ. Оказалось, что нетрезвый станціонный смотрительи содержатель станціи находились между собою въ сильнъйшей
ссоръ и знать не хотьли ни о какихъ проъзжающихъ, увъряв,
что всь лошади въ разгонь, тогда какъ по книгь ни одной въ
разгонь не значилось. Мы припуждены были прибъгнуть къ помощи г. Городничаго, и только его стараніями, хотя не раньше,
какъ чрезъ часъ времени, получили наконецъ лошадей. Мы нарочно упоминаемъ объ этомъ случать, чтобы показать, какимъ непріятностямъ путешественники могутъ подвергаться до сихъ поръ
на нашихъ почтовыхъ станціяхъ.

## 5. Пиколаевъ.

Возвратившись въ Одессу и отправивъ оттуда чрезъ посредство П. В. Беккера транспортъ съ собранными нами до тъхъ поръ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въламанъ Диветра, пъсколько выше Аккермана, мы нашли также одинъ нидъ двустворокъ изъ замъчательнаго рода Phaladomya, столь характернаго для Каспійскаго моря.

предметами въ Кіевъ, мы окончательно вывхали изъ Одессы 12 Іюля. Предъ самиль нашимъ вывздомъ я узналъ отъ Н. И. Пирогова, что Министерство Народнаго Просвъщенія пожелало знать его мивніе касательно учрежденія въ Россіи періодическихъ съвздовъ естествоиспытателей и врачей. Извъстіе это чрезвычайно меня обрадовало. Еще въ 1856 году я подавалъ докладную записку бывшему Министру Народнаго Просвъщенія А. С. Норову о важномъ значеніи такихъ съвздовъ для успъховъ естественныхъ наукъ, и полагалъ уже, что дъло это совершенно забыто. Запросъ-же, сдъланный г. Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа, показалъ мив, что записка моя принята во вниманіе, и что можно еще питать надежду на осуптетвленіе учрежденія, прине шаго столько прекрасныхъ плодовъ въ Германіи, Англіи и другихъ странахъ западной Европы.

Отъ Одессы до Николаева считается около 115 верстъ. Дорога продегаеть чистою стенью, но сначала, на протяжении 45 версть, очень близка и почти совершенно параллельна морскому берегу, а потомъ, за Телегульскимъ лиманомъ, поворачиваетъ и удаляется отъ него почти подъ прямымъ угломъ. участив ея встрвчается несколько лимановъ, отделенныхъ отъ моря болъе или менъе широкими, песчаными пересыпями, изъ коихъ Телегульскій самый значительный. Намъ говорили, что въ этихъ лиманахъ водятся коропъ, глосса и пъкоторые бычки (преимущественно травяной бычокъ, Gobius ophiocephalus). Вдоль второй половины дороги тянется электрическій телеграфъ, котораго столбами и проволокою, по недостатку въ деревьяхъ и кустарникахъ, очень придежно стали пользоваться для отдохновенія разныя птицы. На столбахъ чаще другихъ сидели вороны, сиворакши (Coracias garrula) и кобчики (Falco vespertinus), проволока же бывала неръдко какъ бы унизана щурками (Merops apiaster) и ласточками. Почти вездъ летали по степи большіе рыболовы, которые занимались ловлею сусликовъ и другихъ мелкихъ животныхъ, и частенько попадались стада крячковъ, перелетавшія оть одного озера или лимана къдругому. Въ селахъ, чрезъкоторыя мы проважали, случалось намъ видеть по крышамъ хатъ множество аистовыхъ

гићадъ. Молодые аисты, которыхъ намчаще сидело по два въ наждомъ гићадъ, не могли еще летать и частью даже были еще очень малы.

Обширный городъ Николаевъ стоитъ на явомъ берегу Буга, или лучше сказать Бугскаго лимана, занимаетъ именно большой песчаный полуостровъ, обнятый оъдвухъ сторонъ лимановъ Буга, а съ третьей, сверной стороны, владающимъ въ этотъ диманъ Ингуломъ. Прямыя и безконечно-широкія улицы Николаева пересъкаются между собою подъ прямыми углами. Всъ лучшіе дома, въ особенности всъ большія казенныя строенія Морскаго въдомства находятся въ съверной части города, къ сторонъ Ингула. На самомъ берегу Ингула, довольно возвышенномъ, ближко отъ его устыя, устроенъ публичный садъ, именуемый бульваромъ. Въ сравнения съ Одессою Николаевъ является довольно малолюднымъ, но за то нередко бываеть, что кулики или крячки съ крикомъ пролетаютъ по его улицамъ. Самая пустынная часть города-южная, оканчивается бойнями, расположенными на берегу лимана: тамъ собаки самой отвратительной наружности скитаются целыми стаями и на одной улицъ случилось намъ даже видъть только что убитую гадюку (Vipera berus). Другое обстоятельство, непріятно насъ поразившее въ Николаевъ, составляло отсутствіе всякой стыдливости въ женщинахъ низшихъ сословій. Берегь Ингула и лимана бываль усвянь сотнями купающихся, при чемь женщины и не думали удаляться отъ мущинъ, хоть сколько нибудь держаться отъ нихъ въ сторонъ. Явленіе это также конечно не составляеть исключительного свойства Николаева, но ни въ какомъ другомъ мъсть не бросалось намъ въ глаза такъ ръзко, накъ тутъ.

Мы прибыли въ Николаевъ 13 Іюля, около полудня. Въ гостиницъ, въ которой мы остановились, между блюдами, не выходищими изъ нормальной цъны, значились стерляжья уха и жаркое-

<sup>&#</sup>x27; Во многихъ городахъ южной Россіи и даже въ самомъ Кіевѣ нѣтъ конечно недостатка въ собакахъ, свободно бѣгающихъ по улицамъ, но нагдѣ однако множество ихъ и дикій ихъ видъ не были для насъ такъ поразительны, камъ въ Николаевѣ.

стрепеть, въ чемъ сразу отразилось положение города при устьв многорыбной ръки и среди богатыхъ дичью степей.

Постивая въ течени трехъ дней рыбный базаръ, заставляя при себь ловить рыбу большими волоками, и распрашивая подробно нъкоторыхъ рыбановъ, мы успъли составить слъдующій списокъ рыбъ, частью постоянно водящихся въ лиманъ Буга, частью временно туда заходящихъ:

- 1. Окунь довольно изобиленъ, достигаетъ въса 6 фунтовъ; трется въ Мартъ, тотчасъ послъ щуки.
- 2. Судакъ также изобиленъ, достигаетъ въса 25 фунтовъ, трется въ Апрълъ; главная ловля его бываетъ зимою, подъльдомъ.
- 3. Секретъ (Lucioperca volgensis Cuv.) очень ръдокъ, болъе придерживается Дивпра.
  - 4. Ершъ (Acerina cernua) довольно ръдокъ.
  - 5. Носарь (Acerina rossica) еще ръже ерша.
- 6. Сопачъ (Percarina Demidoffii) многочисленъ, но не употребляется въ пишу.
- 7. Колюшка или морской ершъ (Gasterosteus aculeatus?). попадается преимущественно осенью.
  - 8. Бычовъ рябой (Gobius batrachocephalus) очень не ръдовъ.
- 9. Бычокъ-головачъ (Gobius platycephalus) въ большомъ коленествъ.
- 10. Бычокъ-гордачъ (Gobius Trautvetteri Nob.) <sup>1</sup> также въ значительномъ числъ.
  - 11. Бычокъ-губанъ (Gobius melanostomus) не ръдокъ.
  - 12. Бычокъ каменный (Gobius Ratan) въ большомъ числъ.
  - 13. Бычокъ черный (Gobius melanio) довольно ръдокъ.
  - 14. Бычокъ-гонецъ (Gobius gymnotrachelus) во множествъ.
- 15. Бычокъ-песочникъ (Gobius fluviatilis) во множествъ, не ръдко почти совсъмъ бълый. <sup>2</sup>

Подробное описаніе этого бычка, котораго мы считаемъ новымъ и назвали Gobius Trautvetteri, въ честь бывшаго Ректора Университета Св. Владиміра Р. Э. Траугфеттера, пом'ящено мною въ Bulletin de la société des Naturalistes de Moscop. 1859. №. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Долженъ встръчаться подъ Николаевымъ также Бычокъ-пуцикъ (Gobius

- 16. Пуголовка или пуголка (Bentophilus macrocephalus) въ большомъ числъ, въ пищу не употребляется, выбрасывается.
- 17. Менёкъ (Lota vulgaris) попадается очень ръдко, много что въ пять лътъ одинъ, заходный изъ Дивпра.
- 18. Глосса (Platessa luscus) довольно ръдка; до Николаева доходитъ только мелкая.
- 19. Сомъ довольно изобиленъ, достигаетъ въса 20 пудовъ, трется въ Апрълъ!.
- 20. Марина́ (Barbus fluviatilis) была изобильна въ 1827 году, а нынче очень ръдка; рыба болъе Днъпровая.
- 21. Коропъ изобиленъ, бываетъ вѣсомъ болѣе пуда, трется въ различныя времена, начиная отъ конца Апрѣля и до половины Іюля (отъ дня св. Георгія до дня Иліи Пророка). Молодые коропы не болѣе 5 фунтовъ вѣсомъ, называются шаранами, или шаранчиками.
- 22. Карась бываеть двухъ породъ, круглый и продолговатый, но держится только въ Ингулъ, въ лиманъ ръдко заносится.
  - 23. Линь держится съ карасемъ въ Ингулъ.
- 24. Подустъ (Chondrostoma nasus) очень ръдовъ, развъ что 2 или 3 штуки попадутся въ теченіи льта.
  - 25. Головень (Squalius dobula) также весьма ръдокъ.
- 26. Вырезубъ (Leuciscus Friesii) довольно изобиленъ, доходитъ въсомъ до 15 фунтовъ, нерестится въ Апрълъ.
- 27. Тарань (Leuciscus Heckelü) достигаеть въсомъ отъ 2 до 3-хъ фунтовъ; главный довъ ея бываеть во время весенняго поста.
  - 28. Библица (Leuciscus rutilus) во всякое время.
- 29. Чернуха́ (Scardinius crytrophthalmus) достигаетъ въса 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> оунта.

marmoratus), котораго мы находили подъ Вознесенскомъ, но на него не обрищаютъ, ивроятно, никакаго вниманія по причинв малаго его роста, и не привозятъ его на базаръ.

<sup>1</sup> Нъкоторые Николаевскіе рыбаки увъряли насъ, что у сома бываеть одинъ только икряной мъшокъ. Не понимаемъ, откуда произошло такое относчное миъніе.

- 30., Бълизна (Aspius гарах) въ достаточномъ количествъ, въсомъ до 10 фунтовъ, трется одновременно съ таранью.
  - 31. Верхоплавка (Alburnus lucidus) изобильна во всякое время.
- 32. Чехонь (Pelecus cultratus) многочисленна во всякое время, но наиболе весною, въсомъ до 1 фунта.
  - 33. «Шамая (Aspius clupeoides) въ маломъ количествъ; ръдко довится болъе 150 штукъ въ одну тоню.
- 34. Синецъ (Abramis ballerus), изобиленъ, не болъе 1 фунта въсомъ, трется довольно рано весною.
- 35. Клепецъ (Abramis sopa) идетъ вмъстъ съ синьцомъ, но менъе многочисленъ.
- 36. Рыбецъ (Abramis vimba) появляется густыми массами въ великомъ посту, когда нерестится; лътомъ же поцадается ръдко.
- 37. Лещь изобиленъ, доходить въсомъ до 15 фунтовъ; въ послъднюю зиму случалось, что привозили сразу на базаръ до 200 дудовъ.
- 38. Густера́ (Abramis blicca) въ маломъ числъ, по причинъ костлявости мало уважается.
  - 39. Щука въ маломъ числъ, въсомъ до 15 фунтовъ.
- 40. Селедка доходить до Николаева лишь въ маломъ числъ, и то лишь небольшая, называемая пузинькомъ, проникаетъ впрочемъ и въ Ингулъ.
- 41. Тюлька (Alosa cultiventris) бываеть въ лиманъ въ несмътномъ множествъ, начиная отъ Покрова до Апръля мъсяца.
- 42. Морская иголка (Syngnathus bucculentus) встръчается въ аначительномъ числъ.
- 43. Осетръ въситъ ръдко болъе 5 пудовъ, идетъ тереться въ Бугъ, а лътомъ бываетъ очень ръдокъ, удаляется тогда на взморье.
- 44. Бълуга попадается чаще осетра, но ръдко въситъ болье 12 пудовъ.
- 45. Пестрюга или севрюга довольно изобильна во всякое время года, но преимущественно однако весною и осенью, въсомъ бываетъ наичаще отъ 20 фунтовъ до 1 пуда.
- 46, Стердядь также многочисленна, ръдко въсить более 10 фунтовъ.

Digitized by Google

47. Визъ никогда не бываетъ съ икрою, есть ублюдокъ отъ другихъ породъ красной рыбы, ръдко въситъ боле 20 фунтовъ и вообще малогоденъ.

Списокъ этотъ впрочемъ не совсёмъ полонъ, съ одной стороны потому, что объразныхъ мелкихъ рыбахъ, какъ на примёръ о видахъ родовъ Cobilis, Gobio, намъ трудно было въ короткое время нашего пребыванія въ Николаевт получить втрыя справки, а съ другой стороны потому, что въ это время рыбная ловля почти совсёмъ прекратилась и рыбные заводы стояли пустыми. Встработники ушли въ окрестныя степи и помогали убирать хлъбъ, такъ какъ плата съ копны простиралась отъ 60 до 75 коптекъ.

Наибольше свъдъній касательно рыбъ Бугскаго лимана намъ сообщилъ Николаевскій купецъ Быковъ, который самъ содержитъ нъсколько рыбныхъ заводовъ. Какъ по показаніямъ его, такъ и по словамъ другихъ рыбаковъ, рыбная ловля въ лиманъ становит ся постепенно менъе прибыточною, главнымъ образомъ по причинъ постоянно возрастающаго числа рыбныхъ заводовъ; въ настоящее время считаютъ не менъе 100 рыбныхъ заводовъ по берегамъ Бугскаго лимана. Съ другой стороны однако рыбная промышленность здъсь мало развита, т. е. соленіе и другіе способы приготовленія рыбы въ прокъ мало употребительны и несовершенны. Такъ на примъръ Быковъ сознавался, что еще въ послъднюю зиму, которая была очень непостоянна, ознаменовалась частыми оттепелями, ему пришлось выбросить до 500 возовъ попортившейся тюльки.

Бугскій лиманъ значительно ўже Днѣстровскаго, но длиннѣе; оба берега его возвышенны, хотя впрочемъ лѣвый нѣсколько ниже праваго и мѣстами содержитъ вдавлины, переходящія въ низменныя песчаныя площадки. Вода въ немъ постоянно бываетъ болѣе или менѣе солоновата, и потому для питья не годится; намъ говорили, что солоноватый вкусъ воды дѣлается ощутительнымъ даже до села Гурьевки, на 22 версты выше Николаева. Вслѣдствіе того случается, что иногда настоящія морскія рыбы, какъ на примѣръ баламутъ, проникаютъ далеко въ лиманъ и подходятъ къ самому Николаеву.

Между раками, привозимыми на Николаевскій базаръ, въ особенности обратили на себя наше вниманіе тѣ, которые именуются тамъ толстоножками. Они характеризуются по преимуществу гладкимъ груднымъ черепкомъ и весьма широкими, толстыми влешнями; ловятся въ Ингулѣ. Г. Ратке описалъ толстоножку, какъ отдѣльный видъ, подъ названіемъ Astacus pachypus, 'и дѣйствительно нельзя не признать видоваго различія толстоножки отъ нашего обыкновеннаго рѣчнаго рака, Astacus leptodactylus Eschh., который однако также водится и въ Ингулъ и въ лиманъ Буга.

Въ югозападномъ углу полуострова, на которомъ стоитъ Николаевъ, находится, на болотистомъ грунтъ, небольшая роща. Она служитъ любимымъ пристанищемъ различныхъ маленъкихъ соколиковъ (Falco tinnunculus, subbuteo, vespertinus), которые на отдыхъ и на ночлегъ слетаются туда многими сотнями.

Въ Николаевъ по Морскому въдомству служатъ многіе врачи, прослушавшіе курсъ наукъ въ Университетъ Св. Владиміра. Намъ было очень пріятно слышать со всъхъ сторонъ отличные о нихъ отзывы. Нъкоторые изъ нихъ, узнавшіе о нашемъ прыбытіи, привътствовали насъ самымъ любезнымъ и радушнымъ образомъ, въ особенности гг. Миштольдъ и Олевинскій. Ординаторъ Николаевскаго морскаго госпиталя В. И. Олевинскій продолжаетъ питать горячую любовь къ научнымъ занятіямъ и читалъ между прочимъ, въ предшествовавшую зиму, съ отличнымъ успъхомъ, публичныя лекціи Химіи, на которыя стекалось нъсколько сотъ слушателей. Тутъ опять я невольно вспомнилъ о томъ, какъ полезны могли бы быть періодическіе съъзды Русскихъ естествоиспытателей и врачей для ознакомленія ихъ между собою, для установлепія между ними правильныхъ сношеній, и для поддержанія между ними всякаго рода ученой дъятельности.

## 6. Русская коса и Станиславъ.

Мы вывхали изъ Николаева 16 Іюля около полудня и направились къ югу вдоль лъваго берега Бугскаго лимана, въ Русскую

<sup>&#</sup>x27; Rathke, Fauna der Krym. 365.

Косу. Село Русская Коса составляеть именіе отставнаго Ротмистра Аргутинскаго, который приняль насъ чрезвычайно любезно. Къ дому г. Аргутинскаго примыкиетъ довольно значительный и хорошо содержимый садъ, богатый отличными априкосовыми де ревьями и виноградными лозами. Насупротивъ села вдается въ диманъ, почти на цълую версту, узкая песчаная коса, оставляющая проходъ для кораблей только на правой сторонъ лимана и раздъляющая его некоторымъ образомъ на две половины, северную и южную. У начала косы расположенъ рыбный заводъ, который отданъ на откупъ бывшему Станиславскому старшинъ Бондаренкъ. Заводъ во время нашего посъщенія быль въ бездъйствін и находилось при немъ только нъсколько сторожевыхъ рыбаковъ. Отъ нихъ мы узнали, что изъморскихъ рыбъ иногда доходять до Русской Косы, въ особенности при большой погодъ, следующія: морской пътухъ (однажды только быль поймань), баламутъ, кефаль , (однажды только около 10 штукъ было поймано), камбала, морская кошка и морская лисица. Упоминали они также о какомъ-то морском волки, который бываеть величиною съ осетра и походитъ носомъ на севрюгу. Въ наибольшемъ количествъ, по ихъ словамъ, водятся въ лиманъ во всякую пору: судаки, 2 бычки, коропъ, вырезубъ, таранъ, лещь, густера, синецъ, клепецъ, рыбецъ, верхоплавка, севрюга и чечуга.

Вдающаяся въ лиманъ часть косы, на сколько выставлялась изъ воды, была устяна рыболовами, крячками и куликами, между которыми мы могли отличить тиркушекъ, камнешарокъ, чибесовъ и турухтановъ. На самомъ концъ косы преважно сидълъ большой бакланъ (Carbo cormoranus), который при приближени нашемъ отплылъ на достаточное для полной его безопасности разстояніе, а по уходъ нашемъ тотчасъ возвратился на прежнее мъсто. На песчаномъ берегу лимана г. Ельскому досталось въ добычу нъ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По всей въроятности подъморскимъ волкомъ должно разумъть мече-рыбу, Xiphias gladius, которая по свидътельству Нордмана иногда подходитъ къ съверному берегу Чернаго моря.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Судаковъ различали двъ породы, судака Буговаго и судака лиманскито.

сколько быстроногихь жуковь изъ рода Cicindela (Cicindela litoralis, Fabr.).

На правомъ берегу лимана, почти насупротивъ Русской косы, (немного только ниже ея), находятся развалины знаменитаго древнегреческаго города Ольвіи. Мы желали ихъ осмотръть, но по причинъ затрудненій къ переправъ должны были отказаться отъ этого нажівренія.

Утромъ 17 Іюля мы: пустились въ дальнъйшій путь и мимо Вютмовни и: Аленсандровки прівхали въ Станиславъ, около полудня. Около дороги попадались намъ многочисленные луни (Circus), удоды, сиворанши, щурки, жаворонки (Alauda calandra, arvensis, brachydactyla), стада тиркушекъ, караваекъ (Ibis falcinellus) и другихъ куликовъ, аисты, рыболовы, крячки. Мы встрътили также около Александровки, гдъ лиманъ образуетъ широкую, дуговидную бухту, значительное полчище саранчи. Она только что поднималась изъ тростинка, опоясывающаго небольшой прудъ, находящійся подлъ дороги, и перелетала чрезъ дорогу по направленію къ лиману. Въ первый разъ намъ пришлось тутъ видъть густую стаю этихъ вредныхъ насъкомыхъ.

Обширное село Станиславъ занимаетъ вершину материка между лиманами Днъпра и Буга (мысъ Ипполай Геродота), или върнъе сказать, лежитъ на правомъ берегу Днъпровскаго лимана, непосредственно предъвпаденіемъ въ него Бугскаго лимана. Часть села расположена на уступахъ самаго берега, а другая широко выдвигается въ плоскую степь. Мы застали Станиславъ въ совершенномъ запустъніи: почти всъ жители ушли въ степь, гдъ уборка хлъба требовала возможно болъе рабочихъ рукъ. Спъшили этою уборкою тъмъ болъе, что ходили тревожные слухи о появленіи саранчи. Считается въ Станиславъ до 40 неводовъ, но при такомъ положеніи дълъ не было въ дъйстріи ни одного, а производилась въ это время ловля рыбы только въ маломъ видъ, плавными съ-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ недальнемъ разстоянім отъ Станислава, къ сторонъ Херсона, находится село Глубокая, занимающее край довольно значительной бухты; въ этомъ мъстъ, еще раньше заложемя Херсона, предполагалось основать городъ.

тями и волоками. Случайно однако находился на лицо, при нашемъ прівздів, бывшій старшина Ефремъ Бондаренко, который, какъ уже было замъчено, содержить на откупь рыбную ловлю на Русской кось и имъетъ неводъ также въ самомъ Станиславъ. мы и получили довольно подробныя сведенія касательно рыбъ, по крайней мъръ важнъйшихъ, которыя ловятся въ лимань Див-Дивпровскій лиманъ, соответственно величине реки, которою образуется, несравненно обширнъе Бугскаго. Правый берегь его возвышенъ и только ближе къ вершинъ опоясанъ полосою низменных луговъ, лъвый же берегь или Таврическій, который оканчивается длинною Кинбурнскою косою, на всемъ своемъ протяженім низменъ, песчанисть и содержить многочисленные заливы и озера, окаймленные густымъ камышомъ и тростникомъ. эти то заливы и озера Таврического берега служать притонами множества ръчныхъ и озерныхъ рыбъ, а потому и самые прибыльные рыбные заводы Дивстровскаго лимана находятся на Таврическомъ берегу. Вода Дивпровскаго лимана првсная, и если по временамъ двлается солоноватою, то гораздо въ меньшей мврв, нежели въ лиманъ Буга.

Помъщаемъ здъсь главнъйшія показанія Ефрема Бондаренка относительно рыбъ Днъпровскаго лимана:

- 1. Окунь въ маломъ числѣ, придерживается Таврическаго берега.
- 2. Судакъ лиманскій (Lucioperca marina?), темнаго цвъта, остромордый, въсомъ до 30 фунтовъ, идетъ тереться въ Днъпръ и Бугъ.
- 3. Судакъ ръчной или буговой, болъе саътлаго цвъта, имъетъ морду менъе острую и меньше ростомъ противъ лиманскаго; подъ Станиславомъ ръдокъ.
- 4. Секретъ или чопикъ (Lucioperca volgensis) лѣтомъ держится на взморьѣ, на зиму идетъ въ Днѣпръ, рѣдко доходитъ вѣсомъ до 2 оунтовъ.
  - 5. Носарь (Acerina rossica) встръчается изръдка, въ одиночку.
  - 6. Ершъ (Acerina cernua) также очень ръдокъ.

- 7. Бычки бывають разные вы значительномы воличествы.
- 8. Сомъ попадается иногда въ большомъ числъ, наичаще бываетъ въсомъ отъ 3 до 5 пудовъ.
  - 9. Марина довольно ръдка, придерживается болъе самой ръки.
- 10. Коропъ троякій: а) Юрьевскій, черноватый или гивдой, въсомъ отъ 5 до 10 фунтовъ, называемый также шараномъ, трется по озерамъ около Юрьева дня, зимуетъ въ камышахъ; b) Никольскій или Николаевскій, желтоватый, въсомъ около 20 фунтовъ, трется въ ръкъ и озерахъ въ началъ Мая, зимуетъ по кручамъ; с) Троецкій, желтый, въсомъ отъ 30 до 45 фунтовъ, въ озера не заходить, трется подъ конецъ Мая или въ началъ Іюня, зимуетъ по кручамъ.
  - 11. Карась встръчается только въ озерахъ Таврическаго берега.
  - 12. Линь также бываеть только подъ Таврическимъ берегомъ.
- 13. Бълизна довольно изобильна, въ особенности зимою, доходитъ въсомъ до 15 фунтовъ, идетъ тереться рано весною, въ одно время съ таранью.
  - 14. Верхоплавка въ большомъ количествъ, постоянно.
- 15. Вырезубъ довольно изобиленъ зимою, бываетъ въсомъ до 8 фунтовъ, идетъ тереться въ Бугъ.
- 16. Тарань держиться льтомъ по травь, вълимань начинаетъ показываться посль Спасовки, но главный ловъ ея бываетъ въ Мартъ; въсомъ отъ 1½ до 2 фунтовъ.
  - 17. Библица, или медкая таранька, довольно изобильна.
- 18. Чернуха́ или красноперка придерживается камышей Таврическаго берега.
- 19. Лещь держится літомъ ближе въ взморью, а подъ зиму массами идеть въ рівки, достигаеть візса 15 и даже 18 фунтовъ, трется весною, сначала мелкій, потомъ крупный; считается въ Станиславів главною рыбою, такъ какъ иногда одна тоня даетъ отъ 50 до 100 возовъ.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Мы присутствовали при ловать мелкой рыбы волоками, и видъли при эточъ случать, что наичаще попадаются Gobius fluviatilis, Gobius platycephalus и Gobius gymnotrachelus.

- 20. Густера или густыря, въсомъ до 1 фунта, трется въ началь Мая.
- 21. Рыбецъ довольно изобиленъ, въсомъ около 1½ сунтовъ, трется предъ днемъ Св. Николая, по каменьямъ; случается иногда захватить въ одну тоню отъ 2 до 3 возовъ.
- 22. Клепецъ въмаломъ числъ, въсомъ около 1 оунта, идетъ виъстъ съ рыбцомъ.
- 23. Синецъ попадается иногда въ такомъ множествъ, что нельзя вытащить невода и надобно бываетъ часть выпустить; въсомъ наичаще около 1 фунта; жирный подверженъ очень скорой порчъ; мелкій свътлъе цвътомъ, крупный темнъе; неизвъстно съ точностію когда и гдъ трется.
- 24. Чехонь въ значительномъ количествъ бываетъ только весною.
- 25. Селявка или шамайка придерживается соленой воды, и потому изъ моря направляется въ Бугскій лиманъ, а подъ Станиславомъ попадается очень ръдко. На Русской косъ ловится одновременно съ бълизною.
- 26. Язь или вязь только изръдка выходить изъ обки въ лиманъ.
- 27. Головень также держится ръки, а въ лиманъ попадается еще ръже язя.
- 28. Щука придерживается предпочтительно Таврическаго берега.
- 29. Селедка или оселедецъ весною большими гуртами идетъ тереться въ Дивпръ; бываетъ большой (руссакъ) и малый (пузинёнъ).
- 30. Тюлька встръчается подъ Станиславомъ въ маломъ лишь количествъ.
- 31. Бълуга довольно ръдка; Бондаренкъ въ течени двадцати лътъ случилось поймать не болъе десятка, изъ которыхъ самая большая въсила 18 пудовъ.
  - 32. Осетръ въ Апрълъ идетъ тереться въ Дивпръ, а въ Мав уже опять возвращается, ръдко бываетъ въсомъ болъе 5 пудовъ.
  - 33. Севрюга наичаще ловится зимою, рѣдко вѣситъ болѣе 1 пуда.

- 34. Чечуга изобильна, трется одновременно съ осетромъ; икреная изръдка доходитъ въсомъ до 20 фунтовъ.
- 35. Визъ носомъ походитъ на чечугу, въсомъ доходитъ до 1/1 пудовъ, съ икрою Бондаренкъ никогда не попадался.

Изъморскихъ рыбъ только мелкая глосса доходить до Станислава, другія же, какъ на примъръ баламутъ, кефаль, морской котъ и морская лисица, очень ръдко сюда заблуждаются, чаще встръчаются въ Бугскоиъ лиманъ.

Употребительные здёсь неводы бывают обыкновенно очень велики, длиною до 800 сажень, такъ что потребно для вытягиванія ихъ отъ 24 до 30 человъкъ.

При насъ, какъ мы уже сказали, производилась ловля рыбы плавными сътями. Въ эти съти въ большомъ количествъ попадались клепцы, а въ маломъ числъ также синьцы, рыбцы, густера, библицы и ръчные судаки.

Г. Ельскій на глинистомъ склонѣ высокаго берега лимана нашелъ множество жуковъ, принадлежащихъ виду Tentyria orbiculata Fabr. Онъ сдѣлалъ при этомъ любопытное наблюденіе, что жуки эти ловили и пожирали какихъ то большихъ блѣднозеленыхъ комаровъ, водившихся тутъ въ несметномъ количествѣ, тогда какъ пищею жуковъ изъ рода Tentyria считаютъ обыкновенно гнилыя растительныя вещества.

## 7. ХЕРСОНЪ.

Утромъ 18 Іюля мы оставили Станиславъ и направились въ Херсонъ степною дорогою. По пути попадались намъ стада рыболовов, крячковъ, кобчиковъ (Falco vespertinus et cenchris), чибесовъ и щурокъ. Въ особенности обратили на себя наше вниманіе рыболовы, которые, сидя или расхаживая по степи, сначала были принимаемы нами издали за бѣлыхъ гусей. Они очевидно занимались тутъ ловлею кузнечиковъ и другихъ подобныхъ насѣкомыхъ. Точно также крячки, летая низко надъ поверхностью хлъбовъ и травъ, охотились за насъкомыми. Тъмъ же дъломъ были заняты

и кобчики. Эти маленькіе соколики, чтобы высмотрёть себё на землё добычу, имёють обычай долго тренетаться въ одновь мёств, на подобіе поющихъ жаворонковъ, и когда видишь въ такомъ положеніи сразу нёсколько десятковъ ихъ, то видъ бываеть очень красивый. Щурки, подобно ласточкамъ, схватывають насёкомыхъ исключительно только на лету, гоняются за мухами, пчелами, стрекозами, и потому почти постоянно бывають въ движеніи, изрёдка только садятся для отдыха на землю, когда нётъ по близости деревьевъ, какъ это почти всегда случается въ степи. Нёкоторыя стада чибесовъ, намъ встрёчавшіяся, были такъ огромны и густы, что казались издали тучами, поднимевшимися на небёс

Верстахъ въ десяти ниже Херсона впадаетъ въ Днвпръ небольшая рвчка Ввлозерка, обросшая вербами и тростникомъ. Тутъ въ первый разъ опять, после долгаго времени, мы услышали голоса разныхъ пввчихъ птицъ; въ особенности громко раздавался голосъ большой очеретянки (Salicaria turdoides). На ввтвяхъ деревьевъ цвплялись малыя бълыя цапли (Ardea garzetta).

Городъ Херсонъ расположенъ на наклонной плоскости, которая отъ высокой степи спускается къ правому берегу Дивпра. Лучшія его улицы, отчасти даже мощенныя и обставленныя довольно густыми рядами домовъ, между которыми есть и каменные, находятся ближе къ ръкъ. Многочисленныя вътряныя мельницы окружаютъ городъ со стороны степи. На острову, отдъленномъ отъ города узкимъ руканомъ Дифпра, устроены большое шерстомойное заведеніе и паровая льсопильня. По серединъ города находится небольшой публичный садъ. Изъ магазиновъ и лавокъ многіе принадлежатъ Караимамъ. Двъ существующія въ городъ гостиницы неопрятны и лишены всякихъ удобствъ, такъ, что мы предпочли, на другой же день послъ нашего пріъзда, перейти на частную квартиру.

Г. директоръ Херсонской гимназіи З. В. Коленко, и также нъкоторые изъ гг. учителей гимназіи, съ которыми онъ насъ познакомиль, приняли насъ весьма радушно и старались всячески быть намъ полезными въ нашихъ занятіяхъ. Гражданскій губернаторъ, Действ. ст. сов. Претасьевъ і быль очень привътливъ и сдълаль распоряженія, чтобы опытные рыбопромышленники сообщили намъ всъ нужныя намъ сведенія. Два молодые юриста, окончившіе курсъ въ Университеть Св. Владиміра и состоявшіе на службъ въ Херсонт, явились къ намъ и любезно предложили свои услуги. Они же познакомили насъ съ кандидатомъ естественныхъ наукъ Харьковскаго Университета Расвскимъ, который находился чиновникомъ по статистической части при губернаторъ и который, горячо сомувствуя предмету нашихъ разысманій, старался всячески имъ содійствовать.

Дывпръ подъ Херсономъ не составляетъ одной нераздальной ръки, а раздробленъ на многіе рукава, которые, извиваясь и переплетаясь между собою различнымъ образомъ, образують множество острововъ различной формы и величины. Отрова эти, мозываемые плавнями, низменны, покрыты кустами и тростниками, по серединъ содержать озера и болота, и во время весенняго полноводія болье или менье затопляются. Плавни начинаются гораздо выше Херсона и простираются верстъ на 15 ниже его, до самаго лимана, такъ что Дивиръ открывается въ лиманъ многими проходами-примии. Озера и болота, занимающія середину плавней, остаются обыкновенно въ сообщении сържкою, посредствомъ одного или наскольнихъ проходовъ, даже во время самаго низкаго стоянія воды; но вмість съ тімь уже съ весны начинають заростать, въ особенности по краямъ, камышомъ и разными другими водяными травами. Вотъ эти то озера и болота и составляютъ для очень многихъ рыбъ, по преимуществу изъ семейства короповыхъ (Cyprinoidei), любимыя мъста для метанія икры. Они соединяють въ себъ не только важнъйшія удобства для самаго нереста тахъ рыбъ, какъ на примъръ незначительную глубину, затишье, высокую температуру воды, травяные стебли, къ которымъ могуть прилыпляться зерна икры, но также содержать богатый запасъ пищи для молодыхъ рыбокъ, выклюнувшихся изъ яичекъ,

<sup>&#</sup>x27; Скончался въ 1859 году.

то есть гнилыя растенія отъ предшествующаго года и множество мельчайших в животных и личинокъ. Поэтому плавни Днъпра играютъ весьма важную роль въбыту рыбъ, въ немъ обитающихъ, и на нихъ слъдуетъ обратить важнъйшее вниманіе при составленіи узаконеній о рыболовствъ. 1

Въ Херсонъ, подобно, какъ и въ другихъ городахъ, мы прилежно посъщали рыбный базаръ, присутствовали, по мъръ возможности, при самой ловлъ рыбъ различными снастями и наконецъ старались добыть върныя свъдънія о всъхъ рыбахъ, водящихся въ Днъпръ, отъ рыбопромышленниковъ и опытныхъ рыбаковъ.

Въ этомъ послъднемъ отношеніи намъ въ особенности быль полезенъ чиновникъ Херсонской Казенной палаты В. Г. Плевака, который самъ производилъ довольно значительную рыбную ловлю и былъ отлично знакомъ со всъми породами ръчныхъ рыбъ. На основаніи всъхъ нашихъ разысканій мы могли составить слъдующій списокъ рыбъ, встръчающихся или въ различныхъ рукавахъ Днъпра подъ Херсономъ, или же въ прудахъ, находящихся въ окрестностяхъ города:

- 1. Окунь весьма изобиленъ, какъ въ самомъ Дивпрв, такъ въ озерахъ и прудахъ.
- 2. Судакъ лиманскій (Lucioperca marina?) остромордый, почти безъ полосокъ, бываетъ въсомъ до 30 фунтовъ, приходитъ те реться въ ръкъ.
- 3. Судакъ ръчной (Lucioperca sandra) довольно изобиленъ, но ръдко въсить болъе 8 фунтовъ.
- 4. Секретъ (Lucioperca volgensis) также изобиленъ, наищаще вѣситъ отъ  $\frac{1}{2}$  до  $\frac{3}{3}$  фунта, рѣдко до  $\frac{1}{2}$  фунтовъ, медкій называется чопикомъ.
  - 5. Ершъ простой (Acerina vulgaris) не ръдокъ.
- 6. Ершъ—носарь или кальма (Acerina rossica) въ немногихъ только мѣстностяхъ, величиною подходитъ къ чопику, очень цѣнится для ухи.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Тростникъ, растущій на плавнихъ, осенью скашивается и привозится въ Херсонъ, гдѣ служитъ главнымъ топливомъ.

- 7. Бычокъ безъ воронки (Cottus gobio?) очень небольшаго роста, довольно рѣдокъ.
- 8—12. Бычки съ воронкою разныхъ сортовъ (Gobius platyce-phalus, gymnotrachelus, melanostomus, fluviatilis et marmoratus), мъстами въ значительномъ количествъ.
- 13. Колюшка (Gasterosteus platygaster) наичаще попадается въ Конкъ (такъ называется рукавъ Днъпра, протекающій подлъ Алешекъ.).
- 14. Менёкъ или налими (Lota vulgaris) ръдокъ, завозится сюда плотами, приходящими изъ за пороговъ Дивпра.
- 15. Сомъ весьма изобиленъ и очень измѣняется въ цвѣтѣ, смотря по возрасту, по времени года и по мѣсту жительства; трется въ концѣ Апрѣля или въ началѣ Мая, подъ берегомъ, въ промоинахъ, на старой травѣ, наичаще попарно, и самецъ остается лежать на икрѣ, пока не выклюнутся изъ нея молодыя рыбки. Когда идетъ по рѣкѣ, то выпускаетъ воздушные пузыри, которые выскакиваютъ на поверхность воды и такимъ образомъ обозначаютъ его путь. Молодой сомъ легко идетъ на удочку, на рыбокъ, а также на червяка.
- 16. Марина́ (Barbus fluviatilis) очень ръдка, только въ холодныя зимы попадается чаще.
- 17. Коропъ продолговатый (Cyprinus hungaricus) бываетъ въсомъ до 1 пуда.
- 18. Коропъ Дунайскій (Cyprinus carpio) короче и горбатве предъидущаго, въсомъ до 30 фунтовъ и больше, наичаще ловится зимою и весною, ръже лътомъ.
- 19. Коропъ-шаранъ въсомъ отъ 5 до 10 фунтовъ, черноватый, трется послъдній, подъ конецъ Іюля или въ началъ Августа. Иные рыбаки считаютъ шарана молодымъ Дунайскимъ коропомъ, а иные принимаютъ за самостоятельную породу.
- 20. Коропъ-подрыекъ (Cyprinus Nordmanni) въсомъ отъ 1 до 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> фунтовъ, блъдножелтый, тусклый, придерживается мъстъ болотистыхъ.
  - 21. Коропъ ставной ' (Carpio Kollarii) еще меньше подрыйка,

<sup>&#</sup>x27; Мы не имъли въ рукахъ Херсонскаго ставнаго коропа, но совершенно увъ-

близко подходить къ карасю, живеть почти исключительно только въ озерахъ и прудахъ (ставахъ).

- 22. Карась круглый (Carassius vulgaris) въ прудахъ, не ръдокъ.
- 23. Карась продолговатый (Carassius gibelio) въ прудахъ в озерахъ, изобильнъе круглаго карася.
- 24. Пука́съ (Rhodeus amarus) весьма изобиленъ, употребляется живцомъ для удочки.
  - 25. Линь (Tinca chrysitis) изобиленъ въ озерахъ и прудахъ.
- 26. Подустъ (Chondrostoma nasus) очень ръдокъ, такъ что иные рыбаки едва умъютъ отличать его отъ рыбца.
- 27. Головень (Squalius dobula) попадается весною, но лишь въ маломъ количествъ.
  - 28. Вырезубъ (Leuciscus Friesii) также довольно ръдокъ.
- 29 Тарань (Leuciscus Heckelii) ловится изобильно рано весною, до Благовъщенія, бълая, немного короче библицы; трется въ камышахъ и въ травъ.
- 30. Библица (Leuciscus rutilus) изобильна во всякое время, имъетъ красножелтыя глаза.
- 31. Чернука (Scardinius erytrophthalmus) доводьно изобильна во всякое время, трется въ Мав.
- 32. Вязь (Jdus melanotus) попадается во всякое время, но въ маломъ количествъ.
- 33. Бълизна (Aspius rapax) доходитъ въсомъ до 20 фунтовъ; крупная впрочемъ здъсь очень ръдка, поднимается выше въ Диъпръ, а мелкая изобильна во всякое время; трется на быстринъ, а потому неизвъстно съ точностію, въ какую пору.
- 34. Верховодъ крупночешуйный (Alburnus lucidus) изобиленъ во всякое время, часто употребляется живцомъ для удочки.
- 35. Верховодъ мелкочешуйный (Aspius clupeoides) по преимуществу весною.
- 36. Верховодъ полосатый (Alburnus Baldneri) попадается изръдка, въ маломъ количествъ; название быстрянки здъсь неизвъстно.

равы, что подържинь навваніемъ подразумъвается Сагріо Kollarii, твиъ болве что Сагріо Kollarii быль найденъ нами также и въ Крыму.

- 37! Чехонь (Pelecus cultratus) доходить ростомъ до 1 аршина, изобильна во всякое время, но ловится въ наибольшемъ количе- ствъ весною, съ половины Апръля до половины Мая:
- 38. Синецъ (Abramis ballerus), вограчается во всякое время, въ наибольшемъ количестве однако весною, когда приходить изъ лимана.
- 39. Клепецъ (Abramis sopa) идеть вивств съ синьцомъ, но всякую пору бываеть не радокъ.
- 40. Рыбецъ (Abramis vimba) наичаще попадается въ началь: Мая, во время нереста; пускаетъ икру на каменья и потому, чтобы приманить его на удобныя для ловли мъста, нарочно складывають для него подводныя, каменных гребли.
- 41. Лещь (Abranis brama) бываеть изобиленъ весною, начиная отъ Влаговъщенія до дня Св. Николая, трется разновременно, въ четыре пріема; на льто уходить ближе къ взморью.
- **42**. Густера́ или доскиря́ (Abramis blicca) бываеть постоянно въ большомъ количествъ:
- 43. Вьюнъ (Cobitis fossilis) чрезвычайно изобиленъ въ плавняхъ, гдъ ловля его производится по преимуществу зимою; въ последнюю зиму сотня вьюновъ продавялась по 1½ конъйки.
- 44. Сиковка (Cobitis taenia) держится преимущественно въ тъхъ рукавахъ Дивира, которыхъ дно заростаетъ травою (кошыремъ).
  - 45. Шука довольно изобильна, трется въ Мартъ.
- 46. Селедка вступаеть въ Дивпръ около Благовъщенія и ловян ен продолжается до конца Ман; сначала идетъ мелкан, потомъ средняя (подтумокъ) и наконецъ въ Мав крупнан. Гурты ен придерживаются главныхъ рукавовъ Дивпра, въ малые же рукава почти не заходятъ. Для ловли селедокъ употребляются по премиуществу плавныя свти, называемыя здъсь дребницами. Вывариваніе жира изъ селедокъ, столь употребительное по Волгъ, здъсь неизвъстно, а солятъ ихъ.
- 47. Игла (Syngnathus bucculentus) держится въ мъстахъ травянистыхъ и часто вытягивается вмъстъ съ травою, никуда не употребляется; окунь охотно ее беретъ.
  - 48. Бълуга очень ръдка.

- 49. Осетръ довольно часто ловится весною, но попадаетси и въ другія времена года.
  - 50. Севрюга редко изъ лимана заходить въ реку.
- 51. Чечуга или стерлядь встръчается чаще всякой другой красной рыбы; берется иногда на удочку.

Вообще количество красной рыбы, вступающей для тренія въ Днівпръ, очень незначительно; сравнительно гораздо боліве красной рыбы входить въ Бугь и въ Днівстръ. Весною 1845 года, когда вода въ Днівпрів, послів многоснівнной зимы, поднялась до неслыханной высоты, чрезвычайно много разной рівчной рыбы было снесено подъ Херсонъ, и потомъ рівка подъ Херсономъ оставалась весьма изобильна рыбою въ теченіи пяти лівть.

Недавно прорвался одинъ большой прудъ на Веревочной балкъ, впадающей въ Дивпръ, немного ниже Херсопа. Изъ него вышли въ Дивпръ во множествъ ставные коропы и караси и распространились по немъ верстъ на 40, но въ короткое время почти всъ сдълались добычою сомовъ. Вообще многочисленные сомы, водящіеся въ Дніпрів подъ Херсономъ, истребляють огромное количество другихъ рыбъ, и не даютъ такимъ образомъ слишкомъ имъ размножаться. Но все же плавни, какъ уже было нами замечено, соединяють въ себъ такія благопріятныя условія для развитія молодыхъ рыбокъ, что конечно уменьшение въ количествъ рыбы, на которое теперь начинають жаловаться въ Херсонв, не могло бы сдълаться ощутительнымъ, еслибъ не было тому другой причины. Причина же эта заключается безъ сомивнія въ употребленіи особыхъ рыболовныхъ снастей, называемыхъ котпами, которыми въ самыхъ плавняхъ безпощадно вылавливаются старыя рыбы, и вивств съ твмъ губится также молодой ихъ приплодъ. Котами называются особаго рода ловушки, которыя состоять изъ тростниковыхъ перегородокъ, расположенныхъ такимъ образомъ, что рыба, пробирающаяся между ними, доходить наконець до глухой камеры,

<sup>1</sup> Поэтому самому вкра привозится въ Херсонъ съ Дону, чрезъ Харьковъ, и также дорога, какъ въ Кіевъ, то есть фунтъ свъжей икры стоитъ до 1 руб., а паюсной икры до 75 копъекъ.

изъ которой никакъ уже не можетъ выйти обратно. Такими котами загороживаются ерики, посредствомъ которыхъ находящіяся на плавняхъ озера соединяются или между собою или съ ръкою, также небольшія річки и вообще всі узкіе водяные проходы. Коты устроиваются весною, во время нереста рыбъ, но потомъ не снимаются и въ продолженіи всего льта. Сначала хозяева осматривають свои коты ежедневно и вычерпывають изънихъ зашедшую туда рыбу, но потомъ обыкновенно уже ръже къ нимъ навъдываются или совсъмъ ихъ бросаютъ. Такимъ образомъ неръдко множество рыбы гибнетъ совершенно даромъ. Бываетъ также, что рыба въ самыхъ котахъ мечетъ икру, которая тутъ и пропадаеть. 1 Употребление котовъ запрещено закономъ, но къ крайнему сожальнію законь плохо соблюдается. Господинь Херсонскій губернаторъ конечно говориль намь, что сділаль распоряженія въ уничтоженію котовъ, но мы слышали, да и сами имъли случай въ томъ убъдиться, что распоряженія эти остались безъ исполненія.

Херсонскія плавни не только составляють истинные питомники для рыбь, но также служать лётними пристанищами для множества голенастыхь и водяныхь птиць; въ особенности многогисленны на нихь цапли различныхь видовь (Ardea cinerea, <sup>2</sup> purpurea, alba, garzetta, stellaris, comata, nycticorax) Попадаются также лопатни (Platalea leucorodia), но гораздо рёже. Г. Ельскій нёсколько разъ вздиль охотиться на большой Потемкинь островь, лежащій немного ниже Херсона и, кромів значительнаго числа различныхъ цапель, убиль также трехъ рыболововь (Larus ridibundus), двухъ зимородковъ (Alcedo ispida) и одного краснаго кобчика (Falco cenchris). По словамъ его зимородки и красные кобчики встрівчаются на Потемкиномъ островів во множествів.

Между жуками, собранными г. Ельскимъ въ окрестностяхъ

<sup>·</sup> Разсказывали намъ, что иногда даже утки, заплывшія въ коты, не могутъ

<sup>\*</sup> Сървя цапля (Ardea cinerea) здъсь бываетъ примътно ръже, нежели другіе виды.

Херсона, находились следующіє: Cicindela hybrida var. Sahlbergii Fischer, Chlaenius spoliatus Fabr., holosericeus Fabr. и sulcicollis ¹ Раук. (на берегу Дивира, подъ бревнами), Anatolica sp. (около Алешекъ, на песканъ), Pimelia subglobosa Pall. (тамъ же).

Еще мы не можемъ не замътить, что никогда и нигдъ намъ не случалось встръчать такаго множества мелкихъ паразитныхъ скакуновъ, или по нросту блохъ, какъ въ Іюлъ мъсяцъ въ Хероенъ. По всей въроятности одну изъ причинъ этого явленія должно ислать въ массахъ древесныхъ опилокъ, которыя накопляются въ Хероонъ и которыя, какъ извъстно, составляють самую благо-пріятную средину для развитія этихъ насъкомыхъ.

## 8. Повздка въ Алешки.

Изъ Херсона мы 22 Іюля, въ обществъ смотрителя Еврейскихъ училищъ Г. Я. Маковскаго, совершили повздку на лъвый берегь Дивира, въ Алешки. Дивиръ между Херсономъ и Алешками, состоить изъ трехъ главныхъ рукавовъ, изъ которыхъ самый большой, протекающій подъ самымъ Херсономъ, сохраняетъ названіе Дивира, средній называется Конкою, а третій, надъ которымъ стоять Алешки, именуется Чайкою. По прямой линіи отъ Херсона до Алешекъ будетъ едва ли болье 8 или 9 верстъ, но такъ какъ водяной путь извивается между плавнями, то наберется до 12 версть и переправа продолжается, даже при безвътріи, отъ полутора до трехъ часовъ, смотря по величинъ судна и по степени ловкости и усердія перевозчиковъ. Наичаще перевздъ совершается на небольшихъ плоскодонныхъ лодкахъ, которыя называются здёсь шаландами, частью помощью весель, частью бичеваніемъ. Для бичеванія проложены тропинки между тростникомъ, вдоль возвышенных окраинъ плавней, и оно идетъ очень оыстро; туть-то шаланщики и имъють случай выказать все свое усердіе. Мы совершили перевадъ, въ оба конца, также въ шаландъ и

<sup>·</sup> Chlaenius sulcicollis принимается обыкновенно за болье съверное насъкомое,

попадались нашь стада утонь, рыболововь, крачковь, цанель и разныхь куликовь, на всегда будеть составлять для нась пріявное воспоминаніе. Мистами мы находили также, по окраннямь плавней, окруженные со всёхь сторонь тростинкомь огороды, которые цапоминали намь объ Украинскихь оруктовыхь садахь, устроенныхь среди лиственныхь лисовъ.

Въ Алешкахъ насъ принять съ самымъ испреннимъ радушіемъ смотритель уфеднаго училища П. Р. Дуброва, и доставить намъ случай побеседовать съ двумя опытными Алешкинскими рыбаками, ноторыхъ показанія послужили значительнымъ пополненіемъ актіслогическихъ свёдёній, собранныхъ нами въ Херсоив.

Алешки небольшой увадный городъ, въ 3000 жителей, который расположень на левомъ песчаномъ берегу Чайки, составляющей самый восточный рукавъ Девира, и славится превосходными арбузами. Почти непосредственно въ городу примывають высокіе песчаные холмы, которые простираются далеко къюгу и къ юговостоку, вдоль дороги, ведущей на Перекопъ. Весь вообще узадъ, который называется впрочемъ не Алешинскимъ, а Дивпровекимъ, очень песчанисть. Онъ занимаеть продолговатый треугольникъ, который заключается между Дивиромъ и Переконскимъ заливомъ Чернаго жоря и оканчивается Кинбурнскою косою. Вдоль берега Анъпра и Дивпровскаго лимана находится иножество маленьких озеръ, обросшихъ тростникомъ, которые навываются созами, а далье во внутренности увада встрычаются ольховые льса, частью довольно общирные. Крестьяне Девпровскаго увада болве живуть въ отдъльныхъ, въ одиночку разбросанныхъ хуторахъ, нежели въ деревняхъ; только по берегу лимана тянется рядъ рыбачьихъ сель и находятся большія, хорошо устроенныя и богатыя имінія, принадлежащія гг. Куликовскому, Вассалу, Потье и Сень-При, въ южной части треугольника.

Намъ очень хотвлось объвкать южный берегь Дивировскаго лимана, чтобы ближе ознакомиться съ его знаменитыми рыбными заводами, но намъ сильно отсоввтывали предпринять это путечнествие. Съ одной стороны тамъ дороги трудныя, песчаныя, а съ

другой стороны еще продолжалось время усиленных полевых работь, такь что мы застали бы въроятно рыбные заводы опустымыми и сверхъ того встрътили бы величайшія затрудненія къ полученію потребных в намъ лошадей. На основаніи этих причинъ мы отказались отъ нашего намъренія и ограничились повздкою къ одному небольшому озеру въ окрестностяхъ Алешекъ, которов содержить на днъ толстый слой ила, очень сходнаго по составу съ грязью знаменитыхъ Крымскихъ озеръ. Спутниками нашими въ этой повздкъ были П. Р. Дуброва и пріятель его докторъ В. О. Зеленевичъ, который сильно стоялъ за цълебныя свойства Алешкинскаго озера и иломъ его пользовалъ своихъ больныхъ. Другое подобное же озеро находится нъсколько дальше къ югу, около Голой Пристани, и намъ говорили, что туда съвзжается иногда довольно значительное число больныхъ.

Когда мы находились у Алешкинскаго озера, то на южномъ небосклонъ показались темныя полосы, которыя мы сначала приняли было за поднимающіяся изъ за горизонта тучи; но видоизмъненія и передвиженія этихъ полосъ скоро возвъстили намъ, что то были огромныя полчища саранчи, которыя перелетали по направленію отъ запада къ востоку. Они занимали общирное пространство и поднимались на большую высоту, такъ что раздълявшія ихъ отъ насъ ольховыя рощи не могли ихъ заслонить собою. На другой день часть этой саранчи перелетъла на Днъпровскія плавни и сдълала даже вторженіе въ самый городъ Херсонъ.

На Алешкинскихъ пескахъ въ значительномъ числъ водится разноцвътная ящурка (Eremias variabilis). Красивая вта ящурка вообще довольно распространена по всей Южной Россіи и постоянно, по видимому, придерживается песчаныхъ площадей, поросшихъ молочаемъ. Въ подобныхъ мъстностяхъ мы находили ее уже прежде въ Полтавской губерніи по берегамъ Псіола и Ворсилы, въ Подольской губерніи около Саврани, а нынче встръчали также въ окрестностяхъ Николаева.

Еще я считаю пріятнымъ долгомъ упомянуть о томъ, что стараніями гг. Дубровы и Зеленевича въ Алешкахъ составился литературный кружокъ, въ которомъ выписывается довольно много журналовъ и газетъ.

## 9. Поъздка въ Очаковъ.

Такъ какъ планъ нашъ объбхать Дивпровскій увадъ разстроился, то мы положили употребить нъсколько дней для поъздки въ Очаковъ и Кинбурнъ, чтобы тамъ пополнить наши свъдънія касательно рыбъ, водящихся въ устъв Дивпра и подъ сввернымъ берегомъ Чернаго моря. Мы отправились въ Херсонскую контору Общества пароходства и торговли и тамъ узнали, что на пароходы Общества пассажиры въ Очаковъ принимаются, но что за върную высадку ихъ въ Очаковъ не ручаются, на томъ основани, что въ Очаковъ нътъ агента Общества. Чамъ объяснили, что обыкновенно изъ Очакова выъзжаетъ частная лодка для принятія пассажировъ къ брандвахтв, около которой кампанейскіе пароходы на нъсколько минутъ останавливаются, но что при большихъ волнахъ переходъ въ лодку бываетъ затруднителенъ, или даже невозможенъ и что въ подобномъ случав Очаковскимъ пассажирамъ приходится вжать въ Одессу. При такихъ обстоятельствахъ я решился вкать въ Очаковъ одинъ, а г. Ельскаго (и при немъ также нашего слугу) оставить въ Херсонъ, для охоты за цаплями и другими птицами, могущими послужить къ обогащенію Зоологическаго Кабинета Университета.

Я отправился въ Очаковъ 15 Іюля на большомъ кампанейскомъ пароходъ—Николаевъ. Пароходъ вышелъ изъ Херсона въ 8 часовъ утра и остановился у Очаковской брандвахты около половины втораго часа по полудни. Тамъ дъйствительно частная шлюпка ожидала Очаковскихъ пассажировъ, которы съ было впрочемъ немного, и такъ какъ погода стояла довольно тихая, то мы безпрепятственно могли перейти въ лодку и перевхать въ Очаковъ.



<sup>&#</sup>x27; Не могу не замѣтить при этомъ, что гг. агенты Общества пароходства и торговли, какъ миѣ иѣсколько разъ приходилось испытать, какъ то странно себя держатъ, не отличаются вовсе услужливостію и привѣтливостію, какъ бы слѣдовало отъ нихъ ожидать, а скорѣе разыгрываютъ роль важныхъчиновниковъ.

Очаковъ стоитъ на высркомъ мысу, которымъ общирный лиманъ Дивпра, по присоединения въ нему лимана Буга, отдъляется отъ открытаго моря. Подошва мыса окаймлена песчаною полосою, которая съ южной стороны расширяется и образуетъ довольно значительную, низменную площадь. На этой то площади была построена новая Очаковская кръпость, отъ которой остались теперь одивразвалины, послъ того, какъ она была взорвана въ 1855 году. Отъ старой Турецкой кръпости также еще существуютъ остатки на восточномъ склонъ мыса. Южная сторона Очаковскаго берега, параллельная Кинбурнской косъ и ближайщая къ взморью, называется морскою или чумною, восточная же сторона, обращенная къ серединъ лимана, называется лиманскою или практическою.

Очаковъ самъ по себъ не великъ, содержитъ не болъе 4500 жителей, но, какъ водится у насъ, значительно растянутъ, по причинъ разбросанности маленькихъ его домовъ. Между жителями находится много евреевъ, которые тутъ имъютъ и большую синагогу. Многіе мѣщане владъютъ хуторами въ степи и туда выселяются на лъто для полевыхъ работъ.

Такъ какъ въ Очаковъ нътъ вовсе гостиницы, то я помъстился у одного купца Л. И. Соловьева, который и сообщилъ мнъ, въ продолжении моего пребывания въ его домъ, много интересныхъ свъдъний, ибо самъ въ прежнее время содержалъ два рыбныхъ завода и вообще отлично знакомъ съ рыбною промышленностию края. Много полезныхъ указаний получилъ я также отърыбака Захара Зимы, состоявшаго во время послъдней войны старшиною вольныхъ матросовъ.

Изъ разсказовъ Соловьева, Зимы и нъкоторыхъ другихъ рыбаковъ и рыбопромышленниковъ и извлекъ слъдующіе результаты:

Изъ рѣчныхъ и лиманскихъ рыбъ очень немногія выходять за Кинбурнскую косу, въ открытое море, да и тѣ по возможности придерживаются токовъ прѣсной воды, а настоящей морской воды боятся, потому что слѣпнутъ въ ней. Къ такимъ рыбамъ принадлежатъ коропъ, тарань, шамайка и сомъ. Главная ловля тарани бываетъ зимою и раннею весною, подъ Очаковомъ уже начи-

нается осенью. Здёсь ее не коптить, какъ на Азовскомъ морё, а рёжуть на двё половины и солять. Сомъ въ лиманё бываеть не такъ многочисленъ, какъ выше въ Днёпрё, и рёдко вёсить более 2 пудовъ; въ море далёе Березянскаго острова, отстоящаго отъ Очакова версть на 10 къ западу, не заходить. Коропъ Дунайскій (Сургіпиз сагріо) очень широкъ, желтаго цвёта, вёсить до 45 и даже до 50 фунтовъ; поропъ лиманскій (Сургіпиз hungaricus) гораздо продолговатёе, меньше ростомъ, черноватый. Малые коропы вообще называются шаранами. Случается, что изъ рёкъ выносется въ лиманъ особые небольшів коропы, широкіе, горбатые, называемые подрыйками (Сургіпиз Nordmanni).

Другія же річныя рыбы, какъ на приміръ окунь, линь, лещь, густера, синецъ, клепецъ, рыбецъ, чехонь, бълизна, вырезубъ, чернуха, библица, щука, вовсе не оставляють лимана, и даже ръдко доходять до вершины Кинбурнской косы. Вольшею частью онъ въ продолжении лъта толкутся по камышамъ и ситнянамъ подъ Таврическимъ берегомъ и потомъ осенью начинають выходить въ открытый лиманъ. Только бълкана и отчасти чехонь придерживаются постоянно быстрины и на ней играють. Криворотая чеконь ппаче называется свистухою и говорять про нее, что она на Вога свищеть. Вырезубъ прежде хорошо ловился въ лиманъ, но теперь сталь довольно рідокъ. Морской судакъ иміветь морду острве противъ рвчнаго и кромв того чернве, доходитъ ввсомъ до 1 пуда. Ръчной судать бываеть бурый или сърый, буговой даже быловатый. Сепреть настоящая рыба лиманская, на льто конечно уходить въ ръки тереться, но къ осени опять возвращается, моря же боится; достигаетъ иногда въсомъ 3 фунтовъ.

Селедка тотчасъ послѣ разбитія льда изъ моря вступаеть въ лиманъ и оттуда далье въ ръки; мелкая называется пузинькомъ, крупная въсить иногда болье 1 фунта 1. Тюлька бываеть особенно изобильна въ Бугскомъ лиманъ. Сарделька (Alosa delicatula) воту-



<sup>1</sup> Молодыя селедки, которыя постояню живуть въ лиманъ, называются также лиманками.

паетъ неръдко въ устье лимана большими табунами, но такъ какъ ее не солятъ, то и не занимаются спеціально ловлею ея.

Семга (Salmo salar?) попадается довольно ръдко, не каждый годъ, бываеть въсомъ до 8 фунтовъ.

Бълуга заходитъ въ лиманъ осенью для зимованія, наичаще бываеть въсомъ отъ 10 до 15 пудовъ, но вообще встръчается въ маломъ только числъ. 1 Осетръ многочисленнъе бълуги, иногда идеть цълымъ гуртомъ, ръдко бываетъ въсомъ болъе 5 пудовъ. Севрюга довольно изобильна, ходить весною густыми гуртами, бываеть въсомъ до 1 пуда и 5 фунтовъ. Чечуга еще изобильнъе севрюги, также ходить гуртами, въсить вногда отъ 20 до 30 фунтовъ. Вся вообще красная рыба весною уходить въ реки тереться, и потомъ возвращается оттуда безъ икры. Въ моръ она распространяется кругомъ устья лимана версть на 40, до острова Тендры, а можеть быть и несколько далее, только чечуга въ море почти никогда не выходить. Визъ бываеть бълужій, осетриный, севрюжій и чечужій, но наичаще попадается бълужій, въсомъ около 12 фунтовъ, в и чечужій, въсомъ около 5 фунтовъ. В У визовъ носъ всегда бываетъ острве, нежели у соотвътственныхъ имъ простыхъ красныхъ рыбъ, то есть у бълужьяго виза носъ примътно остръе, нежели у самой бълуги, у осетринаго виза носъ длиневе, нежели у осетра, и такъ далве; но находятся еще и другія отличія въ самой ихъ рубашкі, въ особенности въ устройствів спинныхъ жучекъ. Поэтому очень въроятно, что они составляютъ особыя породы красной рыбы. Странно только то обстоятельство, что они всегда встръчаются въ одиночку, между гуртами другой красной рыбы, отчего и считаются ихъ вожатыми или князьками. Сверхъ того они никогда не бываютъ съ икрою, и потому принимаются иными рыбаками за ублюдковъ.

<sup>1</sup> Выважають иногда бить ее сандолями (остью) за Кинбурнскую косу.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Иногда впроченъ въситъ болве 1 пуда.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Также доходить нногда въсомъ почти до 1 пуда. Въ бытность мою въ Очаковъ быль пойманъ чечужій визъ, въсомъ въ 35 фунтовъ, рыбаками купца Елика, но когда я объ этомъ узналъ и хотълъ его купить, то онъ уже былъ отправленъ въ Одессу.

Между морскими рыбами первое мъсто занимаетъ баламутъ (Scomber scombrus), на ловлю котораго разсчитаны почти всъ приморскіе рыбные заводы. Онъ начинаетъ показываться у Кинбурнской косы наичаще около половины Мая и остается до Сентября, но приходитъ всегда уже оттертый. При морскомъ вътръ неръдко вступаетъ въ лиманъ и проникаетъ туда далъе Очакова; былъ даже годъ, что доходилъ до Николаева. Питается анчоусомъ и другими подобными рыбками.

Паламида (Pelamys sarda) бываеть иногда на взморьт въ значительномъ числъ, но въ лиманъ никогда не заходитъ, въ послъдніе годы вообще сдълалась ръдкою.

Цареградскій баламуть или тунець (Thynnus vulgaris), синій, съ полосками на брюхь, рьдко подходить къ свверному берегу. Здысь его не уміноть цынить и даже боятся его, потому что онь разгоняеть простаго баламута, притомъ же рыдко высить болье 6 фунтовъ.

Ставрида или ершикъ (Caranx trachurus) появляется ежегодно значительными гуртами, и очень цънится, по причинъ хорошаго мяса; въ нынъшнемъ году впрочемъ ея мало.

Морской волкъ (Xiphias gladius) походить мордою на севрюту, попадается ръдко и цъны не имъетъ.

Кефаль встрічается въ значительномъ количестві, но въ лиманъ рідко заходить, и то по преимуществу только мелкая. Неводомъ трудно ее ловить, такъ какъ она всегда старается изъ него выпрыгнуть. Большая ловля кезали производится на Кинбурнской кост, около села Покровки. Кефаль проникаетъ тамъ чрезъ ерики въ соленыя озера, гдт жируетъ въ продолжени льта. Ловится осенью, когда собирается выйти изъ озеръ обратно въ море.

Морской пътухъ (Trigla hyrax) всегда бываетъ въ маломъ количествъ, изръдка заплываетъ и въ лиманъ.

Долгулька (Atherina pontica) довольно изобильна въ мор'в и также въ устъв лимана.

Морской карась (Sargus annularis) ежегодно подходить къ съверному берегу, по въ лиманъ не бываеть.

Султанка, или барбуля (Mullus barbatus), прасная или съ прас-

ными пятнами, ростомъ не болье '/4 аршина, ловится въ большомъ количествъ за Кинбурнскою косою, попадается также и около самаго Очакова, на чумномъ берегу. Соленіемъ ея не занимаются и потому часто выбрасывають изъ неводовъ обратно въ море, такъ какъ свъжою довезти до Одессы не могутъ.

Морская камбала (Rhombus maeoticus) держится болье на взморьв, ръдко заходить въ лиманъ; въ нынвшнемъ году вообще ен мало, но выдавались такіе годы, что не знали, что съ нею дълать и бросали ее изъ неводовъ назадъ въ море. Настоящая ен ловля производится мережами.

Лиманская камбала или глосса (Platessa luscus) изобильна въ лиманъ и лътомъ и зимою, неизвъстно однако съ точностію гдъ и когда трется.

Морской языкъ (Solea nasuta) встръчается только въ маломъ количествъ и въ лиманъ не заходитъ.

Морская собака (Acanthias vulgaris) бываеть очень жирная и доходить иногда ростомь до 2 аршинь, но чаще гораздо меньше, высомь около 8 фунтовь, вы лимань весьма рыдко заглядываеть. Вы рыдкомы году столько ловилось собакь, на Кинбурнской косы и на островы Тендры, какы вы нынышнемы. Добывають иногда изы нихы сало, а шкуры снимають и употребляють для ворсования сукна.

Морской котъ (Trygon pastinaca), съ пилкою въ хвоств, довольно изобиленъ на взморьв, а въ одиночку заходитъ и въ лиманъ. Употребленія изъ него никакаго не дълаютъ, а бросаютъ назадъ въ воду.

Морская лисица (Raja clavata) попадается также довольно часто, но впрочемъ ръже морскаго кота.

Что касается до бычковъ, то они подъ Очаковомъ чрезвычайно многочисленны, но не имъютъ здъсь особыхъ видовыхъ именъ. Называютъ ихъ конечно, смотря по цвъту, бълыми, сърыми, черными, но точнымъ образомъ не различаютъ. Ловлею ихъ занимаются обыкновенно бабы и дъвки, съ помощію небольшихъ тканокъ или бредниковъ. Я многократно присутствовалъ при этой ловлъ, какъ на чумной, такъ и на практической сторонъ, и ви-

дъть, что наичаще попадаются Gobius platycephalus и Gobius fluviatilis, въсколько ръже Gobius gymnotrachelus и Gobius marmoratus.
Почти всегда двъ женщины съ бредникомъ, въ продолжении полутора или двухъ часовъ, успъваютъ наловить ихъ цълое ведро,
такъ что рыбки эти играютъ весьма важную роль въ экономическомъ быту бъдныхъ людей. Надобно при этомъ замътитъ, что
мясо бычковъ, въ особенности бълаго или ръчнаго, очень нъжно,
пріятно на вкусъ. Если непосредственно подъ Очаковомъ не встръчаются другіе виды бычковъ, то причина тому очевидно заключается въ отсутствій камней, составляющихъ любимое пристанище
многихъ изъ нихъ. Оба берега, и чумный и практическій, совершенно гладки, песчаны.

Вивств съ бычками попадають въ бредники и различныя другія мелкія рыбы, а именно: пуголовки, долгульки, султанки, тараньки, былизнячки, селедки, сардельки, тюльки, глоссы, иглы.

Двѣ рыбки, спеціально принадлежащія лиману, то есть пуголовка (Benthophilus macrocephalus) и сопачъ (Percarina Demidoffii) встрѣчаются въ значительномъ количествѣ, но въ пищу не употребляются, а выбрасываются; сопача здѣсь называютъ обыкновенно ершикомъ.

Иглы попадались двухъ видовъ, пухлощекая (Syngnathus bucculentus) и серебристая (Syngnathus argentatus). У многихъ мужескихъ недълимыхъ подхвостный пріемникъ еще былъ наполненъ янчками или только что выклюнувшимися изъ нихъ молодыми рыбками.

Мить говорили, что въ прежије годы также и морскіе коньки (Hippocampus guttulatus) встрвчались подъ Очаковомъ въ значительномъ числь, даже на практическомъ берегу, но что въ послъднее время сдълались гораздо ръже, лишь изръдка стали попадаться въ бредники. Въ слъдствіе того я наказалъ всталь женщинамъ, которыя занимались ловлею рыбъ бредниками, что если имъ случится захватить коньковъ, то чтобы приносили ихъ мит на квартиру къ купцу Соловьеву, при чемъ объщалъ имъ заплатить за каждую

<sup>&#</sup>x27; Gobius fluviatilis наибольше изобилуетъ на практической сторонв и бываетъ по большей части почти совершенно бълый (Gobius lacteus Nordmann).

штуку по 50 копъекъ серебромъ (цъдое ведро бычковъ онъ продають по 15 копъекъ). Въ самый день своего выъзда изъ Очакова я узналъ, что наканунъ дъйствительно были пойманы два конька, но брошены на берегу и пропали. Когда я спросилъ бабъ которымъ досталось поймать этихъ коньковъ, почему онъ не принесли ихъ и такимъ образомъ упустили случай заработать карбованецъ, то онъ отговаривались тъмъ, будтобы полагали, что я уже выъхалъ изъ города, другими словами оказалось, что онъ полънились пройти съ полверсты, для наведенія легкой справки. Вообще я въ продолженіи своихъ путешествій многократно имълъ случай убъждаться въ томъ, что лънь малороссійскаго народа къ совершенію какого нибудь дъла, хоть нъсколько выходящаго изъ круга обычныхъ занятій, доходитъ до крайнихъ предъловъ въроятности.

Еще я долженъ замътить, что присутствуя однажды утромъ при ловль рыбы бредниками на чумномъ берегу, я нашелъ между бычками и другими рыбками также одну небольшую зеленуху, принадлежащую виду (или върнъе разности) Crenilabrus Morellü Nordin, и при этомъ узналъ, что медкія зеленухи не составляютъ большой ръдкости подъ Очаковомъ. Фактъ этотъ совершенно новый, такъ какъ Палласъ и Нордманъ встръчали зеленухъ только при берегахъ Крыма.

Я сказалъ уже выше, что между всёми морскими рыбами, ловимыми подъ сёвернымъ берегомъ Чернаго моря, самое важное значеніе, въ промышленномъ отношеніи, имѣетъ баламутъ. Считню нужнымъ по этому поговорить нѣсколько подробнѣе объ этой рыбъ и о заводахъ, устроенныхъ для ловли ея.

Баламутъ или скомбрія (Scomber scombrus L.) служитъ типомъ особаго семейства жесткоперыхъ рыбъ—семейства скомбріовидныхъ или макрелевыхъ. Рыба эта имъетъ тъло веретенообразное, очень мелкую, едва примътную чешую, гладкія жаберныя кости и небольшіе зубы, расположенные на каждой челюсти въ одинъ рядъ. Кромъ двухъ плавниковъ спинныхъ и одного заднепроходнаго, на хвостъ, сверху и снизу, сидятъ по пяти плавниковыхъ лучей, не связанныхъ между собою перепонками, а образующихъ свободныя вислочки. Спина ярваго голубаго цвъта, съ поперечными черными полосами, брюхо серебристо-бълое.

Баламуть, не составляеть исключительной принадлежности Чернаго моря, а водится во множествъ почти во всъхъ Европейскихъ моряхъ. При съверо-западныхъ берегахъ Франціи онъ доходить, ростомъ до 2 футовъ, въ моряхъ же Средиземномъ и Черномъ ръдко бываетъ длиниве 1 фута. По причинъ жирнаго и вкуснаго мяса вездъ очень уважается и, почти на равнъ съ селедкою, играетъ весьма важную роль въ рыбной промышленности. смотря, на то однако до сихъ поръ неизвъстно съ точностію, въ какихъ мъстахъ и въ какое время года происходитъ нерестъ баламута, У съвернаго берега Чернаго моря онъ появляется обыкновенно, густыми табунами, около половины Мая и потомъ разгуливаетъ тутъ въпродолжени всего лъта, иногда до исхода Сентября мъсяца. Когда онъ приходить къ свверному берегу, то бываетъ уже оттердый, худой. Купецъ Соловьевъ, который содержаль нъскодько баламутныхъ заводовъ въ теченіи 17 літь, увіряль меня, что ему, никогда не приходилось видеть баламута съ икрою.

Главивите баламутные заводы расположены вдоль южнаго берека. Кинбурнской косы и на островъ Тендръ. 1 Невода, употребляемые для ловли баламута, имъютъ въ длину около 360 саженей (въ осадиъ 180) и въ вышину отъ 3½ до 4 косыхъ саженей. Они непремънно должны хватать до уровня воды, потому что мначе баламутъ, который всегда идетъ подъ самою поверхностю воды, можетъ весь изъ нихъ выйти. Каждый неводъ состоитъ изъ мотни, и шести пришивокъ (по три съ каждой стороны). Пришивки, ближайшія къ мотнъ, называются аперсовыми, за ними слъдуютъ среднія и потомъ крайнія или клешняки. Отдъльныя веревки именуются кадолами, и ихъ бываетъ шесть, соотвътственно



<sup>&#</sup>x27; Длинный и узкій островъ Тендра принадлежитъ господину Потье. На немъ находится множество озеръ, заростающихъ лѣтомъ тростникомъ, который и служитъ топливомъ для рыбаковъ. Считается на островѣ Тендрѣ до 15 рыб-ныхъ заводовъ.

числу пришивокъ; каждая кадола бываетъ длиною въ 60 саженъ. Мъсто, занимаемое рыбнымъ заводомъ, называется ставкою и берется на откупъ отъ владъльца землею. При каждомъ заводъ находятся холодникъ, кухня и пять будокъ или хижинъ, для помъщенія рыбаковъ.

Артель или тафа рыбаковъ въ каждомъ баламутномъ заводъ состоитъ обыкновенно изъ 16 человъкъ, атамана, двухъ крылашей или кадольщиковъ, кухаря, бондаря, засольщика и 10 лямщиковъ, или простыхъ рыбаковъ. Атаманъ набираетъ тафу и пользуется въ ней большою властью; онъ и ведетъ всъ переговоры съ хозниномъ завода. Условія между хозяиномъ и тафою бываютъ обыкновенно такія, что одна половина чистаго дохода, послъ вычета издержекъ на харчи, боченки, соль и тому подобныя потребности, достается хозяину, а другая половина тафъ. Эта послъдняя раздъляетъ потомъ свою половину на 16 равныхъ долей, изъ которыхъ приходится только одна и атаману, но за то атаманъ получаетъ другую долю, равную первой, изъ половины хозяина. Наемъ ставки, а также содержаніе строеній и рыболовныхъ снастей совершенно лежатъ на обязанности хозяина.

Всё распоряженія касательно ловли и соленія рыбы зависять вполнів отъ атамана, а потому расторопность его и знаніе діла имівють важное вліяніе на ходъ ловли. Ловкій атаманъ скоро пріобрітаєть славу между всёми рыбаками и всегда сможеть собрать въ короткое время хорошую тафу. Первое місто послів атамана въ тафів занимають крылаши, хотя и не пользуются особыми премиуществами; они бывають кандидатами на открывающіяся атаманскія міста.

Тафа нанимается обыкновенно отъ дня Св. Николая до Покрова. Она сама потребляетъ не малое количество баламута на харчи. Пока ловля идетъ плохо, рыбаки довольствуются борщомъ изъ кваса, приправленнымъ мелкими кусочками баламута, и такой борщъ у нихъ называется заминайкою; когда ловля пойдетъ лучше, то уже наполняютъ борщъ баламутомъ, изръзаннымъ въ крупные куски, и называютъ его сторчакомъ; наконецъ при удачномъ ходъ ловли варятъ борщъ подъ дужку, то есть густо набиваютъ котелъ цъльнымъ баламутомъ. Меня увъряли, что тафа изъ 16 рыбаковъ бываетъ въ состояни съъсть въ день до 500 штукъ баламута.

На Кинбурнской кост и на Тендръ вышки не употребительны, а узнають обыкновенно о приближеніи большихъ табуновъ баламута отъ птицъ, то есть отъ крячковъ и рыболововъ. Баламутъ питается исключительно мелкими рыбками, по преимуществу анчоусомъ и сарделькою (Clupea delicatula), а поэтому табуны баламута всегда савдують за табунами анчоусовъ и сарделекъ. Съ другой стороны анчоусы и сардельки составляють также любимую пищу врячковъ разныхъ видовъ, которые и выотся постоянно въ несметномъ числе надъ табунами этихъ рыбокъ. Рыболовы въ свою очередь ищуть болье крупной добычи и потому охотятся предпочтительно за баламутомъ. Такимъ образомъ, когда подходить къ берегу табунъ анчоусовъ или сарделекъ и за нимъ табунъ баламута, то всегда извъщають объ этомъ безчисленные крячки и рыболовы, которые съ крикомъ надъ ними летаютъ и безпрестанно окуниваются въ море за добычею. Нередко также случается, что табуны баламута бывають преследуемы морскими свиньями (дельфинами) и морскими медвъдями (тюленями).

Тюлени впрочемъ не часто доходять до сввернаго берега. Соловьевъ помниль только о двухъ, изъ которыхъ одинъ былъ пойманъ въ неводъ на Тендрв, а другой убитъ на Березянскомъ островв.

Табуны баламута бывають иногда такъ огромны, что случается захватить въ одну тоню отъ 10,000 до 50,000 штукъ и даже больше. Приведу здёсь разсказъ Л. И. Соловьева объ одномъ знаменитомъ лове баламута на Кинбурнской косе и только сожалею, что не могу передать его отъ слова до слова, со всёми подробностями, такъ онъ былъ любопытенъ и занимателенъ.

"Лѣтъ съ двадцать тому назадъ содержалъ я два рыбныхъ "завода на Кинбурнской косъ. Случались небольше ловы бала "мута, въ 15000 и въ 25000 штукъ, въ Петровку, но съ тъхъ "поръ, по самый Сентябрь мъсяцъ, баламутъ болъе не показывался. "Около 6 Сентября пристали ко мнъ рыбаки, чтобы я ихъ рас-пустилъ, такъ какъ не надъялись болъе на появлене баламута и

"хотъли отправиться для заработокъ на соленыя озера. Я иогь "ихъ удержать не иначе, какъ объщавъ простить долги, накопив-"шіеся у нихъ за харчи, и выдать каждому, въ случав неудачи, по "15 рублей ассигнаціями въ обратный путь на родину. Положеніе "мое было очень непріятное: не говоря уже о томъ, что я ничего "не выручиль съ своихъ заводовъ, мев приходилось еще, въ слу-"чав, еглибъ не было лова до конца, заплатить рыбакамъ оноло "500 рублей ассигнаціями, что составляло для меня не бездълицу. "Жилъ я самъ въ Очаковъ и каждый день поджидалъ доброй въдсти съ своихъ заводовъ, но когда наступило 15 Сентября, и все "еще баламутъ не показывался, то мив стало тяжело на душъ и "я не зналъ отъ безпокойства что и предпринять. Только вижу поднажды утромъ, а именно 21 Сентября, что сосъдъ мой, еврей "Ицко, который также имълъ рыбный заводъ на Кинбурнской косъ, вышель на улицу и съ большимъ оживленіемъ и видимою радостью пустился разсуждать съ другими евреями. Я выбъжалъ въ нему, "чтобы спросить о причинъ его радости, и узналъ, что наканунъ пристые табуны баламута подошли къ Кинбурнской косъ, и что дна заводъ Ицка поймано до 40,000 штукъ; однако объ уловъ на "моихъ заводахъ онъ никакихъ извъстій не могъ мнъ сообщить. "Тутъ уже завладьло мною совершенное нетеривніе и я рышихся втотчасъ же самъ переправиться на Кинбурнскую косу. На мою "бѣду стоялъ сильный вѣтеръ и лодочники не брались меня перевести въ Кинбурнъ, но наконецъ мнв удалось получить мъсто »на большомъ дубъ, который отправлялся въ Кинбурнъ со скотомъ для одного мив знакомаго Кинбурнскаго разника. Переправа продолжалась часовъ шесть и то мы не могли пристать къ самому "Кинбурну, а снесло насъ версты на двъ ниже. На берегу ръзпникъ поджидалъ свой дубъ и когда увиделъ меня, то закричалъ мнъ на встръчу, что върно радость не дала мнъ усидъть въ Очадковъ и заставила по такой погодъ поспъшить въ Кинбурнъ, что-"бы поскорње расцъловать своего беззубаго Щербину (Щербиною "звали атамана одного изъ моихъ заводовъ). Можете себъ пред-"ставить, какъ при такихъ словахъ забилось у меня сердце и какъ ля бросился распращивать рызника о значенім его словъ. Онъ

"долго не върилъ, чтобы я ничего не зналъ и ръшился на пере-"вадъ изъ одного нетерпвнія, а наконецъ разсказаль, что бала-"мутъ появился вдоль Кинбурнской косы огромными табунами, "такъ что ловъ почти на всёхъ заводахъ былъ весьма хорошій, "но что всвхъ другихъ атамановъ превзощелъ распорядительностію тмой Щербина, который захватиль въ одинъ заходъ несмътное вколичество рыбы. Поблагодаривъ ръзника за пріятное извъстіе, "я поспъшиль въ Кинбурнъ и тамъ зъщель въ корчму, чтобы "справиться, не пришла ли подвода съ моихъ заводовъ, которые "находились около села Покровки, почти въ 15 верстахъ отъ крапости. Корчмарь также уже слышаль о счастливой ловлъ на молихъ заводахъ и весело меня привътствовалъ; но каково же было "мое изумленіе, когда всябдъ за тъмъ въбхалъ на дворъ молодой "парень, съ одного моего завода, и на мои горячіе распросы ни-"чего не могъ мив разсказать, ничего не въдалъ о благополучномъ "оборотъ дълъ. Сначала было я совсъмъ смъщался и пришла миъ "мысль, что ръзникъ и корчмарь скверно надо мною подшутили, "но потомъ узналъ, когда обстоятельные сталъ допытывать пария, "что онъ уже два дня тому назадъ тронулся съ завода и былъ "уже однажды въ Кинбурнъ, но, не заставъ тутъ ожидаемыхъ дотъ меня събстныхъ припасовъ, выбхалъ опять за крепость по-"пасти воловъ; теперь же явился въ корчму вторично, чтобы дсправиться, не пришли ли отъ меня прицасы. Такимъ образомъ донь действительно находился въ полномъ неведени касательно происшествій предидущаго дня. Вмість съ нимъ я въ тоть же "вечеръ отправился на свои заводы и нашелъ, что уловъ пре-"взошель самыя смълыя мои ожиданія. На заводъ, ближайшемъ въ Кинбурну и состоявшемъ въ въдъніи атамана Березняка, было "поймано баламута около 50,000 штукъ, а на дальнемъ заводъ, на "которомъ распоряжался атаманъ Щербина, едвили не до 150,000 "штукъ. Полное число баламутовъ, пойманныхъ на последнемъ "заводъ, трудно было и узнать. Такъ какъ рыбаки сами не могли тсправиться съ огромнымъ количествомъ рыбы, то вызвали на пиомощь жителей ближняго села Покровки, которымъ и надобно рбыло отдать значительную часть ея. Могу только сказать, что "выгрузка баламута изъ невода продолжалась почти двое сутокъ, "и что 400 пудовъ соли, бывшихъ въ запасъ на обоихъ заводахъ, "едва хватило для посоленія рыбы."

"Ловкость и расторопность атамана Щербины выказались при "этомъ случав въ полномъ блескв. Утромъ 20 Сентября онъ вы-"шелъ на песчаную губу, которая находилась въ близкомъ раз-"стояніи отъ моего завода и далеко вдавалась въ море. Туть "онъ скоро догадался, по тучамъ птицъ, приближавшимся къ губъ, "что идетъ наконецъ давно ожидаемый баламутъ, и поспъшилъ "возвратиться на заводъ. Надобно однако замътить, что два чу-"жіе рыбные завода стояли между губою и моимъ заводомъ. Про-"ходя мимо этихъ заводовъ Щербина не показалъ никакой торопливости, а напротивъ того подшучивалъ съ знакомыми ему "рыбаками и такимъ образомъ не подалъ имъ никакаго знака "тревоги. Когда онъ пришелъ наконецъ на свой заводъ, то "самымъ хладнокровнымъ образомъ сталъ делать все нужныя распопряженія, такъ что неводъ быль набрань и все готово какъ разъ "къ тому времени, когда голова огромнаго табуна баламутовъ "вышла изъ за губы и стала приближаться къ заводу. И тутъ "онъ не далъ своимъ нетерпъливымъ рыбакамъ вывхать на встрвчу "кърыбъ, а заставилъ ихъ ждать, пока голова табуна не прошла "мимо, и тогда уже скомандовалъ заходъ. Такимъ образомъ была "захвачена его неводомъ самая середина табуна и вышла удача "неслыханная. Что же касается до двухъ заводовъ, ближайшихъ "къ губъ, о которыхъ я упоминалъ, то на нихъ рыбаки были за-"стигнуты въ расплохъ появленіемъ баламута и успъли только по-"пользоваться хвостомъ табуна."

Цъна баламута зависить отъ его величины и качествъ. Лътній баламуть бываеть худой и мелкій и называется инбрикомъ (по гречески чирусъ), осенній же, въ особенности тотъ, который ловится въ Сентябръ мъсяць, годаздо крупнъе и жирнъе. За 1000 штукъ соленаго лътняго баламута платятъ на мъсть отъ 8 до 10 рублей, а за 1000 шктукъ осенняго отъ 20 до 30 рублей; въ военное время цъна 1000 штукъ доходила даже до 40 рублей. Покупаютъ баламута по преимуществу евреи, которые отправ-

дяють его на ярманки въ Вознесенскъ и въ Балту. Въ продажт онъ извъстенъ болъе подъ названіемъ Кинбурнской или Очаковской селедки. Соль для соленія баламута, ловимаго на Кинбурнской кость и на Тендръ, получается съ соленыхъ озеръ, которыя тянутся вдоль берега Егорлицкаго залива, къ востоку отъ села Покровки, и извъстны подъ названіемъ прозноя. Пудъ соли стоитъ на мъстъ 24½ копъйки серебромъ.

Въ продолжение четырехъ дней, проведенныхъ мною въ Очаковъ, баламутъ дважды показывался въ устъв лимана, между чумнымъ берегомъ Очакова и Кинбурнскою косою, но скоро опять
уходилъ въ море. <sup>2</sup> За то сардельки, преслъдуемыя баламутомъ,
цълыми стадами бросались къ берегу и во множествъ были пойманы бредниками. Въ оба раза, когда баламутъ приближался къ
Очакову, я выходилъ на берегъ и тутъ имълъ случай полюбоваться
безчисленнымъ множествомъ крячковъ (Sterna nigra et macroura),
которые носились надъ поверхностію лимана и производили на
полеть самыя разнообразныя эволюціи; болье вдали виднълись
также многочисленные рыболовы (мартины), которые очевидно
пренебрегали мелкими сардельками и придерживались табуна баламутовъ.

Вообще однако ловля баламута въ этомъ году шла довольно плохо. Было поймано на каждомъ изъ Кинбурнскихъ заводовъ къ исходу Іюля мъсяца отъ 40,000 до 50,000 штукъ, тогда какъ въ другіе годы уловъ простирается обыкновенно, къ тому же сроку, до 100,000 штукъ. При мнъ приходилъ даже одинъ еврей, хозяинъ завода, къ Очаковскому городничему, съ жалобою о томъ, что нанятые имъ рыбаки собпраются разойтись, не хотятъ долъе оставаться на заводъ.

Въ самомъ лиманъ ловля рыбы производится двумя главными способами, неводами и мережами. Лиманскіе невода имъютъ въ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ маломъ количествъ баламутъ привозится и въ Кіевъ, въ особенности во время контрактовъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> За нѣсколько дней до пріѣзда моего въ Очаковъ, а именно 20 Іюля, густой гуртъ баланута входилъ въ самый лиманъ.

длину отъ 500 до 800 сажень и должны итти по дну, но могутъ не касаться поверхности воды, такъ какъ бываютъ предназначены для рыбы, болъе придерживающейся глубины, какъ то судака, севрюги, чечуги и глоссы. Мережи употребляются почти исключительно для ловли красной рыбы и заходящей въ лиманъ камбалы.

Почти вся цънная рыба, ловимая подъ Очаковомъ, отправляется тотчасъ въ Одессу, такъ что Очаковскій базаръ бываеть чрезвычайно скуденъ рыбою.

При ловив рыбъ бредниками всегда также вытаскивается на берегъ огромное множество маленькихъ раковъ, въ особенности горбуновъ (Palaemon elegans et adspersus) и прыгуновъ (Amathía carinata); изръдка попадаются и крабы (Carcinus moenas).

На широкой песчаной губъ, на которой находятся развалины Очаковской кръпости, во множествъ водились удоды и шурки (Merops apiaster), которыя уже собирались въ большія стада, для скораго отлета.

У моего хознина, Соловьева, быль маленькій садъ, обсаженный акаціями, тамариндами, яблонями и грушами. Въ этомъ саду на высокомъ столбів быль устроенъ скворечникъ съ 14 камерами. Такъ какъ я замітилъ, что почти во всіхъ камерахъ гніздились теперь воробьи, то распросиль на этотъ счетъ Соловьева и узналъ, что скворцы, успіввъ въ теченіи весны и літа вывести и выкормить три поколівнія молодыхъ, оставили городъ около 15 Іюли. Они прилетаютъ ежегодно подъ конецъ Февраля или въ началів Марта, тотчасъ выгоняють изъ своихъ жилищъ воробьевъ, выбрасывають ихъ гнізда и приступають къ свитію своихъ собственныхъ гніздъ. Такимъ образомъ скворцы занимаютъ скворечникъ ежегодно около 4 місяцевъ, а въ остальное время уже пользуются имъ воробьи.

Прежде возвращенія въ Херсонъ мив очень хотвлось побывать на Кинбурнской косв, чтобы тамъ осмотрвть несколько баламутныхъ заводовъ и провхать, если окажется возможнымъ, до села Покровки, гдв производится ловля кефали, но погода такъ мало благопріятствовала моему намеренію, что я былъ вынужденъ отъ него отказаться. Скоро по полудни 26 Іюля произошла силь-

нам бура, съ грозою и дождемъ. Гроза конечно скоро кончилась, но кръпкій, порывистый вътеръ продолжаль дуть до 29-го числа, когда инъ слъдовало състь на Кампанейскій пароходъ, шедшій изъ Одессы въ Херсонъ, чтобы не оставаться въ Очаковъ еще цълую недълю.

Почти вой небольшія купеческія суда, вышедшія въ послёднію дни изъ Херсопа и Николаева, остановились подъ Очаковомъ и выжидали тутъ прекращенія бури, чтобы потомъ уже пуститься въ открытое море. Ихъ собралось такимъ образомъ довольно значичельное число и лиманъ являлся очень оживленнымъ. Красотъ картины, представляемой лиманомъ, очень содъйствовали два линейные корабля, котя и не вполнъ оснащенные, которые стояли между Очаковомъ и Кинбурномъ. Они должны были отсюда пройти въ Севастополь, тамъ окончательно оснаститься и потомъ отправиться въ Балтійское море. Жителямъ Очакова впрочемъ продожилительная стоянка двухъ линейныхъ кораблей при устъв лимана была не совствъ пріятна, такъ какъ съвстные припасы, привозимые на Очаковскій базаръ, значительно оттого вздорожали.

Въ полдень 29 Іюля я сълъ на частную шлюпку и вывхалъ тъ брандвахтъ ожидать прибытія Компанейскаго парохода, который и не замедлиль явиться; къ б часамъ вечера я быль опять въ Херсонъ.

Еще я долгомъ считаю замътить, что карта западной Россіи Шуберта (столистовая), которую я имъль при себъ, содержить довольно значительныя погръшности касательно острововъ или клавней Дибира, простирающихся между Херсономъ и лиманомъ. Не могу однако сказать, вкрались ли въ нее эти погръшности при самомъ ея составленіи, или произопіли въ слъдствіе значительнаго преобразованія, въ ковъйшее время, самыхъ плівней.

### 10. Бериславъ.

При прівзді моємь въ Херсонь я нашель, что г. Ельскій въ продолженіи моєго отсутствія приготовиль около 15 шкурокъ итиць, въ особенности различных цапель, и значительно увели-

чиль свой гербарій. На другой день мы отправили въ Кіевъ, чрезъ посредство г. директора Коленка, большой тюкъ съ сухими растеніями, передали на сохраненіе другія наши коллекціи г. Раевскому и приготовились къ продолженію нашего путешествія въ Крымъ.

Изъ Херсона на Перекопъ ведутъ двѣ дороги, одна чрезъ Алешки, другая чрезъ Бериславъ. Первая конечно 30 верстами короче, но очень песчаниста, а потому мы предпочли ѣхать чрезъ Бериславъ, тѣмъ болѣе, что желали получить нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія о рыбахъ Днѣпра отъ Бериславскихъ рыбаковъ.

Мы вытхили изъ Херсона утромъ 31 Іюля и того же дня, въ пятомъ часу послъ объда, прибыли въ Бериславъ. Отъ Херсона до Берислава считается 69 верстъ и дорога тянется вдоль праваго берега Дивпра, большею частью однако степью и въ значительномъ разстояніи отъ ръки. Въ двадцати верстахъ выше Херсона впадаетъ въ Дивпръ довольно значительная ръчка Ингулецъ, которой долина занята садами и рощами. Чаще другихъ птицъ попадались намъ по пути кобчики (Falco tinnunculus, vespertinus, сепсъті), удоды, сиворакши и щурки; въ особенности послъднія мъстами встръчались въ огромныхъ стадахъ. Для всъхъ этихъ птицъ, подобно какъ между Одессою и Николаевымъ, и здъсь также столбы и проволока электрическаго телеграфа служили любимыми мъстами отдыха.

Заштатный городъ Бериславъ или Бериславль живописно раскинутъ на высокомъ правомъ берегу Днъпра; берегъ этотъ, на вышинъ приблизительно 70 футовъ, сначала образуетъ широкій уступъ, а потомъ уже полого поднимается въ степь. Поперегъ чрезъ городъ протекаетъ ручей, который въ разстояніи 200 или 300 шаговъ отъ Днъпра вертикально падаетъ внизъ въ глубокій оврагъ и образуетъ такимъ образомъ красивый водопадъ. Стъны оврага и самый обрывъ, съ котораго падаетъ ручей, состоятъ изъ известняковыхъ слоевъ различной толщины и плотности. Утверждаютъ, что на томъ мъстъ, гдъ стоитъ нынче Бериславъ, находился въ древности большой греческій городъ Мелитополь и потомъ въ средніе въка Саркелъ, столица Хазарскаго Царства, но

во всякомъ случав нынвшній Бериславль не сохраниль, сколько мы могли видеть, ни следовъ своего древняго происхожденія, ни остатковъ прежняго своего величія; теперь даже не соглашаются, къ величайшему огорченію городничаго, переименовать Бериславъ изъ заштатнаго города въ увздный.

При южной оконечности Берислава всё рукава Днёпра, которые немного выше довольно многочисленны и образують рядь острововь и плавней, сходятся въ одно общее русло, гдё лётомъ наводится плавучій мость. На южномъ же концё города находится и почтовая станція. На станціонномъ дворё намъ бросился въ глаза огромный запась прессованнаго сёна (въ видё кубическихъ штукъ, обхваченныхъ желёзными обручами). По справкё оказалось, что сёно это было куплено въ Крыму отъ Французовъ, еще въ 1856 году, и до сихъ поръ вполяё сохранило питательность. Мы видёли впрочемъ уже и въ Херсонё, около берега рёки, большіе стоги французскаго прессованнаго сёна.

Въ Бериславъ намъ рекомендовали стараго рыбака Денисенка, какъ лучшаго знатока своего дъла, и дъйствительно онъ заслуживалъ такую рекомендацію, сколько можно было судить по бесъдамъ, которыя мы съ нимъ имъли. Со словъ его мы записали, по занимавшему насъ дълу, слъдующія замътки:

- 1. Окунь довольно изобиленъ, бываетъ въсомъ до 5 фунтовъ, производить терло въ Мартъ, почти одновременно со щукою.
- 2. Судакъ доходитъ ростомъ до пяти четвертей, въсомъ почти до 1 пуда, трется въ Апрълъ, раньше леща. Лиманскій судакъ приходитъ тереться въ ръку, но едва ли отличенъ отъ Днъпроваго. Судакъ не можетъ жить въ мутной водъ; доказательствомъ тому можетъ служить то явленіе, что съ мъсяцъ тому назадъ много судаковъ пропало, когда ръка, послъ большихъ проливныхъ дождей, сильно замутилась.
- 3. Секретъ бываетъ въсомъ до 3 фунтовъ, трется въ одно время съ судакомъ, любитъ мъста песчаныя.
- 4. Кальманъ или кальма (Acerina rossica) не доходить въсомъ до 1/2 фунта, держится предпочтительно по песчанымъ косамъ, трется въ первыхъ числахъ Апръля; имъетъ мясо нъжнъе противъ ерша.

- 5. Ершъ очень изобиленъ, трется около того же времени; обыкновенно 10 ершей идутъ на 1 фунтъ.
- 6. Бычковъ находится три сорта; называють ихъ также бобырями.
- 7. Колюшки попадаются наичаще въ мъстахъ цесчаныхъ, но не составляютъ предмета ловли.
- 8. Менёкъ (Lota vulgaris) встръчается въ маломъ числь, ръдко въсить болье 1/2 оунта.
- 9. Сомъ чрезвычайно изобиленъ, доходитъ въсомъ до 8 дудовъ, подобно судаку иногда пропадаетъ отъ мутной воды; трется въ Апрълъ на затопленныхъ лугахъ, въ особенности на гниломъ сънъ, при чемъ обывновенно собирается ихъ 5 или 6 штукъ вмъстъ.
- 10. Коропъ круглый (Cyprinus hungaricus) доходитъ иногда ростомъ до пяти четвертей и въсомъ до 1 пуда и 25 фунтовъ.
- 11. Коропъ шировій (Cyprinus carpio) достигаеть въ длину болье <sup>8</sup>/<sub>4</sub> аршина, въ ширину до <sup>1</sup>/<sub>2</sub> аршина, въсомъ до 45 оунтовъ; встръчается гораздо ръже предидущаго.
- 12. Коропъ-шаранъ, немного горбоватый отъ головы, доходитъ въсомъ до 4 фунтовъ.
- 13. Коропъ-подрыекъ (Cyprinus Nordmanni) подобенъ шарану, ръдво бываетъ болъе '/, аршина, водится и въ Днъпръ и въ озерахъ, даже въ самыхъ ничтожныхъ, изобиленъ также въ каменистыхъ ръчкахъ.
- 14. Карась, и широкій и продолговатый, водятся въ плавняхъ, доходять въсомъ до 4 фунтовъ.
- 15. Линь также держится въ плавняхъ, бываетъ въсомъ въ 4 фунта, отличается большою живучестію.
- 16. Марина (Barbus fluviatilis) въ прежнее время водилась изобильно, такъ что до 50 штукъ ловилось въ одну тоню, нынче же очень ръдка, попадается отъ 5 до 6 штукъ въ теченіи года.
- 17. Пукасъ или малявка (Rhodeus amarus) довольно изобиленъ (название малявки дается впрочемъ разной мелкой рыбъ).
- 18. Подустъ находится въ достаточномъ количествъ, трется въ Апръдъ. Очень скоро портится отъ теплоты.

- 19. Вырезубъ бываетъ въсомъ до 10 фунтовъ, но очень ръдокъ, такъ что неизвъстно, когда и трется.
- 20. Тарань (Leuciscus Heckelii) начинаетъ иногда подниматься по ръкъ уже въ Октябръ, оттирается очень рано, еще до Благовъщенія, и опять уходитъ въ лиманъ; нынче впрочемъ замътно уменьшилась въ количествъ противъ прежняго времени. Она болъе библицы и доходитъ въсомъ до 5 и даже 6 фунтовъ.
- 21. Библица (Leuciscus rutilus) довольно изобильна, ръдко въсить болъе <sup>1</sup>/<sub>2</sub> фунта, трудно отличаема отъ тарани, немного только круглъе и свътлъе; трется также довольно рано весною.
- 22. Чернуха (Scardinius erytrophthalmus) довольно изобильна, доходить въсомь до 3 фунтовъ.
- 23. Вязь или язь довольно редокъ и потому неизвестно, когда трется, ловится и въ сети и на крючки, иметъ желтоватое мясо.
- 24. Головень довольно изобилень, трется въ первой половинъ Мая, доходить въсомъ до 10 фунтовъ.
- 25- Бълизна въ значительномъ числъ, въсомъ до 15 оунтовъ, трется на быстринъ, тотчасъ послъ Благовъщенія.
- 26. Верховодъ или живенъ изобиленъ, ловится преимущественно зимою, чтобы служить насадкою на удочку для секрета. Верховодовъ находится впрочемъ два сорта, одинъ бълый, длинный (Alburnus lucidus), другой короче и плотнъе, съ черными черточками. (Alburnus Baldneri).
- 27. Овсянка (Aspius owsianka) меньше пукаса, довольно изобильна. Ловять ее зимою подсаками и продають ведро по 30 копъекъ.
- 28. Лещь или лящь изобилень, бываеть высомь оть 7 до 10 оунтовъ, начинаеть тереться съ половины Апрыля и трется именно въ три пріема, отчего и называють одного вербовикомъ, другаго провикомъ и третьяго никольникомъ. Никольникъ крупные другихъ и терло его самое густое.
- 29. Густера едва достигаетъ въса 3 оунтовъ, оттирается въ первой половинъ Мая; мелкая называется лоскиркою.
- 30. Рыбецъ изобиленъ во всякое время, бываетъ въсомъ въ 2 фунта, въ нынъшнемъ году терся съ 6 по 15 Мая, виъсть съ 14

головнемъ. Въ Бериславъ ни у кого нътъ коптильни для рыбца и потому ограничиваются вяленіемъ его. Попадается иногда *чустыр*най рыбецъ, котораго считаютъ ублюдкомъ отъ густеры и рыбца; у него тъло густеры, а цвътъ и вкусъ рыбца.

- 31. Синецъ въ прежнее время былъ чрезвычайно изобиленъ, такъ что вытягивали его до 50,000 штукъ въ одну тоню, но съ 1850 года замътно сталъ убывать въ поличествъ, подобно многимъ другимъ рыбамъ; трется въ началъ Апръля. Различаютъ впрочемъ три сорта синьцовъ, самый крупный доходитъ въсомъ до 4 фунтовъ.
- 32. Клепецъ замътно ръже синьца, никогда не случалось захватывать болъе 1000 штукъ въ одинъ заходъ, трется вмъстъ съ синъцомъ, но ръдко въсить болъе 1 оунта. Свъжій клепецъ не дуренъ на вкусъ, но онъ очень утлый, скоръе всъхъ другихъ рыбъ портится отъ теплоты.
- 33. Чехонь изобильна во всякое время, но никому съ точностію не извъстно, когда трется, бываеть ростомъ болье <sup>3</sup>/<sub>4</sub> аршина.
- 34. Вьюнъ въ Дивпрв очень редовъ, но изобиденъ въ гиивыхъ рвчкахъ.
  - 35. Сиковка (Cobitis taenia) встрачается въ маломъ числа.
- 36. Пескарь (Cobitis barbatula) короче и кругате выюна, дер-
- 37. Щука находится въ достаточномъ количествъ, доходитъ въсомъ до 1 пуда, трется очень рано, въ Мартъ.
- 38. Оселедецъ или сельдь приходитъ терется около половины Апръля; въ нынъшнемъ году было его мало. Его солятъ. Различаютъ три сорта сельдей, изъ которыхъ среднему, въ 5 вершковъ ростомъ, даютъ названіе подтумокъ.
- 39. Тюлька (Alosa cultiventris) очень ръдко доходить до Берислава, только весною, въ полноводіе.
- 40. Игла (Syngnathus bucculentus), иногда также называемая здёсь сиковкою, твердая, четыреугольная, сёраго цвёта, ростомъ до 1/4 аршина, держится въ тинистыхъ мёстахъ, ловится иногда волочеми и употребляется наживкою на окумя.

- 41. Бълуга попадается изръдка, весною; третьяге года быда веймана одна въ 29% пудовъ.
- 42. Осетръ встръчается гораздо чаще бълуги, преимущественно весною, но впрочемъ и въ другія времена года; бываетъ въсомъ въ 4 пуда. Употребляются для ловли его и невода и самоловы.
- 43. Пестрюга (Accipenser stellatus) имъеть очень длинный пость, встръчается довольно редко и то обыкновенно не тяжелье 15 сунтовъ.
- 44. Севрюта (Accipenser sp.?) имъетъ носъ тупой, какъ у осетра, а сложеніемъ и шишками походить на пестрюгу, также попадается ръдко и въсить обыкновенно не болье 15 оунтовъ.
- 45. Чечуга довольно изобильна съ половины Апръля по конецъ Мая, идетъ густыми гуртами и оттирается, кажется, по косамъ; бываетъ въсомъ до 15 фунтовъ.

Костентики начинають показываться въ Сентябръ; одни походять на осетриковъ, другіе на пестрюгь, третьи на стерлядокъ. Иногда попадается ихъ въ съть такое множество, что трудно бываеть ее очистить отъ нихъ.

Визъ или вожей бываетъ у многихъ рыбъ гуртовыхъ, у чечуги, тарани, леща, клепца. Онъ отличается обыкновенно цвътомъ отъ предводимой имъ рыбы, не имъетъ икры, не годится въ пищу и потому выбрасывается, когда попадется.

Случается иногда, что до Берислава доплывають и морскія свиньи (дельфины).

Невода, употребительные въ Бериславъ, содержатъ отъ 7 до 11 пришивокъ (2+5, 3+5, 4+7), изъкоторыхъкаждая имъетъ въдлину около 30 сажень.

Стоячка или мережа всегда бываетъ ръдкая (состоитъ изъ крупныхъ ячей) и употребляется на большую рыбу, леща, бълизну и имъ подобную.

Поръжная или плавная съть бываетъ тройная, въ серединъ густая, снаружи ръдкая.

Изъ всъхъ рыбаковъ, съ которыми намъ случалось бесъдовать въ продолжение нашего путешествия, Денисенко былъ единствен-

ный, находившій нужнымъ ограниченіе рыбной ловди. Разсуждая съ нами о томъ, что количество рыбы въ послёднее время замётно стало уменьнаться, онъ самъ оть себя высказаль мысль, что слёдуеть обратить вниманіе на это явленіе и постановить правила, которыя могли бы нёсколько предохранить рыбу отъ безпощаднаго ея истребленія. По миёнію его надлежало бы въ особенности ограничить рыболовство въ теченіе мёсяцевъ Марта, Апрёля и Мая, чтобы дать рыбё возможность спокойно оттереться, а также запретить вовсе на лётнее время употребленіе вентерей, котовъ и другихъ подобныхъ снарядовъ, губительно дёйствующихъ въ мёстахъ нереста.

# часть сторая.

Путешествіе по Таврическому полуострову.

## 1. Отъ Берислава до Симферополя.

Рано утромъ 1-го Августа мы по мосту перебхали чрезъ Дивиръ и чрезъ полчаса достигли оживленнаго торговаго мъстечка Каховки, которое находится отъ Верислава въ 5 верстахъ, и стоитъ почти насупротивъ его, на вознышенномъ уступъ лъваго берега ръки, раздъленной туть на два рукава. Отъ Каховки до Перекопа считается около 80 верстъ и дорога продегаетъ довольно ровною степью, такъ что мы прибыли въ Перекопъ въ 2 часа по полудни. На вывъскъ трактира, въ которомъ мы остановились пообъдать, мы прочли название Новый Свить и преняли это за доброе предзнаменованіе, при вступленіи на любопытный полуостровъ, куда давно уже уносились впередъ наши мысли. Самый трактиръ впрочемъ поразиль насъ новостью только въ томъ отношения, что оказался настоящимъ великороссійскимъ, со щами, квасомъ и чаемъ, какаго мы ни въ одномъ изъ городовъ Херсонской губерніи не встречали. По пути изъ Каховки въ Перекопъ намъ попадались многочисленныя стада мериносовъ, составляющихъ богатство смежособенно же Ангальть - Кетена, переныхъ степныхъ имвній, шедшаго нынъ во владъніе колониста Фейна. 1 Стада мериносовъ постоянно сопровождались огромными стаями скворцовъ, которые или на самыхъ овцахъ, или между ними ловили насъкомыхъ, служащихъ имъ въ пищу. Изъ другихъ птицъ наичаще встречались намъ различные жаворонки, щурки, тиркушки, чибесы и крячки. На нъкоторыхъ станціяхъ мы осматривали гнъзда ласточекъ-стриж-



т Колонисту Фейну нынче принадлежить значительная часть степей Переконскаго увзда. Говорили мив, что у него находится до 300,000 мериносовъ, а у другаго богатаго колониста Филиберта до 160,000 мериносовъ.

ковъ (Hirundo urbica) и очень были удивлены темъ, что находили въ нихъ еще птенцовъ, не впсинъ онеренныхъ. Много конечно требовалось старанія со стороны старыхъ, чтобы кав прокормить и взростить въ такое позднее время года. День стояль очень жаркій и никогда еще прежде глаза наши не были такъ часто обманываемы призраками, просаводимыми нижними, раскаленными слоями степнаго воздуха, какъ въ этомъ пути. Безпрестанно намъ представлялись общирныя озера, окаймленныя или отдёльными деревьями или цълыми рощами, а подъфдешь ближе-озера исчезають, мнимыя деревья обращаются въ курганы или стоги свиа, вивсто рощи находишь чумацкій обозъ, расположившійся на отдыхъ по сторонамъ широчайшей дороги. Десять разъ такимъ образомъ обманываешься и думаешь: нътъ, уже впредь не впаду въ новое заблужденіе, а туть накъ разъ стадо воловъ, пасущихся на степи, пріймень за сады дальней деревни. Всв отдаленные, выдающеся предметы какъ то приподнимаются, отделяются отъ земли, и вивств съ твиъ принимають извилистыя очертанія.

Перекопъ (Ор-гани, золотыя ворота татаръ) небольшой, но довольно опрятный увздный городъ, украшенный нъсколькими каменными, казенными строеніями. Главное значеніе его въ настоящее время заключается, кажется, въ томъ, что туть находится въдомство соляныхъ дёлъ и соляная застава, гдё повёряется количе. ство соли, вывозимой чумаками съ Крымскихъ соленыхъ озеръ. Длинные обозы чумаковъ съ юга безпрестанно подходять въ Перекопу и загромождають собою окрестности соляной заставы. Перекопъ находится не по серединъ перешейка, получившаго отъ него свое названіе, а ближе къ восточной его сторонь, такъ что до Сиваша будеть отъ него 2 или 3 версты, а отъ залива Чернаго моря около 8 верстъ. Довольно высокій земляной валь тянется поперегь и оставляеть свободный провадь только чрезъ самый городъ. дають, будто бы въ ясные дни бываеть видна изъ Перекопа южнокрымская горная цёнь, но во всякомъ случать это должно случаться очень ръдко. Въ день нашего провзда чрезъ Перекопъ небо было безоблачно, а между тъмъ отъ пыли и паровъ, наполнявшихъ воздухъ, видимый горизонть являлся весьма тёснымъ.

Намъ говорили въ Перекопъ, что въ Сивашъ вътъ никакой рыбы, <sup>1</sup> а въ оконечной части залива Чернаго моря встръчаются одни только бычки.

Мы оставили Перекопъ въ четвертомъ часу послѣ обѣда и направились къ югу прямо на Симферополь. Въ немногихъ верстахъ за Перекопомъ находится мѣстечко Армянскій-базаръ, въ которомъ нроизводится довольно общирная торговля всевозможными товарами, потребными чумакамъ; далѣе слѣдуютъ къ сторонѣ Сиваша въсколько соленыхъ озеръ и потомъ уже дорога поднимается на возвышенную, ровную степь сѣвернаго Крыма.

Тотчасъ за Перекопомъ стали попадаться намъ то свободно пасущіеся, то запряженные въ длинные фургоны верблюды, которые и показали намъ, что мы вступили въ землю татаръ. Странныя эти для непривычнаго глаза животныя то поднимаютъ прямо вверхъ свои горбы, то нѣсколько склоняютъ ихъ или совсѣмъ свѣшиваютъ на одинъ бокъ. Крымскіе татары предпринимаютъ на нихъ довольно далекія путешествія, и такимъ образомъ мы имѣемъ удовольствіе видѣть ихъ ежегодно въ позднюю осень въ Кіевѣ, съ возами, нагруженными виноградомъ и яблоками.

Крымская степь была еще болье оживлена птицами, нежели степи Херсонскія. По дорогь вездь бъгали и перелетывали разные жаворонки, между которыми въ особенности были изобильны жаворонки степной и короткопалый (Alauda calandra et brachydactyla); удоды, сиворакши и щурки также придерживались окраинъ дороги и проведеннаго подль нея электрическаго телеграфа; стада дрохвъ и стрепетовъ расхаживали по степи и останавливались тревожно при стукъ приближавшагося экипажа; надъ полями носились луни (Circus cyaneus et pallidus), плавали въ воздухъ коршуны (Milvus ater) и трепетались соколики; на курганахъ сидъли гордые орлы (Aquila fulva et imperialis), и какъ бы незнакомые съ дъйствіемъ ружейныхъ выстръловъ, подпускаки насъ къ себъ на самое близ-



¹ По показаніямъ Радде до Джунгарскаго полуострова доходятъ кефаль, двъ камбалы (въроятно глоссы) и одна игла (въроятно Syngnathus bucculentus). См. Bulletin des Naturalistes de Moscou. T. XXVIII. p. 159.

кое разстояніе; быстролетныя тиркушки во множествъ кружились во всъхъ направленіяхъ, огромныя стаи грачей и галокъ занимали окрестности селъ.

Отъ Перекопа до Симперополя считается 133 версты. желая прівхать въ Сямферополь среди ночи, мы остановились на нъсколько часовъ на станціи Три-обламы, въ 40 верстахъ отъ Симферополя, и уже на разсвътъ 2 Августа собрались въ послъдній путь до города. При самомъ выходъ со станціи предстала намъ предъ глаза южно-крымская горная цепь, резко обграниченная лучами восходящаго солнца. Величественный видъ ея произвелъ на насъ глубокое, радостное впечатление и навсегда врезался въ нашу память. Въ особенности мы долго не могли налюбоваться на Чатырдагъ, который мы прежде видели на рисункахъ и теперь тотчасъ узнали. Утро это было для насъ однимъ изъ пріятнъйшихъ въ нашемъ путешествін, свъжія надежды въ насъ разгорълись и разлили красоту на всв окружающие насъ предметы. Татары казались намъ племенемъ очень интереснымъ и села ихъ живописными, пыльная степь потеряла для насъ свою монотонность. Долина Салгира, которой мы скоро достигли, своею свъжею зеленью, своими садами и рощами, сквозь которые проглядывали красивые хутора, совершенно насъ очаровала. Вследъ за темъ, на возвышенной террась льваго берега Салгира показался самый Симферополь и, переправившись два раза вбродъ чрезъ Салгиръ, мы вътхали въ городъ, въ самомъ веселомъ расположени духа, въ 8 часовъ утра.

#### 2. Симферополь.

Симферополь (792 фута надъ уровнемъ моря) состоитъ изъ двухъ разнохарактерныхъ частей, старой и новой. Старая или юговосточная часть есть прежній Акмечеть Крымскихъ татаръ, въ которомъ имълъ пребываніе Калга-султанъ, намъстникъ Хана. Эта часть города и до сихъ поръ почти исключительно населена татарами. Узкія, извилистыя улицы пролегаютъ между каменными стъ

нами, которыми почти совершенно заслоняются и закрываются отъ любопытныхъ взглядовъ небольшіе дома, обитаемые татарскими семьями; тамъ и сямъ видивется стройный минаретъ и служитъ какъ бы сторожомъ окружающихъ его дворовъ. Новая или съверозападная часть, на русскій уже ладъ, содержитъ улицы прямыя и широкія, обставленныя многооконными домами, одноэтажными и двухэтажными. Почти въ центръ этой части города, на четыре-угольной площади, окруженной тънистымъ бульваромъ, находится широко-купольная соборная церковь. Съ съверной стороны, на самомъ берегу Салгира, устроенъ довольно красивый публичный садъ. На восточномъ концъ города расположенъ военный гошпиталь и нъсколько далъе, на высокомъ холмъ, обращенномъ къ Салгиру, находятся развалины какой то старинной кръпости, можетъ быть даже Скиеской, называемой татарами Керменчикъ.

Южную оконечность города занимаетъ общирная базарная площадь, которая по утрамъ представляетъ обыкновенно очень оживленное и интересное зрълище. Туда являются съ своими произведеніями татары горные и татары степные, нъмецкіе колонисты и русскіе огородники: длинными рядами (въ Августъ мъсяцъ) тянутся пирамидальныя кучи арбузовъ, дынь, огурцовъ, лука, капусты, помидоровъ, баклажанъ, моркови, свеклы, хръна, картофеля, стручковаго перца и другихъ овощей, или же груды винограда, яблокъ, сливъ и вообще разныхъ фруктовъ и ягодъ.

Между этими рядами остаются съ одной стороны дорожки, на которыхъ толиятся покупатели, а съ другой стороны широкіе промежутки для пом'вщенія разпородныхъ повозокъ, запряженныхъ лошадьми, верблюдами и волами. Повсюду говоръ и шумъ, вездъ раздается оглушительный крикъ татарскихъ продавцовъ, почти безпрерывно раздираются уши пронзительнымъ скрипомъ немазанныхъ колесъ. Удобно можно тутъ изучить физіономію и одежду татаръ, можно ознакомиться со многими ихъ обычаями, на примъръ видъть, какъ они приготовляють на открытомъ воздухъ любимыя свои яства, какіе пріемы употребляють для подкованія воловъ и такъ далье. Вообще Симферопольскій базаръ, въ особенности въ такъ называемые базарные дни, бываеть такъ занима-

стедень, при поучителень, поучителень, по заклуживаеть подное, вывывые путепинественняя поучителень постои по в выпости се по резентення в по-

ягены: Мы избрали Симферодоль, по причина удобнаго вго положенія, прентромъ для нашихъ экскурсій по завадному и южному в берепамън Крымани такимъ побразомъ возвращались въ него ивпспокыхопразът Саный благосклонный, пріемътбыль сдудань намъ со голороны военнаго губернатора и пенеральнией тенанта г. Г. В. и Жуковскаго, съ которымъ и имълъ насть быть анакомымъ нъкогда ввъ С. Детербургъ. Очень много полезныхъ и интересныхъ онъправий от от применения применени управы дляторъ. Арентъ почтенный пилобеаный старецъ годранияный живую дюбовь къ естестванный приначаний директоръ димназіц А. И. Смоленскій и пинспекторъ гимназіц (ИзиТ. / Тихоміровъзудвандидатъ "Университета "Св. "Владиміра», быди чрезвычайно в речиния и лиотребили всь зависація отраних средства и чтобы , савдать, пребываніе въ Симоерополь, для, насъ пріятнымъ и спосць--они со советь нашимь занятівить. Они же довнавомили насъ со мнолими изътгр. учителей гимназіи, ревностно трудящихся, да своемъ (тяжеломъ поприщв. Учитель естественныхъ наукъ С. А. Бобровскій, не давно только определенный къ своей должности, усправ Аже потожить прекрасныя начала для коллекци живолных в входашихъ въ составъ Крымской фауны. Изъ другихъ лицъ, съ которыми мы успъли познакомиться въ Симферополъ, старадись намъ быть полезными въ нашихъ разысканіяхъ въ особенности Правитель губернаторской канцеляріи И. О. Яновичь, Опружной начальникь министерства государственныхъ имуществъ Н. И. Ивановъ и мододой подпоручикъ И. С. Чехъ, служившій прежде на Кавказъ ... (адьютантомъ въ Самурскомъ полку.)

Между небольшими ръками Таврическаго подуострова, которыя почти всъ вытекають изъ южныхъ его горъ, Салгиръ занимаеть первое мъсто. Онъ беретъ свое начало на съверной сторонъ Чатырдага, направдяется къ съверозападу и непосредственно за Симферополемъ выходитъ въ степь, потомъ около села Сърабузъ дълаетъ полуоборотъ на съверо-востокъ, принимаетъ въ себя пъсколько другихъ ръчекъ, какъ на примъръ Зую и Карасу, и

напоченъ вливается въ Сивашъ. Количество воды въ новъ был васть: онень изминчиво, смотря по времени года и по погоды, по вообще къ концу лъта почти всегда весьма незначительно, едва достаточно для потреблюстей садовъ и огородовъ, наполниющихъ его долину. Твиъ не менве однако вода Салгира, по причинво сильного его поденія, постоянно течеть быстро и громко журчить: между мелкими каменьями, которыми усвяно его песчанов руслозмъстами только, въ крутыхъ изгибахъ русла, гав успели обравони ваться болье или менье глубокія вымонны, ослабляется быстроча. теченія. Подобный же характерь являють почти всё другія реки Крыша, и потому очень остественно, что въ нихъ могутъ обитатъ только такія рыбы, которыя любять воду прохладную, быстротечную и дно каменистое или песченое. Намъ кавалось однако. что вамътки о Крымскихъ пръсноводныхъ рыбахъ, разсъянный въ сочинениять Палласа. Ратке и Нордмана, слишкомъ коротки и веудовлетворительны, и потому мы старались пользоваться всякамъ: представляющимся намъ случаемъ, чтобы получить более подробныя сведенія въ эт мъ отношенія. Для этой цели мы каждый равъ, когда приважали въ Симферополь, отправлялись по утрамъна базаръ и тщательно пересматривали привозимую туда свъжую рыбу. Въ продолжени лъта никакая морская рыба, въ свъжемъ видь, въ Симферополь не провозится, а бываеть въ продажь только рыба, ловимая въ Салгиръ и въ Альмв, также изъ нъкоторыхъ прудовъ, находящихся по близости города, и изръдка изъ Карасу: Количество ен вообще бываеть небольшое и всегда скоро расхватывается покупателями, въ особенности по пятницамъ евреями, но мы нашли между нею гораздо болье породь, нежели какъ ожидали. и въ томъ числъ нъсколько такихъ, которыя или вовсе еще не были описаны или новы для фауны Европейской Россіи. Вотъ именно перечень встух породъ рыбъ, встръченныхъ нами на Симферопольскомъ базаръ.

1. Король продолюватый, Сургания hungaricus Heck. Онъ при возится на базаръ довольно часто, по свидътельству продавцовъ, именно изъ Карасу. Видънные нами экземпляры имъли незначительную величину, ръдко доходили въсомъ до 2 или 3 фунтовъ

но вполнъ подходили подъ описаніе, сдъланное гг. Гекелемъ и Кнеромъ въ превосходномъ ихъ сочиненіи о пръсноводныхъ рыбахъ Австріи.

- 2. Коропъ карасевидный, Carpio Kollarii Heck. Между карасями, привозимыми въ Симферополь, намъ случилось найти одинъ экземпляръ этой рыбы, длиною въ 6 ч. Коропъ этотъ отличается отъ всъхъ другихъ короповъ необыкновенно короткими губными усиками и кубковидными глоточными зубами, расположенными съ каждой стороны въ два ряда (4/1—1/4); сверхъ того и тълосложеніемъ составляетъ переходъ къ карасямъ. По всей въроятности онъ завезенъ въ Крымъ и распложенъ въ Салгирскихъ прудахъ, вмъстъ съ карасями, изъ Херсонской губерніи (гдъ, кажется, и называется ставнымъ коропомъ).
- 3. Карась продолюватый, Carassius gibelio Bl. Такъ какъ Паддасъ говоритъ положительно, что въ Крыму нѣтъ карасей, то
  должно полагать, что рыба эта разведена тамъ въ недавнее время.
  Къ сожалѣнію однако мы упустили изъ виду навести на этотъ
  счетъ точныя справки, и потому можемъ только сказать, что въ
  настоящее время караси должны водиться изобильно въ нѣкоторыхъ
  близкихъ отъ Симферополя прудахъ, потому что часто привозятся
  туда на базаръ въ достаточномъ количествъ. Видѣнные нами экземпляры большею частію имѣли очень продолговатое тѣло, такъ что
  подходили въ этомъ отношеніи къ виду, описанному Гекелемъ подъ
  названіемъ Carassius oblongus, отъ котораго однако отличались складомъ головы и меньшими глазами. Мы полагаемъ, что они составляютъ лишь мѣстную разность вида Carassius gibelio, который, будучи искуственно вездѣ разводимъ, подлежитъ весьма значительнымъ измѣненіямъ ¹.
- 4. Марина усатая, Barbus fluviatilis Cuv. Марина водится изобильно въ Салгиръ, въ Альмъ и въроятно также въ другихъ Крымскихъ ръчкахъ. На Симферопольскій базаръ она привозится ежедневно и иногда въ значительномъ количествъ. Видънные нами

<sup>&#</sup>x27; Нъкоторыя подробности объ этомъ предметъ изложены въ моей статьъ о рыбохъ, водящихся въ водахъ губерній Кіевскаго Учебнаго Округа.

экземпляры большею частію были довольно малы, но продавцы намъ говорили, что попадаются иногда и очень крупные.

- 5. Пескарь рычной, Gobio fluviatilis Cuv. Небольшая эта рыбка также водится изобильно почти во всёхъ рёчкахъ Таврическаго полуострова. Крымскій пескарь составляетъ какъ бы особенную мёстную разность, въ томъ отношеніи, что имёсть въ грудныхъ плавникахъ по 17 лучей, а въ брюшныхъ часто по 9.
- 6. Лещь черноголовый, Abramis melanops Heck., чрезвычайно походить на рыбца (Abramis vimba) и потому въ Крыму даже называется рыбцомъ (отъ котораго однако отличается не только черноватою головою, но и менъе выдающимся носомъ). Онъ впрочемъ довольно ръдокъ и намъ удалось добыть одинъ только экземпляръ изъ Салгира, имъвшій въ длину немного болъе 7<sup>4</sup>.
- 7. Уклея мелкочешуйная, Alburnus mentoides Nob. Уклейка эта чрезвычайно сходна съ тою, которая описана Гекелемъ, подъ названіемъ Alburnus mento: такое же продолговатое тъло, такая же выдающаяся нижняя челюсть, на вершинъ примътно утолщенная, таже мелкая чешуя. Мы вообще нисколько не усомнились бы въ тождествъ нашего Alburnus mentoides съ Alburnus mento, еслибъ Гекель, извъстный своею необыкновенною точностію, не приводилъ между отличительными признаками своего вида недостатокъ междужаберника (interoperculum). У нашего же Alburnus mentoides междужаберникъ существуетъ. Кромъ того Гекель насчитываетъ въ боковой линіи у Alb. mento отъ 60 до 62 чешуй, а у Alb. mentoides мы находили въ боковой линіи отъ 63 до 70 чешуй.

Уклея медкочешуйная принадлежить къ числу самыхъ обыкновенныхъ рыбокъ въ Салгиръ и въ Альмъ, а потому водится въроятно и въ другихъ Крымскихъ ръчкахъ. На Симферопольскій базаръ приносятъ ее ежедневно и называютъ ее тамъ верховодомъ. Очень странно поэтому, что ни Палласъ, ни Нордманъ ръшительно



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Надобно впрочемъ замѣтить, что г. Валансьень (Cuvier et Valenciennes, Hist. nat. des poissons. XVII. 271), описывая Alburnus mento, не упоминаетъ о недостаткъ междужаберника и приводитъ для боковой линіи отъ 65 до 70 чешуй, такъ что потребны во всякомъ случаъ дальнъйшія разъясненія.

но приоменяють объщней. Изъ многочисленных веделимых пемес измъренныхът самое, большое, имъто: въздлину 6 1/2 дюйновъз выхва BELLE VILLER MEEDUVECKAR, Albannus taurious Nob. Brokyth Merkoчожкуйнымъ уклеекъ, изъ Салгира, попались намъноднажды двъ рыбки: по триосложению съ ними очень скодния, но триъ не менее совершенно, отъ никъ отличныя, принадлежащія другому виду, окольког намъ извъстно, также еще веописанному, ноторому мы и делинави званіе уклен таврической, Alburnus taurious. У таврической уклен нимняя челюсть выдается впередъ почти также сыльно, пракъ/уп уклен мелкочешуйной, но на вершинъ гораздо менъе утолицена... Кромъ того у ней чещуя крупиве (54 жли 55 чещуй въ боковой. линіи), глаза меньше, заднепроходный нлавиикъ примътно корояе. (содержитъ всего отъ 13 до 14 дучей). Одинъ изъ добытыхъ: нами эксемиляровъ ниветъ въ дличу ополо 6 дюймовъ, другой З Дюйма. whater "cold of profile supplied in

и также называли ее верховодомъ.

9. Уклен патичетая, Albumus maculatus Nob., принадлежить по группъ ипрокихъ уклеевъ, съ черными черточнами по сторонемы боковой линіи, для которой типомъ можеть служить Alb. bipunctatus, L., и въ которой относятся также Alb. Baldneri Val. и Alb. (Aspius). fasqiatus Nordin. Пятнистая уклея чрезвычейно сходна, какъ по тълосложенію, такъ и по цавту, съ подосатою уклеею Норджана, найденною имъ въ ръчнахъ Абхазіи, но отличается отъ этой пот слъдней числомъ глоточныхъ зубовъ, болье мелкою челичею жи нъкоторыми другими признавами.

У пятиистой увлеи глотонных зубовъ находится оъ одной стороны 2/5, съ другой 2/4; число чешуй въ боловой линіи простирается отъ 47 до 50; спинной плавникъ, назади завругленный, содержитъ 11 лучей, и заднепроходный отъ 14 до 17 лучей. На основной части чешуй (пяти рядовъ, лежащихъ надъ боковою линіею, и двухъ рядовъ, лежащихъ подъ боковою линіею) находятся треугольныя пятна, составленныя изъ точекъ чернаго пигмента. Изъ многочисленныхъ недълимыхъ, нами разсмотрънныхъ, самое большое имъло въ длину около 41/4 дюйма.

и оди Мылнаходили патанстую унлейку понти ожедневно на Самоероопольскомъпбоваръ, пхотя п въменьшемъ поличествъ противълуклей (мелкоченцийной...: Продавны говорым дамь, чтолова водитов на въ ..Святиры и эъпрупикопрания но впрочемъ на внаги для жея 4) попроводи контру почоски, наквинаски отвеннодоро оранавины онавидот Головень римной. Squalius alobula ... встрачаетов изобильно въ Салиръ, Карасу, Альив. и вообще, пивств съ марилою, сооприводь главную рыбу Крымских рачека Крымскій головонь имирительной приментири в применти в приментири в применти в приментири в применти «Дийстрф и о воторомь подробно обыко мною поверено вънстать в -одону динеской детемно вольно в при . (рыхж. мыслидыци, на Симферопольскомъ. базарь, предко: бывали присту п**болье. 10 дюймовь** он ангромови од аправи бол гол хова (пай джалуйц дунаэмица Дина вниродого определения определения в сто пполобио покъ намоначніе, тамь празличныхъ, уклеекъ і ускользнуто вогъ вниманія в Полтаса в Подпань также не говорить опрасиространеніи головинандопранама Паврическаго полуострона, екона и (уноминаеть оптомь, что находиль ого выпранаеть Абхазіи) · - опил. 11. Гольшь промотистый, Phoxinus laevis Ag., (Gyptipus cheyso-пичанки петори поветости. Крымська поветости примента порта примента по примен отедами ипристь условерхности прозрачной воды. Повять есться-... жано от рода илианками и приносять извърбольшомь и количества она в Сиковропольскій базарь возго з до знача в селонице с на в значе

Самое внимательное раздмотраніе Бримскаго гольна принено насе, щь гому заключенію, что Сургіния спукоргавіия Падласа совершенню гождествень съ Пюхіния Ізечія, онисаннымъ въ сочинаніи Генеля и Кнера о прасноводныхъ рыбахъ Австріи. Самыя большія нарь намаренныхъ нами недалиныхъ марли въ длину 3½ дюйма. 12. Высих выроздеотный, Совій тегда Кгур, близко подхонать на пискарю нам авдюшка (Cobiis barbatula L.), но отличается

<sup>1</sup> Палласъ говоритъ, что въ нѣкоторыхъ озерахъ круговъ Өеодосія попадаетон авы (Сургінії dus), но вамъ натлѣ въ Камму не случалось вспръчать этой рыбы (Pallas, Voyage dans les gouvernements méridionaux. Т. Н. 522).

отъ него слѣдующими признаками: 1) голова нѣсколько шире и короче; 2) спинной плавникъ ниже и болѣе закругленъ, а также и заднепроходный, который вмѣстѣ подвинутъ далѣе впередъ; 3) квостовый плавникъ короче и по серединѣ примѣтно вырѣзанъ; 4) поперечная черная полоска, находящаяся при началѣ квостоваго плавника, окаймлена двумя треугольными, бѣлыми пятнышками.

Выразохвостый вьюнъ въ первый разъ былъ описанъ Нордманомъ со словъ покойнаго Харьковскаго профессора Крыницкаго, нашедшаго его въ ръчкъ Подкумкъ, въ окрестностяхъ Пятигорска. Странно только, что Г. Нордманъ, видъвшій крымскаго вьюна, не узналъ въ немъ вида, открытаго Крыницкимъ. Палласъ не отличилъ выразохвостаго вьюна отъ обыкновеннаго пискаря (Cobitis barbatula).

Выръзохвостый вьюнъ во множествъ водится въ Салгиръ и въ другихъ Крымскихъ ръчкахъ. Въ Симферополъ называють его гольцомъ. Намъ не случалось видъть недълимыхъ, которыя были бы длиннъе 4 дюймовъ, но по свидътельству Палласа попадаются иногда въ Крыму недълимыя ростомъ въ 6 дюймовъ.

13. Форель ручьевая, Salar Ausonii Val. (Salmo fario Pallas), водится во всёхъ рёчкахъ и ручьяхъ Крымскихъ горъ, но впрочемъ въ значительно меньшемъ числё, противъ головня, марины и нёкоторыхъ другихъ рыбъ. Всё форели, попадавшіяся намъ въ руки, подходили наиближе къ первой разности Гекеля, съ буроваточерными и свётлокрасными, кругловатыми пятнами на бокахъ тёла и на спинномъ плавникѣ; самая большая изъ нихъ была ростомъ немного болёе одного фута.

Между всеми пресноводными рыбами Таврическаго полуострова форель, по вкусу мяса, занимаеть первое место и потому наидороже ценится на Симферопольскомъ базаре. Говорять конечно, что весною встречается въ Крымскихъ водахъ еще другая форель, не уступающая первой во вкусе и достигающая гораздо значительнейшей величины, но намъ, по причине поздняго времени года, не удалось ее добыть. По всей вероятности ета вторая фо-

<sup>&#</sup>x27; Heckel und Kner, Die Süsswasserfische Oestreichs, p. 250 (die gemeine oder eigentliche Bachforelle).

редь, есть Salmo trutta Палласа и Нордмана, которая изъ моря поднимается въ горные ручьи для метанія икры. Странно только, что форель эта входить въ ръки весною, тогда какъ почти всъ другія дососевыя рыбы нерестятся въ позднюю осень или зимою.

Постиная ежедневно базаръ, для осмотра привозимой туда рыбы, мы всегда справлянись также кас ительно поступающей въ продажу дичи, но находили въ этомъ отношени большую бъдность. Постоянно попадались только зайцы и сърыя куропатки, а изградка встръчались полевые голуби (Columba oenas), горлицы (Columba turiur) и черные дрозды (Turdus merula). Надобно при этомъ замътити, что рыба и дичь продаются не на большой базарной площади, а на ближайшей къ центру города, малой, раздъленной отъ большой рядомъ лавокъ.

Изъ ръдкихъ жуковъ были найдены г. Ельскимъ въ окрестностяхъ Симферополя; 1, Sphodrus picicornis Dej., на счетъ котораго еще недавно было высказано сомивніе, попадается ли онъ дъйствительно гдъ дибо въ Европъ (Schaum, Catal Col. Europ. 1859); 2, Lyperus elongatus Duft.; 3, Onitis Clinias Fabr. въ пометъ; 4, Oniticellus pallipes Fabr. въ пометъ; 5, Melanotus aquilus Dej., который вовсе не приводится въ послъднемъ каталагъ Европейскихъ жуковъ, изданномъ Шаумомъ; 6, Chrysomela Megerlei подъ камнями, во множествъ; 7, Otiorbynchus tauricus Stev. и 8, Otiorbynchus asphaltinus Stev., подъ камнями.

Изъ дюбопытныхъ разсказовъ доктора Арендта были заимствованы нами слъдующіе факты, имфющіе интересъ для фауны съвернаго побережья Чернаго моря.

- 1. Лътъ 35 тому назадъ, когда въ Херсонскихъ степяхъ еще водились дикія дошади, изръдка попадались тамъ и степные рябки (Pterocles arenarius Pall.). Двъ такі і птицы были убиты г. Арендтомъ до правую сторону Днъпра, въ окрестностяхъ Бериславля.
- 2. Настоящее Малороссійское названіе тиркушки (Glareola melanoptera) есть бери-хвысть, то есть бери-хвость.
- 3. Маленькая рыбка, извъстная подъ названіемъ овсянки (Aspius Owsianka, Czernay), была открыта Арендтомъ въ Дивпръ, лътъ съ 30 тому назвалъ. Онъ назвалъ ее Cyprinus Pallasii и отправилъ

16

нъсколько экземпляровъ въ Москву къ покойному Фишеру-фонъ Вальдгейму; но такъ какъ экземпляры эти попортились въ дорогъ, то Фишеръ не могъ публиковать описанія новаго вида. Около того же времени Арендтъ сдълалъ наблюденіе, что въ водахъ Южной Россіи распространенъ пукасъ (Rhodeus amarus) и что въ Днъпръ, подъ Бериславлемъ, водится небольшая морская игла (Syngnathus bucculentus), о чемъ также сообщалъ Фишеру-фонъ Вальдгейму.

4. Довольно крупная колюшка, по всей въроятности трехъиглая (Gasterosteus aculeatus), водится въ несмътномъ множествъ
въ ръчкъ Коланчакъ, впадающей съ съверной стороны въ Перекопскій заливъ (въ 30 верстахъ отъ Перекопа). Ее тамъ сушатъ
и приправляютъ ею борщъ, или же употребляютъ на удобреніе полей.
Другая колюшка, гораздо меньшая (Gasterosteus pungitius или, можетъ быть, Gasterosteus platygaster), встръчается довольно изобильно
въ Крымскихъ степныхъ ручьяхъ, къ западу отъ Перекопа. Говорили также г. Арендту, что подобная же маленькая колюшка
попадается иногда въ степныхъ колодцахъ, къ востоку отъ Перекопа.

Зоологическая коллекція Симферопольской гимназін, составленная г. Бобровскимъ, была уже довольно богата туземными земноводными. Изъ ящерицъ въ ней находились Lacerta stirpium Daud., taurica Pall., muralis L, изъ ужей Coronella laevis Laur. (во многихъ экземплярахъ), Tropidonotus natrix L. et hydrus Pall. и Со-luber Dione Pall., изъ лягушекъ Rana esculenta, Bufo cinereus et variabilis Pall. Между мелкими млекопитающими, сохраняемыми въ спиртъ, я замътилъ двъ породы землероекъ, Sorex araneus Schreb. и Sorex leucodon Herm.

Я надъялся застать въ Симферополъ стараго своего Университетскаго товарища, академика Н. И. Жельзнова, съ которымъ условился было вмъсть объъхать Крымъ. Къ крайнему моему сожальнію однако надежда эта не сбылась. Я нашелъ въ Симферополъ письмо отъ г. Жельзнова, которымъ онъ меня извъщалъ, что непредвидънныя обстоятельства помъшали ему предпринять путешествіе въ Крымъ. Въ слъдствіе того я сжалъ нъсколько рамку предначертанныхъ для Крыма экскурсій и принялъ такой планъ: побывать сначала въ Евпаторіи и на

Тарханкуть, чтобы познакомиться съ тамошитими, знаменитым рыбными заводами, потомъ посътить Севастополь, чтобы въ возможной подробности изучить ихтіологическія отношенія Севастопольской бухты, и наконецъ протхать по южному берегу, чтобы получить понятіе объ этой прославленной полось Крыма. Кромь того, чтобы дать г. Ельскому возможность собрать побольше интересныхъ насъкомыхъ и растеній, я ръшился ъхать одинъ въ пустынный Тарханкутъ, а его тотчасъ же отправить въ Ялту, съ тъмъ, чтобы онъ опять присоединился ко мнъ, въ двадцатыхъ числахъ Августа, въ Севастополь.

Планъ этотъ и былъ нами приведенъ въ исполненіе. Августа 6 числа г. Ельскій выёхалъ изъ Симферополя и чрезъ Алушту направился въ Ялту, я же самъ остался еще нёсколько дней въ Симферополе, чтобы нёсколько ознакомиться съ окрестностями города.

#### 3. Кызиль-коба.

Одно изъ самыхъ замъчательныхъ мъстъ въ окрестностяхъ Симферополя есть татарская деревня Кызиль-коба, съ находящимися около нея сталактитовыми пещерами. Я предпринялъ туда поъздку 8 Августа, въ обществъ И. С. Чеха, очень любезно предложившаго мнъ свои услуги.

Кызиль-коба отстоить отъ Симферополя верстъ на 20 къ юговостоку и дорога туда тянется долиною Салгира, непосредственно подлъ самой ръки, которую даже три раза пересъкаетъ. Вся долина Салгира усъяна дачами, окруженными красивыми рощами и общирными фруктовыми садами, между которыми въ особенности замъчательны дачи Стевена, князя Воронцова (принадлежавшая нъкогда Палласу), Княжевича, Казначеева, Арендта, Перовскаго и Аверкіева. На двънадцатой верстъ, на лъвой сторонъ отъ дороги, находится довольно красивая мечеть и при ней развилины Эски-сарая, какого то стариннаго татарскаго зданія, обнесеннаго четыреугольною каменною оградою. Тутъ же начина ется

общирное имъніе Саламеть-Мурзы Крымтаена, которов простирается до села Махмуть-султань, на четырнадцатой верству прв находится первая почтовая станція; съ фруктовыми садами здысь перемежаются большія табачныя плантаціи.

Кстати замвчу, что разведение табаку въ послъднее время очень усилилось въ Крыму и составляеть теперы чрезвычайно доходную статью, даже болве вврную, нежели виноградники и оруктовые сады. Табакъ продается на мъсть, смотря по добротъ его, отъ 3 до 12 рублей за пудъ.

Верстахъ въ трехъ за Махмутъ-султаномъ почтован дорога въ третій разъ пересвиаетъ Салгиръ, выходящій справа изъ подъ Чатырдага, и потомъ уже продолжается вдоль Ангары, самаго значительнаго изъ притоковъ Салгира и обусловлявающаго, такъ сказать, направленіе Салгира. Мы остановились въ деренив Віюкъчавке, лежащей въ двухъ верстахъ отъ соединенія Ангары съ Саргиромъ, чтобы оттуда уже верхомъ провхать въ Кызиль-кобу, куда ведетъ только узкая, каменистая дорожка. Въ Біюкъ-чавке я въ первый разъ ознакомился нъсколько со внутренностію татарскаго жилья и удивился необыкновенной опрятности пріемной комнаты, которая существуетъ непреміно въ каждомъ домъ, даже и самомъ бідномъ, и бываетъ устлана коврами и цзобильно снабжена подушками.

Вся верхняя часть долины Салгира и правыхъ его притоковъ замыкается, съ восточной стороны, довольно высокимъ, сплоинымъ пряжомъ, составляющимъ вътвь главной горной цъди. Кряжъ этотъ, состоящій изъ красноватаго юрскаго известняка, образуетъ какъ бы крутую стъну, мъстами изодранную ущельями, изъ которыхъ вытекаютъ ручьи. При устьъ одного изъ такихъ ущелій лежитъ деревня Кызиль-коба, а въ верховьт ущелья, въ различныхъ высотахъ, находятся гроты и пещеры, которыя мы собирались осмотръть. Мы оставили лошадей въ деревнъ и, въ сопровожденіи двухъ татаръ—проводниковъ, къ которымъ скоро присоединилась цълая стая мальчиковъ, отправились вверхъ по ущелью, вдоль ручья, изъ него выбъгающаго. Трудно себъ представить кумъсто болье живописное и вмъстъ дикое. По серединъ ущелья,

между скалами и каменными обломками, струится быстрый ручей, частью заслоненный зелеными деревьями и кустарниками, по сторонамъ высоко поднимаются красные утесистые бока горнаго кража, впереди въ вершинъ ущелья шумитъ серебристый водо-падъ, вырывающися прямо изъ нъдръ горы; если оглянуться назадъ, то предъ глазами рисуется, въ недальнемъ разстоянии величавая ойгура Чатырдага.

на вода, производящая водопадъ, вытекаетъ изъ большой пе-перы, которая открывается, приблизительно на вышинъ 50 фу-Утовъ, надъ скалистымъ уступомъ, занимающимъ самое начало ущетья. Почти непосредственно надъ этою пещерою находится служили устьями подземныхъ потоковъ, но въ настоящее время не извергають уже болье воды. Но самая примъчательная пещера находится на восточномъ боку ущелья, на нъсколько сотъ футовъ
выше водопада. Туда проложена узкая, извилистая тропинка, жоторая однако такъ крута, что взобраться по ней стоитъ не жоторая однако такъ круга, что вообратью по подолен выписрова смалаго труда, твиъ болве, что нервдко камышки, ее устилающе, Укатываются изъ подъ скользящей ноги. Самая цещера, поперемънно то расшириясь въ объемистые подвалы, то съуживаясь въ тесные проходы, презъ которые приходится пробираться почти полякомъ, глубоко вдается въ нъдра горы. Никто еще, сколько мев извистно, не проникаль до конца ея и потому татары таинственно шенчуть, что она простирается до самой Өеодосіи! Своды пещеры покрыты бълыми известковыми накипями и сталактиками, которые при свыть факсловъ производять чудный эффекть.

Сладовало бы произвесть въ пещерахъ Кызиль-кобы основательную развадку, чтобы узнать, не находятся ли въ нихъ кости ископаемыхъ животныхъ, но для этого у меня не хватало ни времени, ни средствъ, и потому я ограничился тамъ, чтобы поискать въ нихъ летучихъ мышей. Спутникъ мой, г. Чехт, немного зналъ по татарски и вступилъ на этотъ счетъ въ объясненія съ нашими проводниками. Оказалось, что летучая мышь по татарски называется джарканатъ, и что множество летучихъ мышей въ сумерки летаютъ около пещеръ. Когда я предложилъ по 10 копъекъ за каждую летучую мышь, которая будеть поймана, то т'этчась начались самые тщательные поиски и дъйствительно въ короткое время намъ удалось добыть до 10 штукъ этихъ жувотныхъ, которыя висъли, наичаще попарно, въ углубленияхъ пещерныхъ сводовъ. Всв они принадлежали одному и тому же виду и оказались именно сърыми нетопырами (Vespertilio mur mus Schreb.), которыхъ въ окрестностяхъ Кіева миъ никогда не с лучалось еще встръчать.

На обратномъ пути отъ пещеръ до деревни Кызиль-кобы, я подстрекнулъ провожавшихъ насъ мальчиковъ къ ловав ящерицъ (по татарски кесертке), посуливъ и'лъ также за каждую штуку по гривеннику. Въ ящерицахъ не было недостатка въ ущельи, по воторому мы спускались, но поймать ихъ, на скать горы, между грудами каменьевъ, было не лекто, и потому нашимъ татарятамъ. не смотря на все ихъ усердіе, удалось словить не болье 8 штукъ. Изъ нихъ три были яп (ерицы обыкновенныя (Lacerta stirpium Daud ), ничемъ не отличающияся отъ техъ, которыя въ такомъ множествъ встръчаются въ на шихъ мъстахъ, другія же были ящерицы таврическія (Lacerta taurica Pall.). Этотъ последній видь, первоначально открытый Палласомъ, въ последствии подробно быль описань Ратке и Нордманомъ, а также Биброномъ и Дюмеридемъ, въ большомъ ихъ сочинении о земноводныхъ. 1 Красивый цвътъ таврической ящерицы съ боль шою точностію показанъ у Ратке, довольно върное изображение ея приложено въ Понтійской Фаунъ Нордмана. Самъ я собралъ въ Кызиль-кобинскомъ ущельи довольно много разныхъ улитокъ и несколько жуковъ.

Кызиль-коба часто посъщае тся путешественниками и путешественпицами и посъщенія эти произвели уже обычное свое дъйствіе. Проводники къ пещерамт, бывають недовольны даже и корошею платою за ихъ труды и кромъ того навязчивые просители со всъхъ сторонъ окружають путешественниковъ.

Въ деревив Біюкъ-чавке ждалъ насъ объдъ, изготовленный на татарскій ладъ, къ составъ котораго входили катыкъ (кислая

Dumeril et Bibron, Erpétologie. V. 225.

гуща, получаемая посредствомъ броженія изъ вареннаго молока), катлама (слоенныя лепешки изъ пшеничной муки), чирт-бурект (жирные пирожки съ бараниною) и сарма (рубленная говядина, завернутая въ капустный листъ); объдъ этотъ послъ нашей утомительной экскурсіи показался намъ очень вкуснымъ.

Одинъ татаринъ изъ Біюкъ-чавке, въ следствіе объявленнаго нами утромъ желанія, ходиль къ источнику Салгира, чтобы наловить тамъ для насъ форелей. Действительно онъ принесъ намъ не только объщанныхъ форелей, но также несколько штукъ головней и марины, которыя все были пойманы имъ руками, подъ каменьями.

Послъ объда мы повхали верхами осмотръть Енисалу, имъніе Н. Ф. Гротена, глубоко уважаемаго всъми окрестными татарами. Имьніе это занимаеть верхній уголь Салгирской долины, гдъ кражъ, замыкающій эту долину, соединяется съ главнымъ хребтомъ, и славится какъ своимъ живописнымъ мъстоположеніемъ, такъ и отличнымъ хозяйстеннымъ устройствомъ. Енисала составляла нъпогда греческую колонію, но въ концъ прошедшаго стольтія, по приказанію князя Потемкина, жители ея были переселены на съверный берегъ Азовскаго моря, въ Маріупольскій увздъ, гдъ и основали новую Енисалу. Память объ этихъ греческихъ колонистахъ сохраняютъ насаженныя ими фруктовыя деревья, которыя въ настоящее время образуютъ цълыя обширныя рощи.

Уже поздно вечеромъ мы возвратились въ Симферополь, гдв застали на всъхъ улицахъ большое движеніе и шумныя хлопоты, по случаю ожидаемаго прівзда Великаго Князя Михаила Николаевича. Великій Князь двиствительно и прівхалъ ночью, но не выходилъ вовсе изъ экипажа, а непосредственно продолжалъ путь на южный берегъ, въ Оріанду.

### 4. Евпаторія.

Послъ поъздки въ Кызиль-кобу я тотчасъ сталъ собирать:я въ путь на Турханъ-кутъ и вывхалъ изъ Симоерополя утромъ 11 Августа.

Отъ Симферополя до Евпаторіи считается около 70 версть; дорога идеть сначала долиною Салгира, потомъ, на двінаднатой версть, поднимается вяво на возвышенную степь и тянется вдоль сввернаго края общирной балки, по которой течеть ручей Тобе-чопракъ. Въ 25 верстахъ отъ Евпаторіи, около самой дороги, находится красивое селеніе Чоботаръ, принадлежащее г. Бенардаки, и за тъмъ слъдуетъ мъстечко Саки, откуда остается до города одна станція въ 19 верстъ. Между Саками и берегомъ моря лежитъ знаменитое соленое озеро Тузла, привлекающее своею пълительною грязью многочисленныхъ больныхъ. Для помъщенія больныхъ построено нъсколько каменныхъ домовъ на самомъ берегу озера. Въ близкомъ разстояніи за Саками дорога спускается со степи на низменную, песчаную пересыпь, отдъляющую отъ моря общирное гнилое озеро Сасыкъ, въ которомъ производится добываніе соли и непосредственно за которымъ лежитъ Евпаторія.

По дорогь, въ степи, попадались мив огромныя стада грачей, перемъщанныхъ съ галками, а кромъ того многочисленные жаворонки разныхъ видовъ (Alauda arvensis, calandra, cristata et brachydactyla), и отдъльными семьями сиворакши и удоды.

Пересыпь между моремъ и озеромъ Сасыкомъ была оживлена, множествомъ разныхъ куликовъ, крячковъ и рыболововъ. Около Сакской станціи я замътиль небольшое стадо ручныхъ красныхъ утокъ (Anas rutila Pall.), называемых в здёсь огарами, и получилъ объ нихъ отъ станціоннаго смотрителя следующія сведенія: Г. смотритель нашель весною 8 яиць огара въ норъ, на Сакскомъ кладбищъ, и поддожилъ эти яйца курицъ, которая дъйствительно и высидела утять; одного только утенка, перваго, заклевала тотчасъ по вылуплении его изъ яйца. По словамъ того же смотрителя въ Сакахъ давно уже ведутся, въ нъсколькихъ покольніяхъ, полудомашніе огары (которые въ дикомъ видъ во множествъ встръчаются на озеръ Сасынъ). Онт несуть яйна подъ камнями около домовъ, иногда до 12 штукъ. Хозяева собираютъ эти яйца и подкладывають иль курамь, которыя такимь образомь постоянно бывають мачихами утять. Надобно поэтому полагать, что не бу-II Amyera.

детъ стоить большаго труда и вполнъ одомашнить эту красивую утку.

Евпаторія і или Козловъ, какъ чаще называють этотъ городъ въ Крыму, лежитъ при южной оконечности широкаго залива Каламаты и занимаетъ низменную песчаную площадь, подымающуюся постепенно къ лежащей за нею степи. Во время владычества татаръ Козловъ былъ городъ обширный и цвътущій, служившій, не смотря на свою открытую и беззащитную отъ вътровъ гавань, средоточіемъ торговли съ Константинополемъ. Въ новъйшее же время онъ не могъ выдержать соперничества съ Одессою и Севастополемъ и быстро сталъ приходить въ упадокъ. Конечно и теперь еще городъ обширенъ, но на извилистыхъ, узкихъ улицахъ почти вездъ выказываются признаки разрушенія и опустынія; только часть города, прилежащая къ пристани, застроена новыми, хотя небольшими домами въ русскомъ вкусв. Новая эпоха торговой двятельности наступила было для Коглова въ последнюю войну, когда его занимали французы и гавинь его наполнялась иностранными судами, но после того онъ опять по прежнему приуныль и объднълъ. Не могутъ пробудить въ немъ жизни ни многочисленные путешественники, стеклющіеся сюда літомъ купаться въ морів, ни пароходы Общества пароходства и торговли, по нъсколько разъ въ недьлю заходящие въ его гавань. Во всемъ городъ нътъ даже ни одной настоящей гостиницы. Насупротивъ пристани находится довольно большой двухэтажный домъ, въ которомъ отдаются комнаты и маленькія квартиры для прівзжающихъ, но ніть ни стола, ни прислуги.

Самое замъчательное строеніе Евпаторіи составляєть обширная мечеть, объ одномъ большомъ и шестнадцати малыхъ куполахъ, которая построена около половины шестнадцатаго стольтія Ханомъ Девлеть-Гиреемъ. Она стоить около самой пристани и



<sup>&#</sup>x27; Назвачіе Евпаторіи дано городу при Императрицѣ Екатеринѣ ІІ, въ память какого то древняго города Евпаторіи, существовавшаго во времена Митрядата-Евпатора въ Инкерманской долинѣ; у татаръ же онъ называется Гозлевъ или Гузлевъ.

путешественнику, подъйзжающему къ городу моремъ, должна казаться большимъ украшеніемъ его. Во внутренности города упівлівли нівсколько минаретовъ и турецкихъ байнъ. Окружность города, въ особенности со стороны Симферольской дороги, занята безчисленными вітреными мельницами, низенькими, каменными, большею частью восьмикрылыми. Какъ бы продолженіе густаго роя вітреныхъ мельницъ, со стороны моря, составляють деревянныя будки, служащія для удобства купающихся. Будки эти поставлены на колеса и вдвигаются въ море на ніжоторое разстонніе отъ берега.

Народонаселеніе Евпаторіи состоить главнымъ образомъ изъ татаръ, грековъ, каранмовъ и евреевъ. Каранмы имъють здёсь двъ синагоги, изъ которыхъ въ особенности одна, стоящая на небольшомъ дворъ, устланнномъ мраморными плитками, отличается богатствомъ и красивою отдёлкою.

Я обратился въ Евпаторіи для различныхъ справокъ къ смотрителю Увяднаго училища О. И. Кудрицкому, который принялъ меня крайне любегно и оказалъ мнъ самое усердное содъйствіе въ моихъ занятіяхъ. Кромъ того оказали мнъ помощь въ моемъ дъль уведный казначей А. Н. Джіоти, служившій прежде много лътъ учителемъ и принимавшій не разъ въ своемъ домъ профессора Крыницкаго, и городовой врачъ Берестовскій, кончившій курсъ наукъ въ Университетъ Св. Владиміра и оставшійся върнымъ благороднымъ началамъ, усвоеннымъ имъ въ Университетъ.

Въ отношенім кърыбной промышленности Евпаторія славится вывозимою изъ нея кефалью и кефилевою икрою, но педобно замітить, что главная ловля кефали производится не въ самой Евпаторіи, а на рыбныхъ заводахъ Тарханкутскихъ. Подъ самымъ городомъ происходитъ ловля кефали только въ маломъ размъръ, посредствомъ особой рыболовной снасти, которую можно назвать лежачимъ неводомъ. Подобный неводъ состоитъ изъ рогожъ, которыя сшиваются между собою концами и у которыхъ боковые края вершка на три отгибаются вверхъ, тякъ что онъ образуютъ какъ бы гибкій, плоскодонный жолобъ. Весь рогожаный неводъ бываетъ обыкновенно длиною отъ 50 до 55 сажень и растилается

горизонтально по поверхности воды, при чемъ одинъ жонецъ его накодится на берегу, а другой на лодкъ, или же два конца его примыкають къ двумъ параллельно плывущимъ лодкамъ. верали съ такимъ неводомъ производится только въ темныя, бездунныя ночи, и когда притомъ стоитъ тихая погода. Неводъ нагружается на двъ лодви, которыя, близко придерживаясь берега, плывуть въ томъ направленіи, откуда ожидается приходъ рыбы. Опытные рыбани, не смотря на темноту ночи, тотчасъ замъчають табунъ подпрыгивающей кефали и тогда стараются перенять его, растагивая свой рогожанный неводъ, какъ я уже сказалъ, то межау берегомъ и одною изълодокъ, то между двумя лодками, смотря потому, на какомъ разстояния отъ берега находится табунъ. Кеовать, завидя черную полосу, къ ней подходящую, считаеть ее верхнимъ, выдающемся краемъ обыкновеннаго, отвъснаго невода, и думая черезъ него нерепрытнуть, вскакиваеть какъ разъ въ упругій рогожанный жолобъ, который по самой упругости своей дишаеть ее возможности сделать новый прыжокъ. Случается, что въ такой рогожанный неводъ вскакиваетъ нъсколько тысячъ штукъ кефали, такъ что съ трудомъ успъвають ее выбирать и весь жеводъ начинаетъ тонуть. Кромъ нефали, засканивають иногда въ туже снасть и въкоторыя другія рыбы, какъ на примъръ сарганы (Belone rostrata).

Довля кефали рогожанными неводами производится исключительно только весною и осенью, когда рыба эта, соединившись въ густые табуны, совершаетъ періодическіе свои переходы съ юга на съверъ и съ съвера на югъ. Путешествующіе табуны кефали всегда близко придерживаются берега, слъдуя всьмъ его изгибамъ и входя во всъ лежащіе на пути ихъ бухты и заливы, и вотъ этимъ-то обычаемъ ихъ и пользуются рыбаки, чтобы захватить ихъ своими снастями. Кефаль осенняго улова впрочемъ всегда бываетъ значительно жирнѣе и потому цѣниѣе, нежели кефаль весенняго улова.

Переходъ кефали съ съвера на югъ, вдоль западныхъ береговъ Крыма, начинается въ послъднихъ числахъ Іюля и продолжается до начала Октября. Въ тоже время бываетъ и нерестъ ея, наичаще именно во второй половинъ Августа. Евпаторійскіе греки различають четыре породы кефали, которымь дають названія: кефаль или лабань (Mugil cephalus), синчиль (Mugil chelo), сарівнає (Mugil auratus) и ларичь (Mugil saliens?). По показанію ихъ лабань бываеть высомь оть 9 до 12 фунтовь, сингиль наичаще оть 4 до 5 фунтовь, саріанакь около 1 фунта и ларичь оть 1/3 до 1/2 фунта. Вмысть съ тымь они утверждають, что саріанакь и ларичь, которые начинають обыкновенно показываться не раньше Сентября мысяца, никогда не имыють икры и потому должны быть почитаемы недорослыми сингилями, съ которыми совершенно сходны по складу. Кромы того они употребляють иногда названія карасырть и конджань для кефалей, среднихь по величинь между сарівнакомь и ларичемь, и названія колага, чула́рь и камыть для кефаликовь, которые бывають ростомь меньше ларича.

Кефаль необыкновенно уважается всеми Крымскими греками и ставится выше всякой другой рыбы, въ особенности свъжая. Для приготовленія въ прокъ ее солять, при чемъ лабана и сингиля разръзываютъ въ длину на двъ половины и послъ посола просущивають на воздухъ; мелкая же кефаль не расплащивается, а солится Чрезвычайно высоко ценится также кефалевая икра, цъльная. которая бываеть желтоватаго цвъта. Она вынимается изъ рыбы цёликомъ, вмёстё съ мёшечками, въ которыхъ заключается, просоливается и потомъ высушивается на воздухъ. Икра изъ лабановъ крупнъе зерномъ, нежели икра изъ сингилей, да и самые икреные мъшечки (яичники) лабановъ бываютъ гораздо объемистве, нежели икреные мъшечки сингилей. Въ бытность мою въ Евпатарін 1000 штукъ соленых всингилей стоили отъ 40 до 50 рублей, фунтъ икры изъ дабановъ продавался по 2 рубля, а фунтъ икры изъ сингилей по 75 копъекъ.

Чтобы узнать ближе способъ ловли кефали рогожами, о которомъ мнв часто были сообщаемы не совсвиъ точныя известія, одни другимъ противурвчащія, я пожелаль самъ присутствовать при подобной ловлв. Для этой цвли, чрезъ посредство г. Джіоти, я познакомился съ греками, занимавшимися этимъ промысломъ, и однажды вмъстъ съ ними вывхалъ на ловлю. Двъ наши лодки, на

которыхъ помъщался неводъ, отчалили отъ деревянной пристани съ наступленіемъ сумерекъ и направились къ западу, мимо мыса, который съ этой стороны замыкаетъ Евнаторійскую бухту и на которомъ расположены таможенныя и карантинныя строенія. Вечеръ былъ темный, но дулъ довольно свъжій вътерокъ. Порядокъ нашего плаванія быль такой, что одна лодка придерживалась по возможности близко берега, а другая шла параллельно съ первою и на разстояніи отъ нея около 100 шаговъ. Раза три сидъвшіе на носу сторожевые рыбаки замъчали подпрыгивающихъ кефалей и подавали сигналъ ко вниманію, но всегда оказывалось ихъ такое малое число, что не стоило для нихъ закидывать неводъ. Мы провхали такимъ образомъ нъсколько верстъ, но не встрътили настоящаго табуна кефали. Около 10 часовъ взошла луна, и скоро, какъ бы разорвавъ тучи, покрывавшія небо, стала свътить такъ сильно, что всякія дальнейшія старанія сделались безполезными и мы принуждены были возвратиться въ городъ. Не смотря однако на матеріальную безуспешность этого ночнаго плаванія, я чрезъ него вполнів достигь своей цівли, т. е. въ точности ознакомился съ пріемами рыбаковъ при употребленіи рогожанныхъ неводовъ.

Кромъ рогожанныхъ неводовъ, въ Евпаторіи не существуетъ почти никакихъ другихъ рыболовныхъ снастей, ни плетенныхъ неводовъ, ни даже волоковъ. Мнъ говорили конечно, что у одного купца имъется большой Мальтійскій неводъ, но по справкъ оказалось, что неводъ эготъ отправленъ на одинъ изъ Тарханкутскихъ рыбныхъ заводовъ. Такимъ образомъ, чтобъ узнать хотъ мелкихъ рыбокъ, какія водятся въ Евпаторійской бухтъ, мнъ пришлось ограничиться бредниками, на-скоро сдъланными изъ полотна, и накидными сътями или наметами. Наметомъ называется мелкоячейная, круглая сътъ, діаметромъ отъ 1 до 1½ сажени, къ центру которой прикръплена длинная веревка и по окружности которой привязаны кусочки свинца или свинцовыя кольца. Когда съть эта бросается въ воду, то окружная часть ея погружается на дно гораздо быстръе, нежели середина, и такимъ образомъ запирается выходъ накрытой ею рыбъ. Когда сътъ поднимается,

то свинцовыя кольца сходятся къ серединѣ и вся сѣть постепенно принимаетъ форму длиннаго мѣшка, котораго устье важато сошедшимися свинцовыми грузилками. Подобнымъ наметомъ можно ловить рыбу или прямо съ берега, или же съ лодки. <sup>1</sup>

Между рыбками, водящимися въ Евпаторійской бухть, обратили на себя мое внимание въ особенности собачки (Blennius). тупомордыхъ этихъ рыбокъ челюсти вооружены довольно крыними, острыми зубами, которые образують, какъ сверку, такъ и снизу, по одному сплошнему ряду. На верхнемъ краю глазъ почти всегда торчать кожистыя нити, то простыя, то вытвистыя, которыя имъють подобіе маленькихъ ушей. Голое тело бываеть сильно сжато съ боковъ и содержить сверху одинь длинный плавимъ спинной, а снизу длинный же плавникъ заднепроходный. Собачки водятся въ Евпаторійской бухтв во множествв, непосредственно подлъ берега, гдъ вращаются наи между морскими растеніями, или между деревянными сваями и каменьями. Купаясь, можно бываетъ подойти къ нимъ на самое близкое разстояніе и сколько угодно любоваться, въ прозрачной водъ, какъ они то неподвижно стоятъ на одномъ мъстъ, какъ бы въ наблюдательномъ положения, то съ быстротою молніи перебъгають съ одной точки на другую. Онь питаются, различными мелкими животными, насъкомыми, червяками, улитками, но вдять также траву и глотають иногда твердыя несчинки, служащія въроятно для скорэйшаго растиранія нищи въ длинномъ ихъ пищепріемномъ каналв. Многочисленныя собачки, мною пойманныя и разсмотрънныя, принадлежали двумъ видамъ: Blennius sanguinolentus Pall. (Bl. palmicornis Cuv.) n Blennius auritus Pall. (Bl. tentacularis Brunn.). Первый видъ встрівчался впрочемъ гораздо изобильнее втораго.

Кром'в собачекъ попадались въ бредники и наметы также нъкоторые бычки (Gobius marmoratus, exanthematosus), барбули, кефалики, разныя зеленухи (Crenilabrus fuscus Pall., ocellatus Forsk. et aeruginosus Pall.), иглы (Syngnathus bucculentus) и мелкія глоссы (Platessa luscus). Коньковъ, которые также туть не рідки, не удалось

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Такіе наметы употребляются также на Салгирѣ и на другихъ Крымскихъ рѣчкахъ, для ловли рыбы.

поймать. Говорили мив, что будто бы иногда встрвчаются здвсь и пуголовки (Benthophilus macrocephalus), но изввстіе это требуеть оактическаго подтвержденія. Легко можеть быть, что названіе пуголовов дають начимь либо молодымь широкоголовымь бычкамь.

Между интереснийшими рыбами, встричающимися въ Евпаторійской бухть, мив приводили саргана и какую-то рыбу летучую. Сарганомъ называють здёсь морскаго бекаса (Belone rostrata). Утверждають, что онъ бываетъ ростомъ болве аршина и способемъ производить весьма большіе прыжки надъ поверхностію воды. Летучей рыбь греки дають названіе хелидонопсоронъ и разсказывають объ ней, будто бы она можетъ пролетьть надъ поверхностью воды болве 100 шаговъ. По всей въроятности эта летучан рыба та же самая, которую въ Одессъ именуютъ морскимъ пътукомъ (Trigla hyrax), но въ такомъ случав разсказы о ея летательной способности, должно быть, немного увеличены.

Квиаторійская бухта имъеть грунть твердый, песчаный, по которому мъстами въ значительномъ числъ разсыпаны камни. Подъ камиями этими находять себъ пристанище разные короткохвостые ражи, въ особенности Carcinus moenas и Cancer rivulosus. Во множествъ также встръчаются туть раки отщельники (Pagurus ponticus), которые днемъ сидятъ смирно въ пустыхъ улиткахъ, а ночью выходятъ изъ нихъ и принимаются отыскивать себъ добычу. Наичаще они избирають дневными своими притонами улитки изъ рода Виссіпит. Изъ раковъ-горбуновъ довольно изобильны два палсмона (Palaemon elegans et Palaemon adspersus), а изъ равнонотихъ раковъ въ несмътномъ количествъ въ полотнянные бредники попадались разноцвътныя идотей (Idothea Basteri Audouin).

Я надвялся найти и добыть въ здёшней бухтё также морснихъ врапивъ, вменно медузъ, но обменулся въ своемъ ожиданіи; ихъ вовсе не было. Ммогіе жители Евпаторіи мнё говорили, что прежде водились тутъ медузы очень большія, почти во все лёто, но что въ послёдніе годы стали попадаться только малыя медузы, да и то почти исключительно только осенью.

Евнаторійскій убадъ славится своими овцами; въ особенности же Евнаторійскія смушки, то есть шкурки ягнять, пользуются большою извъстностію. Овцеводство составляеть главную статью дохода въ обширныхъ степныхъ имъніяхъ, и все болье и болье возвышаеть цънность земли. Десятина степной земли, за которую до послъдней войны платили отъ 2 до 3 рублей, нынче уже стоитъ до 10 рублей. Для поясненія выгодъ отъ овцеводства приводили мнъ слъдующій разсчеть: Евпаторійская овца стоить около 5 рублей; издержки на ея содержаніе почти вполнь покрываются доходомъ съ шерсти и молока, такъ что въ пользу владъльца остается ягненокъ, а ягненокъ продается по 2 рубля (при чемъ главную его стоимость составляетъ шкурка или смушка).

Топливомъ въ Евпаторіи служить по преимуществу кизиль и бурьянъ. Привозятся конечно также дрова съ Анатолійскаго берега, но они продаются на вѣсъ и бываютъ лишь немногимъ доступны. Наидешевле обходится бурьянъ, но сильно грязнить печки.

Въ бытность мою въ Евпаторій, туда свозились въ огромномъ к личествъ кости, назначенныя для отправленія въ Англію и составлявшія остатки тъхъ безчисленныхъ лошадей и воловъ, кот рые пали жертвою послъдней войны. О той же войнъ напоминали также остовы нъсколькихъ французскихъ судовъ, которые сидъли въ пескъ, въ восточной части Евпаторійской бухты, и къ разбиранію которыхъ только что было приступлено. Суда эти были выброшены на берегь тою страшною Набрскою бурею, которая причинила столько вреда союзникамъ и едва не разстроила всъхъ ихъ плановъ.

Въ сопровождени г. Кудринкаго посътилъ я существующую въ Евпаторіи караимскую школу, въ которой считается до 250 воспитанниковъ. Устройство ея отличается отъ устройства всъхъ нашихъ школъ въ томъ отношеніи, что воспитанники распредъляются въ ней не по классамъ, а по наставникамъ. Каждый учитель ведетъ учениковъ, довъренныхъ его попеченіямъ, чрезъ всю школу, проходитъ съ ними постепенно весь курсъ положенныхъ къ преподаванію предметовъ, начиная азбукою и кончая философією. Притомъ же всъ ученики одного наставника, и малые и большіе, собираются виъстъ, въ одной комнатъ, такъ что наставность,

никъ постоянно обязанъ бываетъ раздвлять свои старанія между мальчиками разныхъ возрастовъ и разныхъ степеней познанія. Родителямъ предоставлено право избирать наставника для своихъ дътей, и потому число учениковъ у наждаго наставника бываетъ различное, зависить отъ репутаціи, которою онъ пользуется. Жалованье наждаго учителя бываеть соразмёрно числу его учениковъ, такъ какъ оно составляется изъденегъ, съ нихъ взымаемыхъ за право ученія. Меня увъряли, что одинь изъ учителей, который умъль привлечь наибольшее число учениковъ, получаетъ такимъ образомъ до 1500 рублей. Очевидно, что такая система съ важными недостатками соединяеть также важныя преимущества. Нетъ сомнънія, что учитель, обязанный преподавать нъсколько разнородныхъ предметовь, никогда не будетъ излагать всв одинаково основательно и всегде дастъ своимъ ученикамъ болъе или менъе одностороннее направленіе, налегая предпочтительно на тъ предметы, которые ему самому лучше знакомы или къ которымъ онъ чувствуетъ болъе влеченія. Раздъленіе труда, распредъленіе преподаванія предметовъ между нісколькими учителями -- спеціалистами безспорно заслуживиеть въ этомъ отношении предпочтение. Но за то какой просторъ для дъятельности учителя и какія сильныя побужденія въ старательности его, при такихъ условіяхъ, какія существують въ этой караимской школь. А въ нашихъ гимназіяхъ до сихъ поръ не хотять довірить перевода воспитанниковъ изъ класса въ классъ целой корпораціи учителей - требують непремънно строгаго контрольнаго испытанія! И когда наконецъ часто-испытанный гимназисть кончить курсь и явится въ Университеть съ аттестатомъ, удостевъряющимъ въ томъ, что онъ счастливо прошель чрезъ всв испытанія, то ему говорять, что аттестать этоть не заслуживаеть доверія и что ему, для поступленія вт. Упиверситеть, следуеть вновь подвергнуться переконтрольному испытанію!!

## 5. Тарханъ-Кутъ.

Тарханскимъ кутомъ или Тарханъ-кутомъ называется самый западный уголъ Крыма, заключающийся между заливами Керкини-

Digitized by Google

томъ (Перекопскимъ) и Каламитою. На Тарханъ-кутъ находится ивсколько знаменитыхъ кефалевыхъ заводовъ и потому мнъ хотълось непремвнно тамъ побывать. Для этой цвли я вывхалъ изъ Евпаторіи утромъ 13 Августа и направился чрезъ Кабачъ, Кулчукъ и Чопракъ въ мвстечко Акмечеть, лежащее на свверномъ берегу Тарханъ-кута. Почтовой дороги тутъ не существуетъ и край вообще чрезвычайно пустынный. Попадающіеся по пути татарскіе аулы почти всв лежатъ въ развалинахъ, такъ кокъ прежніе ихъ обитатели, послв послвдней войны, выселились въ Турцію. Только стада дрохвъ, разгуливающихъ въ полной безопасности, оживляютъ нѣсколько унылую степь.

Верстахъ въ десяти за Кабачомъ находится большое соленое озеро Донкузлавъ, которое отдъляется отъ моря такоюже низменною и узкою песчаною пересыпью, какъ и озеро Сасыкъ. Пересыпь эта, въ особенности со стороны озера, была усъяна безчисленными куликами (Haematopus ostralegus, Totanus calidris, Limosa melanura etc.), крячками и рыболовами. Между куликами находилось нъсколько штукъ сърыхъ авдотокъ (Dedicnemus crepitans), которыхъ живыми мнъ въ первый разъ привелось тутъ видъть.

Въ близкомъ разстояніи за озеромъ Донкузлавомъ, на высокомъ, обрывистомъ берегу моря, стоитъ деревня Кулчукъ, населенная великорусскими крестьянами. Мніз хотълось въ этой деревнъ нанять свъжихъ лошадей до Акмечети, буде окажется возможнымъ, и для этой цъли я вошелъ на одинъ изъ просторныхъ
крестьянскихъ дворовъ, гдъ люди занимались молотьбою хліба.
На встрічу ко мніз бросилось нізсколько собакъ, изъ породы борзыхъ, и одна изъ нихъ тотчасъ схватила меня за ногу, не смотря
на то, что я не подавалъ никакого знака боязни, а шелъ смізло
и смотрівлъ имъ прямо въ глаза. Причину такой сліпой дерзости
собакъ должно візроятно приписать пустынности края, гдіз різдко
приходится имъ видіть чужаго человіка. Впрочемъ и самые крестьяне деревни Кулчука утратили привітливость и говорливую услужливость, свойственныя великорусскому народу, и отличались какою то унылою суровостію, гармонирующею съ характеромъ

окрестной степи. Деревня Чопракъ, принадлежащая Рудзевичу, отстоитъ отъ Кулчука верстъ на пять и раскинута по склону глубокой степной балки. На днъ балки находится довольно большой садъ, обсаженный вербами и тополями, которыхъ видъ чрезвычайно отраденъ въ этой голой странъ.

Отъ Евпаторіи до Акмечети считается около 65 верстъ. прівхаль въ Акмечеть уже поздно вечеромъ и быль принять здівсь очень радушно И. Е. Судейкинымъ, управлющимъ Акмечетскимъ имъніемъ. Акмечетское имъніе князя Воронцова на 360 крестьянъ содержитъ 18,000 десятинъ земли. Самое мъстечко Акмечеть или Шейхларъ расположено при южной оконечности узкаго залива, который версты на двъ връзывается въ землю, и украшено красивою каменною церковью. Вдель самаго берега залива тянется рядъ миловидныхъ домиковъ, отделенныхъ другь отъ друга садиками изъ акацій. Одинъ изъ этихъ домиковъ при покойномъ князъ Михаилъ Семеновичъ назначался исключительно для путешественниковъ, проникавшихъ въ этотъ пустынный край; другой служилъ скромнымъ жильемъ для самаго князя, когда онъ сюда прівзжаль, какъ это частенько случалось. Вообще князь Михаилъ Семеновичъ нъкогда любилъ Шейхларъ и много о немъ зиботился, хотълъ даже, если, не ошибаюсь, возвести его на степень увзднаго города. На заливъ была устроена каменная пристань, была вызвана артель рыбаковъ изъ Мальты и вивств были выписаны отличныя рыболовныя снасти, заведены дубы и ялики; но нынче все измънилось: съти гніютъ въ анбарахъ, пристань начинаетъ разрушаться, додки дежатъ на сушть и развиливаются, вездъ вообще проявляются слъды запущенія. Последняя война въ особенности много повредила благосостоянію Шейхлара. Сначала мятежные татары многое раззорили, а потомъ и козаки хозяйничали въ немъ почти не лучше татаръ. Тъмъ не менъе однако и теперь еще Шейхларъ составляетъ истинный оазисъ въ пустынной степи. Прекрасный паркъ изъ акацій, гледичій, уксусныхъ деревьевъ, осинъ, тополей и вербъ, обширный **оруктовый садъ**, богатые виноградники и табачныя плантаціи свидетельствують о томъ, что почва везде бываеть благодарна приложеннымъ къ ней стараніямъ человъка.

Въ 1857 году Шейхларское вино было продано по 1 рублю 12 копъекъ ведро, а Шейхларскій табакъ по 7 рублей пудъ.

Шейхдарскій кефалевый заводъ находится въ разстоянін полуверсты отъ устья залива, на восточной его сторонь, гдв образуется имъ полукруглая бухта. Заводъ отданъ въ откупъ двумъ Евпаторійскимъ грекамъ, которые платять за него 225 рублей въ годъ. Снастью для ловли кефали служить большая и крипкая четыреугольная съть, имъющая какъ въдлину, такъ и въ ширину отъ 20 до 25 сажень. Съть эта, при помощи свинцовыхъ грузилъ, растидается по дну моря, въ близкомъ разстояніи отъ берега и въ такомъ положения, чтобы двъ стороны ся были параллельны берегу, а двъ другія къ нему перпендикулярны. Вмъсть съ тъмъ края съти съ трехъ сторонъ, т. е. на двухъ сторонахъ продольныхъ и на одной сторонъ поперечной, приподнимаются и прикръпляются къ шестамъ, вбитымъ въ грунтъ, такъ чтобы края эти, приблизительно на аршинъ, выставлялись надъ поверхностію воды; только съ одной стороны врай съти остается погруженнымъ на дно. Такимъ образомъ вся снасть принимаеть видъ четыреугольной свтеной загородки, съ одной стороны открытой. Какъ скоро стадо рыбы, съ открытой стороны, проникаетъ възагородку, то обрат ный выходъ ей преграждается тымъ, что и съ этой стороны край съти быстро выдвигается изъ воды. Насупротивъ двухъ поперечныхъ сторонъ съти, между нею и берегомъ, воздвигаются двое высокихъ бревенчатыхъ козелъ и на нихъ утверждаются системы блоковъ. Отъ этихъ блоковъ проходять веревки къ краямъ съти, такъ что посредствомъ ихъ можно приподнять всю сеть и въ особенности можно быстро повысить опущенную ея сторону. На такъ же козлахъ устроены будки, въ которыхъ постоянно, и днемъ и ночью, сидять сторожевые рыбаки. Въ будкъ, находящейся при открытомъ концъ съти, сидятъ четыре рыбака, а въдругой будкъ одинъ рыбакъ. На этомъ последнемъ рыбакъ спеціально лежитъ обязанность непрерывно имъть самый тщательный надзоръ за сътью. Какъ скоро онъ замътитъ, что табунъ кефали вступилъ въ съть и дошель до задняго ея конца, то онь подаеть условный знакъ, и тогда тотчасъ рыбаки, сидящіе въ первой будкъ, съвозможною

быстротою поднимають опущенную сторону свти и такимъ образомъ заграждають обратный выходъ рыбв.

Впрочемъ опускается на дно врай съти то съ одного боку, то съ другаго, смотря по времени года. Дело въ томъ, что нефаль, совершая періодическіе свои переходы съ сввера на югь и съ юга на съверъ, имъетъ обычай очень близко придерживаться берега и такимъ образомъ заворачиваетъ въ бухты и заливы, лежащіе на ея пути, то съ одной стороны, то съдругой. Такъ напримвръ въ Шейхдарскій заливъ она вступаетъ осенью, когда идетъ съ сввера на югъ, съ восточной стороны, и, обогнувъ его, выходитъ обратно въ море съ западной стороны; весною же, когда направдяется съ юга на свверъ, вступаеть въ заливъ съ западной стороны и оставляеть его съ восточной. Шейхларскій заводъ, какъ я уже заметиль, расположень при восточной стороне залива, а потому на немъ входъ въ съть находится осенью съ боку, обращеннаго въ устью залива, и весною съ боку противуположнаго; или другими словами, осенью перенимаются табуны кефали при вступленіи ихъ въ заливъ, а весною при выхожденіи ихъ изъ него.

Пейхларскій заводъ съ давняго времени славится богатымъ довомъ кефали и служитъ главнымъ мъстомъ для приготовленія кефалевой икры. Случается иногда здъсь захватить въ одинъ подъемъ съти до 5000 штукъ лабановъ или до 10,000 сингилей; ларичей же ловится сразу отъ 30,000 до 50,000 штукъ. Кромъ кефали, или вмъстъ съ кефалью, заходятъ въ съть и нъкоторыя другія рыбы, какъ на примъръ камбалы, глоссы, паламиды и въ особенности скомбрія. Осенью 1857 года случилось поймать одинъ разъ 25000 штукъ скомбріи и другой разъ 30000 штукъ, такъ что не было даже въ запасъ достаточнаго количества соли для ея посола.

Во время бытности моей въ Шейхларъ, именно утромъ 14 Августа, вступилъ въ заливъ значительный табунъ кефали и дошелъ до самой пристани; отъ подпрыгивающихъ рыбъ вся поверхность воды какъ бы заструилась и взволновалась. Но табунъ этотъ миновалъ заводъ и такимъ образомъ благополучно опять вышелъ въ море. Вивстъ съ кефалью показалось въ заливъ также

нъсколько штукъ дельфиновъ, которые очевидно ей сопутствовали изъ своекорыстныхъ видовъ. Рано утромъ 15 Августа опять появился небольшой табунъ кефали и на этотъ разъ нъсколько сотъ штукъ было поймано на заводъ, а вмъстъ съ ними также одна красивая паламида (Pelamys sarda), ростомъ въ 2 фута, которую поднесъ мнъ въ подарокъ прикащикъ Шейхларскаго заволя. 1

По желанію моему была произведена ловля рыбы въ вершинъ залива посредствомъ волоковъ и были пойманы этимъ способомъ различные бычки (Gobius marmoratus, melanostomus, cephalarges et exanthematosus), собачки (Blennius sanguinolentus et auritus), зеленухи (Crenilabrus lapina, ocellatus et fuscus), иглы (Syngnathus bucculentus et Scyphicus teres), атеринки (Atherina pontica), мелкія камбалы (Rhombus maeoticus), глоссы (Platessa luscus) и спарусы (Sargus annularis). Вообще я убъдился, что верхняя часть залива изобилуетъ мелкою рыбою, въ особенности бычками и разною малявкою, а также рачками горбунами, но не имълъ возможности ближе ознакомиться съ фауною другихъ частей залива, частью по недостатку рыболовныхъ снастей, частью по причинъ дурной, дождливой погоды. Не удалось мнъ также отыскать той породы пескороевъ (Аштосуте), которая, по свидътельству Нордмана, была находима здъсь профессоромъ Крыницкимъ. 2

Изъ птицъ плавали по заливу только одинокіе нырцы, большіе и малые (Podiceps cristatus et auritus). <sup>3</sup> Но мнѣ говорили, что зимою

<sup>&#</sup>x27; Пяламида эта стоила мит порядочных хлопоть. Мит хоттлось ее сохранить и довезть до Кіеви въ целости, въ спирте, а между темъ бывшія
у меня жестянки были для этой цели слишкомъ малы. Тогда г. Судейкинъ
вызвался запаковать ее въ ледъ и отправить въ Евпаторію и действительно
это исполниль. По возвращеніи моемъ въ Евпаторію я заказаль нарочно для
нея длинную жестянку, въ которую ее уложиль, но когда прітхаль въ Симферополь, то нашель, что жестянка протекаеть и быль принужденъ сделать
новую жестянку, въ которой уже и довезь до Кієва. Здёсь однако оказалось, что внутреннія ел части совершенно испортились и потому пришлось
ограничиться тёмъ, чтобы сделать изъ нея чучело.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nordmann, Faune pontique. 338.

<sup>3</sup> Подобные же нырцы были замвчены мною и въ Евпаторійской бухть.

Шейхларскій заливъ покрывается множествомъ лебедей, гусей, утокъ, баклановъ и другихъ водяныхъ птицъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ я узналъ, что главнымъ лѣтнимъ пристанищемъ лебедей, въ этой части Черпаго моря, служатъ Сарабулатскіе острова, лежащіе въ 50 верстахъ на востокъ отъ Шейхлара, почти въ самой вершинѣ залива Керкенита. Мнѣ говорили, что острова эти даже берутся въ откупъ промышленниками, отъ Таврической палаты государ ственныхъ имуществъ, нарочно для собиранія лебяжьихъ яицъ и лебяжьяго пуха. Фактъ этотъ заслуживаетъ тѣмъ болѣе вниманія, что еще г. Нордманъ былъ того мнѣнія, будтобы лебеди вовсе не гнѣздятся на Черномъ морѣ, а лишь прилетаютъ туда зимовать съ дальняго сѣвера.

Въ П!ейхларскомъ саду я замѣтилъ множество сѣрыхъ мухоловокъ (Muscicapa grisola), чеккановъ (Saxicola oenanthe) и щурокъ (Merops apiaster). Послѣднія огромными стадами летали и по самому мъстечку.

Тарханкутская степь изобилуетъ куропатками, дрохвами и стрепетами, а осенью также кроншнепами (Numenius). Кромъ того въ ней водится множество зайцевъ, за которыми зимою производится дъятельная охота русскими крестьянами ближнихъ имъній. Случается иногда одному человъку убить въ теченіи зимы нъсколько соть штукъ этихъ животныхъ. Въ приморскихъ скалахъ съверной стороны Тарханъ-кута встръчаются также волки, которые туда забъгаютъ въроятно зимою, изъ Днъпровскаго уъзда. Между лисицами попадаются иногда чернобурыя. Въ 1857 году одному Караджинскому крестьянину случилось убить чернобурую лисицу, за шкуру которой ему было заплочено 15 рублей.

Шейхларскій заливъ составляеть одну изъ лучшихъ природныхъ гаваней Таврическаго полуострова. Онъ конечно болье открытъ, не окруженъ такими высокими горами, какъ бухты Севастопольская и Балаклавская, но тъмъ не менъе представляетъ судамъ почти совершенно безопасное пристанище на время бури. Въ бытность мою въ Шейхларъ, нъсколько купеческихъ судовъ, вышедшихъ въроятно изъ Одессы, нашли въ заливъ убъжище отъ бывшаго тогда сильнаго, порывистаго вътра. Заходилъ также въ заливъ военно-учебный винтовый пароходъ, шедшій изъ Николаева въ Севастополь. Для приходящихъ сюда судовъ устроенъ карантинъ при самомъ входъ въ заливъ, на восточной его сторонъ.

Послъ объда 15 Августа я отправился изъ Шейхлара въ Караджу, въ обществъ Е. Т. Димитріева, Караджинскаго управляющаго, который въ то же утро случайно пріъхаль въ Шейхларъ.

Караджа есть имъніе въ 22,000 десятинъ земли и 200 душъ крестьянъ, которое занимаетъ самую западную часть Тарханъ-кута и принадлежитъ В. П. Попову. Самая оконечность Тарханъ-кута по серединъ содержитъ довольно значительный выемъ, такъ что образуеть два выступа, свверный и южный, и уподобляется ивкоторымъ образомъ выръзанному рыбьему хвосту. Южный выступъ примътно остръе съвернаго и составлянтъ Тарханскій мысъ, на которомъ устроенъ высокій маякъ. Середину выема занимаетъ низменная, песчаная пересыпь, которою отделяется отъ моря несколько соленыхъ озеръ, разгороженныхъ между собою узкими перешейками. Одно изъ этихъ озеръ, наидълве отстоящее отъ моря, имветь въ окружности ивсколько верстъ, а при восточномъ концъ его, гдъ въ него впадаетъ небольшой ручей, расположены: господская усадьба Караджа и зависящія отъ нея селенія Чуркуръ и Еліагачъ. Главною красою Караджи служить фруктовый и виноградный садъ, занимающій около 20 десятивъ земли. Подъ господскими пахатными полями находится не болве 300 десятинъ, а остальная часть имънія составляеть еще нетронутую степь, просторное пастбище для овецъ, которыхъ считается около 9000. Между полевыми продуктами здёсь важное мёсто занимаеть лень, который продается на мъсть по 8-10 рублей за четверть. обще Караджа, подобно Шейхлару, сильно пострадала въ последнюю войну и до сихъ поръ не можеть поправиться отъ понесенныхъ ею ущербовъ.

Отъ Шейхлара до Караджи считается 18 верстъ и между ними изтъ ни одной населенной деревни; находятся только зануствлые и разрушенные татарскіе аулы. За то тімъ обильніе попадались намъ, около дороги, различныя птицы, какъ на приміръ небольшіе орлы (Aquila clanga), луни, жаворонки (Alauda calandra et brachydac-

tyla), куропатки, стрепета. Во множествъ также носились низко надъ поверхностію степи длинпокрылые стрижи (Cypselus murarius). Фактъ этотъ показался мнъ интереснымъ въ томъ отношеніи, что птицы эти чрезвычайно чувствительны къ холоду и постоянно оставляютъ Кіевъ уже въ послъднихъ числахъ Іюля, такъ что и не ожидалъ, чтобы они оставались въ съверной части Крыма до половины Августа.

Вечеромъ 15 Августа была страшная буря и гроза, и потомъ полиль такой сильный дождь, какого мив прежде никогда не случалось еще видъть. Казалось, будто бы густыя, темныя тучи, нагоняемыя вытромъ съ юговостока, хотым совершенно опорож-Дождь этотъ продолжался почти безпрениться надъ Караджою. рывно до следующаго утра, такъ что въ течении ночи вода въ большомъ Караджинскомъ озеръ поднялась болъе, чъмъ на аршинъ. Караджинское озеро безъ сомнынія въ прежнее время составляло открытый лиманъ, который потомъ образовавшеюся постепенно при устью его песчаною пересыпью быль отрызань оть моря. Нынче озеро не имветь уже никакого сообщенія съ моремъ, даже и при такомъ значительномъ повышении его уровня, какого я былъ свидетелемъ. Изъ рыбъ въ немъ водятся травяные бычки (Gobius ophiocephalus), глоссы (Platessa luscus) и трехъ-иглыя колюшки (Gasterosteus aculeatus). Судя по значительной величинь, до которой доходять въ озерв бычки и глоссы, надобно полагать, что оно представляеть для нихъ жизненныя условія, вполнъ благопріятныя. Что касается до колюшекъ Караджинского озера, то я не могъ найти никакого различія между ними и трехъ-иглыми колюшками, живущими въ моръ. Поэтому я полагаю, что едва ли не следуетъ считать двуиглыхъ колюшекъ (Gasterosteus biarmatus), замвченныхъ ъъ Караджинскомъ озеръ профессоромъ Крыницкимъ, лишь случайною разностію трехъ-иглаго вида.

Во множествъ также водятся въ Караджинскомъ озеръ рачкигорбуны (Palaemon adspersus).

На караджинской земль устроены два кефалевые завода, изъкоторыхъ одинъ, называемый Отлешскимъ, расположенъ на южной сторонъ Тарханкута, и отстоить отъ Караджи на 7 верстъ, а дру-

Digitized by Google

гой, Чаротайскій, находится на сіверной сторонів, въ разстоянів 4 верстъ отъ Караджи. Въ сопровождения г. Димитріева, я побываль на обоихъ этихъ заводахъ, и живописно-дикимъ мъстоподоженіемъ въ особенности поразиль меня заводъ Отлешскій. На южной сторонъ Тарханъ-кута каменный берегъ высится надъ моремъ приблизительно на 100 футовъ, и почти вездъ оторванные отъ него обломки, въ видъ отдъльныхъ скалъ, унизываютъ его подошву. На небольшой губъ этого берега, косвенно вдающейся въ море, стоить заводъ Отлешскій. Съ него такимъ образомъ открывается видъ, по одну сторону-на полное, безграничное море, гдъ изръдка промедькиетъ бълый парусъ купеческаго судна или длинною полосою ляжеть дымъ отъ парохода, по другую сторону-на необозримую, голую степь, въ которой лишь видивются тамъ и сямъ небольшіе курганы, насыпанные изъ каменныхъ осколковъ и окруженные кустами терновника. Губою, на которой стоить заводь, образуется маленькій заливь, служащій для постановки съти. Около сотни неправильныхъ, узкихъ ступелей, высъченныхъ на внутреннемъ боку губы, образуютъ извилистую лестницу, ведущую внизъ къ поверхности воды. На половинъ вышины, гдв находится довольно шировій уступъ, составляющій вавъ бы естественную каменную галерею, выдолбленъ рядъ небольшихъ пещеръ, въ которыхъ рыбаки устроили свои койки. Вершина заливца посредствомъ величественнаго природнаго туннеля, имъющаго около 40 сажень въ длину, сообщается съ открытымъ моремъ. Ръдкіе посътители Отлешскаго завода считаютъ для себя обязательнымъ подвигомъ на лодив провхать по туннелю. Намъ однако невозможно было этого исполнить, потому что бушеваль сильный вътеръ. Огромныя волны съ грознымъ шумомъ разбивались о каменный берегь и наполняли весь небольшой заливъ пъною и брызгами; нельзя было и думать о томъ, чтобы спустить додку на воду. Самая съть была снята еще наканунъ, такъ какъ рыбаки замътили заблаговременно приближение бури.

Отлешскіе рыбаки въ прежнее время тяготились тъмъ, что имъ приходилось пойманную рыбу на своихъ плечахъ втаскивать вверхъ по крутой и опасной лъстниць, но послъднему атаману пришла мысль пробить сверху широкую продушину въ туннель, и этимъ значительно облегчилась работа рыбакамъ. Теперь лодки съ рыбою въвзжають въ туннель и тамъ сваливають ее въ большія корзины, которыя посредствомъ ворота съ легкостію вытягиваются, сквозь продушину, къ поверхности земли.

Заводъ Чаротайскій, какъ я уже замѣтиль, находится на противуположной, сѣверной сторонѣ Тарханъ-кута. Онъ существуеть еще недавно и расположенъ при маленькой бухтѣ, въ которую открывается глубокая степная балка. Рыбаки здѣсь не были такъ предусмотрительны, какъ на заводѣ Отлешскомъ, и потому сѣть ихъ сильно пострадала отъ бури, бывшей 15 Августа.

Какъ на Отлешскомъ, такъ и на Чаротайскомъ заводахъ, по показаніямъ тамошнихъ рыбаковъ, кромъ кефали, ловятся еще слъдующія рыбы:

Бычки очень различные, между ними Gobius platyrostris Pall.

Хелидонопсеронъ или хелидонопсера (Trigla hyrax), по татарски курланчугъ, до 3 фунтовъ въсомъ, всегда въ одиночку.

Скорпида или скорпена (Scorpaena porcus).

Спарусъ или морской карась (Sargus annularis), цълыми табунами. Онъ находился въ это время на путешестви съ съвера на югъ и при мнъ было поймано нъсколько десятковъ его, волокомъ, у самой Караджинской пересыпи.

Смарида (Smaris chryselis) наичаще попадается въ Мав мъсяцъ.

Барбуля или султанка (Mullus barbatus) огромными, густыми табунами.

Скомбрія (Scomber scombrus). Случается захватить ея сразу до 40000 штукъ.

Паламида (Pelamys sarda) въ одиночку или небольшими табунами.

Лакерда (Thynnus vulgaris?) почти всегда въ одиночку.

Ставрида (Caranx trachurus) большими табунами

Атеринка или синитка (Atherina pontica et hepsetus) во множествъ.



<sup>&#</sup>x27; Вибств съ спарусами была захвачена волокомъ и одна кефаль (Mugil chelo), изъ которой какъ разъ вытекала икра. Очень въроятно по этому, что кефаль выпускаетъ икру въ мелкой водъ, на песчаный груятъ.

Камбала и глосса (Rhombus maeoticus et Platessa luscus), довольно изобильно.

Кордания (Labrus prasostictes?) отъ 1 до 11/2 оунтовъ.

Лапина или зеленуха (Crenilabrus lapina) чрезвычайно дегко берется на удочку.

Селедка, густыми табунами.

Хамса и анчоусъ, также огромными табунами.

Когда я находился на Чаротайскомъ заводъ, то вощив въ Чаротайскую бухту значительная стая анчоусовъ, которые безпрестанно подпрыгивали изъ воды, и вмъстъ налетъло туда множество крячковъ, производившихъ за ними самую дъятельную охоту.

Лосось (Salmo salar) и какая то другая сходная съ нимъ рыба (Salmo labrax?) заблуждаются сюда иногда небольшими табунами.

Севрюги и небольшія стерлядки попадаются изрыдка.

Занимаются впрочемъ на здъшнихъ заводахъ исключительно соленіемъ кефали и скомбріи, а всякую другую рыбу, какую случится поймать, употребляють для собственнаго продовольствія.

На каждомъ изъ Тарханкутскихъ заводовъ бываетъ обыкновенно прикащикъ, который завъдуетъ хозяйственною частью, атаманъ, который распоряжается самою ловлею рыбы, и артель изъ 10 или 12 простыхъ рыбаковъ, называемыхъ здъсь матросами. Рыбаками по преимуществу бываютъ греки и малороссы, ръже также и татары. Дисциплина на заводахъ соблюдается самая строгая: всъ матросы безпрекословно должны повиноваться атаману. Ловля кефали бываетъ весенняя, отъ половины Марта до половины Мая, и осенняя, отъ исхода Іюля до Октября. Въ 1857 году пришлось на пай каждаго матроса Отлешскаго завода, за осеннюю ловлю, по 104 рубля.

17 Августа, около полудня, я вывхаль изъ Караджи обратно въ Евпаторію, куда и прибыль поздно вечеромъ. Нигдъ еще не случалось мнъ видъть столько дрохвъ и стрепетовъ, какъ на степи между Караджою и Кулчукомъ; въ особенности стрепета безпрестанно то съ шумомъ срывались съ земли, подлъ самой дороги, то, въ нъкоторомъ удаленіи отъ нея, тревожно выглядывали изъ

травы. Довольно часто также попадались семьи удодовъ и вездъ носились по воздуху щурви и стрижи.

Въ Евпаторіи я пробыль еще одинь день, чтобы уложить и закупорить надлежащимъ образомъ собранныхъ мною рыбъ, и потомъ 19 Августа провхаль оттуда опять назадъ въ Симферополь.

## 6. Чатыръ-дагъ.

Такъ какъ мив хотвлось непремвино побывать на Чатыръ-дагв и такъ какъ мив говорили, что подняться на него въ Сентябрв мвсяць часто бываетъ неудобоисполнимо, по причинъ сильнаго холода, то я рвшился посвтить Чатыръ-дагъ прежде, чвиъ отправлюсь въ Севастополь. Г. Чехъ очень любезно вызвался снова быть моимъ спутникомъ. Около полудня 20 Августа, мы вывхали изъ Симферополя и направились опять вверхъ по долинъ Салгира въ татарское село Біюкъ-янкой, которое лежитъ на холив, у самой подощвы Чатыръ-дага, съ съверной его стороны. Мы устроились такимъ образомъ, чтобы еще въ тотъ же день посвтить истокъ Салгира, а уже на другой день рано утромъ подняться на вершину Чатыръ-дага.

Истокъ Салгира находится при съверовосточной оконечности Чатыръ-дага, немного выше татарскаго села Аяна, приблизительно въ разстояни 4 верстъ отъ Біюкъ-янкоя. Мы совершили путь туда и обратно верхами, по извилистымъ и каменистымъ горнымъ троцинкамъ, въ сопровожденіи татарскаго проводника. Истокъ Салгира естъ истокъ въ истинномъ и полномъ значеніи этого слова. Салгиръ не образуется отъ постепеннаго соединенія между собою, на поверхности земли, многихъ отдъльныхъ ручейковъ, а выскакиваетъ на свътъ, изъ темныхъ нъдръ горы, уже въ полной силъ, какъ пъкогда вышла Минерва изъ головы Юпитера. Глубоко во внутренностяхъ Чатыръ-дага, изъ дождевыхъ и снъговыхъ водъ, туда просачивающихся, слагается значительный потокъ, который съ грохотомъ вырывается наружу у съвернаго его подножія. Отверстіе, чрезъ которое выходитъ этотъ потокъ, чтобы дать начало

Салгиру, имъетъ форму большой пещеры, выдолбленной въ огромной мраморной скалъ и обсыпанной мраморными обломками. Дикость мъстности смягчается, съ одной стороны—зелеными кустарниками, покрывающими скалу, съ другой стороны—видомъ на село Аянъ, расположенное въ полуверстъ оттуда, въ глубокомъ ущельъ, по которому Салгиръ первоначально направляетъ быстрый свой бътъ.

Форели, живунція въ Салгиръ, поднимаются до самаго верховья его и проникаютъ даже въ пещеру, изъкоторой онъ вытекаеть; мы имъли случай въ этомъ убъдиться собственными глазами.

На кустарникахъ и подъ камнями, около самаго истока Салгира, было собрано мною значительное число разнородныхъ улитокъ (Helix, Bulimus, Clausilia), а также нъсколько большихъ сороконожокъ (Scolopendra) и стоножокъ (Julus). Послъднія, по причинъ твердости внъшней ихъ оболочки, называются въ Крыму костанками.

Еще было совершенно темно, когда мы, въ 4-мъ часу утра 21 Августа, съли опять на лошадей и, въ сопровождении двухъ татарскихъ проводниковъ и двухъ слугъ, пустились въ путь на Чатыръ-дагъ. Дорога изъ Біюкъ-янкоя на Чатыръ-дагъ тянется по западному склону этой горы, покрытому густымъ лиственнымъ Она, то вьется вдоль края обрывистой пропасти, то връзывается глубоко между красноватыми скалами; тамъ и сямъ пересъкается журчащимъ ручейкомъ, мъстами устлана каменными осколками, которые укатываются изъ подъ ногъ лошади. Вполнъ полагаясь на върный шагъ своихъ татарскихъ лошадей мы влали очень шибко, часто въ скачь, чтобы поспъть, буде возможно, на вершину Чатыръ-дага раньше восхожденія солнца. Тъмъ не менъе однако, когда мы около 5 часовъ, поднялись наконецъ на нижнюю площадь Чатыръ-дага и въвхали въ буковую рощу, которая простирается до самаго подножія верхней части горы, то уже сильно Мертвая тишина, которая до твхъ поръ царствовала въ окружающемъ насъ лъсу, стала прерываться карканьемъ вороновъ, тоскливымъ пъньемъ овсянокъ и оживленнымъ щелканьемъ синицъ. У верхней опушки буковой рощи мы сошли съ лошадей, привязали ихъ къ деревьямъ и пъшкомъ уже стали подниматься по

врутой поватости, ведущей съ этой стороны на вершину Чатыръдага. Не успъли однако мы взобраться и до половины ея, какъ
уже наиболъе выдающіяся верхушки горы озарились первыми лучами восходящаго солнца, и вслъдъ за тъмъ наступилъ полный
свътъ. Такимъ образомъ мы не вполнъ достигли своей цъли и не
имъли зрълища восхода солнца съ самой вершины Чатыръ-дага,
но впрочемъ достаточно были вознаграждены великолъпными утренними картинами, которыя намъ представлялись со всъхъ сторонъ.

Чатыръ-дагъ имъетъ форму исполинскаго трапецоида, который простирается съ съвера на югъ и на южной оконечности котораго выдается другой значительный трапецоидъ, простирающійся съ съверовостока на югозападъ; этотъ второй верхній трапецоидъ, который на далекое разстояніе бываетъ видимъ, какъ со стороны моря, такъ и со стороны съверной Крымской степи, и послужилъ поводомъ древнимъ грекамъ назвать гору Тгарегов, а татарамъ наименовать ее Чатыръ-дагъ (шатеръ-гора, палатка-гора, или сокращенно палатъ-гора). Татарское названіе идетъ къ горъ потому, что высшій трапецоидъ дъйствительно представляетъ издали видъ огромнаго шатра, съ нъсколько неровнымъ верхнимъ краемъ.

Вся высота Чатыръ-дага надъ уровнемъ моря составляетъ около 5000 футовъ, <sup>1</sup> а верхній трапецоидъ выдается надъ нижнимъ приблизительно отъ 600 до 700 футовъ. Нижній трапецоидъ по съверную сторону отъ верхняго, у его подножія, образуетъ очень росную площадь, которая имъетъ въ длину (отъ юга къ съверу) не менъе 8 верстъ, а въ ширину (отъ запада къ востоку) отъ 2½ до 3 верстъ. Верхній трапецоидъ на верху также содержитъ площадь, но очень неровную, которая простирается въ длину (съ югозапада на съверовостокъ) почти на три версты и имъетъ въ ширину до ¾ версты. Такія площади, занимающія вершины



¹ По барометрическому измъренію Париота в Энгельгардта 790, 3 товзовъ (Engelhardt und Parrot, Reise in die Krym und den Kaukasus. 1815. І р. 17), по намъренію профессора Гасстагена 5136 футовъ (Очеркъ геогност. описатив Крыма. р. 6).

многихъ отдъльныхъ Крымскихъ горъ и характерныя для южнокрымской горной цъпи, называются татарами яйлами или джайлами, отчего иногда и вся сказанная горная цъпь именуется Яйлою (Джайлою). На Чатыръ-дагъ такимъ образомъ находятся двъ яйлы, нижняя и верхняя, изъ которыхъ однако первая гораздо общирнъе второй, такъ что иногда ей одной только усвоиваютъ названіе Чатырдагской яйлы, а послъднюю разумъютъ подъ названіемъ вершины Чатыръ-дага.

Край верхней яйлы со всъхъ сторонъ болье или менье возвышень, такъ что самая яйла имветь оттого форму плоской котловины, съ неправильно изогнутымъ дномъ. Наибольшей вышины достигаетъ край на югозападномъ концъ яйлы. Мы туда посившили и провели тамъ нъсколько часовъ, чтобы налюбоваться на превосходную панораму, которая намъ открывалась во всехъ направленіяхъ. Прямо на востокъ, за фантастическими зубцами Демиражи, обрисовывался гористый берегь Крыма дальше Судацкой бухты, до мыса Килеа бурунъ. Къ юговостоку растилалась, у ногъ нашихъ, роскошная долина Алуштинская, и за нею простиралось открытое море до края видимаго горизонта, гдв оно такъ сливалось съ небеснымъ сводомъ, что мы никакъ не могли опредълить черту разделенія. Облака, двигавшіяся надъ моремъ и въ немъ отражавшіяся, заслоняя собою часть горизонта, еще болве насъ запутывали. Только нъсколько отдаленныхъ судовъ, являвшіяся намъ подвижными черными точками и находившіяся на одной съ нами вышинь, показывали намъ, что мы на этой именно вышинь должны искать границу видимаго горизонта, и темъ самымъ напоминали намъ о выпуклой формь земной поверхности. юту темная Бабуганъ-яйла, которая высотою едва ли уступаетъ самому Чатыръ-дагу, заслоняла собою южный берегъ, и только со стороны Алуштинской долины давала видеть кругловатую Кастель-гору, казавшуюся намъ небольшимъ зеленымъ холмомъ. Съ югозападной и западной стороны представлялся нашимъ взорамъ безконечный дабиринть горъ и ходмовъ, частью обнаженныхъ, частью попрытыхъ густыми лесами, и между ними явстненно обозначались глубовія, извилистыя долины Бельбева и Качи. Наконецъ къ съверу, на широкомъ полукругъ, послъдніе отроги темныхъ юрскихъ горъ опоясывались какъ бы стъпою изъ бълыхъ мъловыхъ скалъ, за которою начиналась однообразная, необъятная степь. Въ совершенно ясные дни съ Чатыръ-дага бываютъ видимы Евпаторія и даже Перекопъ, но для насъ они оставались закрытыми туманомъ, который растилался надъ степью. Мы конечно могли различить Евпаторійскую бухту и опредълить мъсто гдъ должна стоять Евпаторія, но самаго города не могли разсмотръть. За то совершенно ясно намъ представлялся Симферополь, и далеко глазамъ нашимъ можно было слъдовать за теченіемъ Салгира, который зеленою лентою извивался по желтоватой степи.

Между Чатыръ-дагомъ и Бабуганъ-яйлою простирается широкая, лъсистая долина, въ которой берутъ свое начало верхніе Обширный буковый люсь доходить до самаго притоки Альмы. подножія Чатыръ-дага и служить главнымъ пристанищемъ оленей (Cervus elaphus), которые оттуда взбираются иногда попастись и на верхнюю яйлу Чатыръ-дага. Во время последней войны все олени перешли было на восточную сторону Чатыръ-дага, по по окончаніи войны опять возвратились на прежнія міста. Крымскія горы въ настоящее время составляють единственную містность въ Европейской Россіи, въ которой сохранились эти благородныя животныя, но на врядъ ли и тутъ еще на долго продлится ихъ существованіе. Число ихъ, и такъ уже небольшое, постоянно уменьшается, потому что законъ, которымъ запрещается ихъ стрълять, нисколько не соблюдается. Гораздо многочисленные въ горныхъ льсахъ Крыма сарны или дикія козы (Cervus capreolus), которыя впрочемъ и въ нашихъ губервіяхъ еще довольно изобильны.

Около 8 часовъ утра надъ нами пролетьли, на огромной вышинь и по направленю съ съвера на югь, нъсколько стадъ малыхъ журавлей (Grus virgo). Каждое стадо состояло изъ нъсколькихъ сотъ птицъ и образовало правильную, остроугольную вереницу. Громкое кроауканье ихъ оставалось слышнымъ для насъ еще нъкоторое время послъ того, какъ мы уже потеряли изъ виду самыхъ птицъ. Ранній отлетъ этихъ журавлей, обитателей южнороссійскихъ и врымскихъ степей, очевидно предвъщалъ намъ ско-

Digitized by Google

грое наступленіе осенних холодовъ. Около вершины Чатыръ-дага кружились съ десятовъ большихъ орловъ и повторительно подлетали въ намъ на довольно близкое разстояніе, такъ что мы могли узнать въ нихъ беркутовъ (Aquila fulva). Нъсколько разъ мы даже стръляли въ нихъ, но безуспъшно. Изръдка пролетали также мимо насъ небольшіе кобчики (Falco cenciris?).

На скалахъ, образующихъ край верхней яйлы, въ значительномъ числъ попадались намъ нъкоторыя улитки (Bulimus, Pupa) и мелкіе паучки (Salticus).

Подъ камнями, разсыпанными по яйлъ, которыхъ было переворочено нами множество, мы находили также только улитокъ (Helix, Clausilia) и пауковъ (Lycosa); не было подъ ними ни жуковъ, ни сороконожекъ.

Вершина Чатырдага удободоступна только съ съверной стороны, откуда мы на нее поднялись, съ другихъ же сторонъ окружена почти сплошными, отвъсными утесами. По этому мы спустились обратно на вижнюю яйлу тъмъ же путемъ, накимъ пришли, при чемъ взяли съ собою дюжину овецъ, которыхъ застали на верху блуждающими безъ присмотра, чтобы передать ихъ настуху. Склонъ горы конечно и тутъ довольно крутъ, но тъмъ не менъе иногда по немъ взъъзжаютъ верхомъ, въ особенности дамы, до самой вершины, описывая большіе зигзаги, съ большою тратою времени. На этомъ склонъ между прочимъ обратили на себя наше вниманіе многочисленные можжевеловые кусты, которые мало поднимаются отъ поверхности земли, а напротивъ того широко по ней растилаются, какъ бы расползаются (по мнѣнію г. Стевена они составляють особый видъ Juniperus depressa). Ягоды на нихъ были еще совершенно зелены.

Спустившись на нижнюю яйлу Чатыръ-дага, мы направились къ ближайшему кошару, чтобы прибъгнуть къ гостепримству чабановъ (пастуховъ) и нъсколько подкръпить себя послъ изнурительнаго движенья. Чабаны дъйствительно приняли насъ очень радушно и угостили насъ бурекомъ (лепешки изъ неквашенаго тъста), катыкомъ (кислая гуща, получаемая посредствомъ броженія изъ вареннаго овечьяго молока), язмою (катыкъ, смъщанный со сивгомъ или съ хододною водою), каймакомъ (густая пвика, собираемая съ овечьяго молока при его кипячении) и пенныремъ (овечій сыръ). Съ катыкомъ и язмою я могъ сладить и даже нашелъ язму довольно освъжительною, но каймакъ показался, мий, совершенно отвратительнымъ,

Яйлы крымскихъ горъ служать пастбищами овець, на лътнее время. Въ Мав мъсяцъ чабаны отправляются туда съ овцами и остаются тамъ до конца Августа. Яйлы, Чатыръ-дага принадлежать жителямъ Біюкъ-янкоя и Аяна и по общирности своей могутъ прокормить, въ теченіи лъта, нъсколько десятковъ тысячъ овецъ.

Около одинадцати часовъ утра мы сели опять на лошадей и повхали осматривать нижнюю яйлу Четыръ-дага, поторая интересна во многихъ отношеніяхъ, Чрезвычайно крута, и утесиста въ особенности восточная ся ствна, откуда открывается живописный видъ на долину Ангары, по которой вьется дорога на южный: берегь, на Алушту. Горизонтальная поверхность яйлы образуется краями приподнятыхъ пластовъ темнаго юрскаго известняка, имъют. щихъ простираніе отъ югозапада къ свверовостоку. Пласты, эта имъютъ очень различную твердость, и притомъ болье твердые пласты весьма правильно перемежаются съ менъе твердыми. Первые оказывають большое сопротивленіе разрушающему дійствію воздука и выставляются наружу въ виде голыхъ каменныхъ ребръ, вторыя же замътно вывътриваются и образуютъ между первыми, жолобки, заростающіе травами. Такимъ образомъ вся яйла представляется продолговатою, каменною площадью, почти поперегъ изръзанною безчисленными, параллельными между собою бороздами. Пластиватое строеніе яйлы особенно різко бросается въглаза, если смотръть на нее съ вершины горы, при чемъ также очень ясно бываетъ видно, что пласты приподняты темъ круче, чемъ ближе находятся къ вершинъ.

Поверхность яйлы впрочемъ не совсемъ ровна, а содержитъ многочисленныя впадины, то кругловатыя, котловидныя, то продолговатыя, долинообразныя, более или мене заросшія небольшими деревьями и кустарниками. Круглыя впадины наичаще имеютъ въ поперечнике отъ 50 до 100 шаговъ и бывають незначительной

глубины, но находятся между ними и такія, которыя заключають въ себъ несоизмъримо глубокія ямы или пропасти, гдъ въ продолженім всего льта сохраняется мерзлый сифгъ, играющій весьма важную роль въ быту чабановъ. Близко къ съверной оконечности яйлы находится большая, кругловатая впадина, кокорая соде: житъ по серединъ темное жерло, ведущее въ глубину горы, и которая представляетъ такимъ образомъ какъ бы исполинскую каменную Воронка эта называется Тупсисъ-касаръ, то есть бездонный колодезъ. Положительно извъстно, что жерло ея открывается въ одинъ изъ подземныхъ притоковъ Салгира, такъ какъ куски дерева и другіе подобные предметы, туда бросаемые, почти всегда чрезъ короткое время показываются у истока Салгира. О страшной глубинъ жерла можно судить по тому обстоятельству, что если бросить въ него большой камень, то почти въ продолженій 12-15 секундъ слышно бываеть, какъ онъ ударяется объ скалы, и потомъ уже долетаетъ до уха звукъ отъ паденія его въ воду.

Въ ствнахъ нъкоторыхъ другихъ впадинъ открываются пространныя пещеры. Мы посътили двъ изъ нихъ, Сулу-кобу и Бимъбаши-кобу. Входъ въ Сулу-кобу такъ широкъ, что чрезъ него удобно могла бы проъхать большая карета. Самая пещера гораздо обширнъе и величественнъе, нежели Кызиль-коба. Своды и стъны ея покрыты блестящими, разнообразными сталактитами, достигающими иногда исполинской величины, а на покатомъ днъ ея тамъ и сямъ выдолблены углубленія, наполненныя холодною водою. Мы проникли въ нее на нъсколько сотъ шаговъ, пока не были остановлены озерцомъ, занимавшимъ всю ея пириму. Нътъ сомнънія, что Сулу-коба углубляется очень далеко въ нъдра Чатыръ дага, но до сихъ поръ никто еще не произвелъ подробнаго ея изслъдованія.

Бимъ-баши-коба, т. е. тысячеголовая пещера, названа такъ потому, что въ ней находится множество человъческихъ череповъ и цъльныхъ остововъ. Пещера эта пользуется очень дурною славою между татарами. Въ Біюкъ янкоъ насъ увъряли, что всякій, кто въ ней побываетъ, подвергается потомъ изнурительной бо-

лёзни, и приводили въ подтверждение этого мнимаго факта нёсколько свёжихъ случаевъ. Изъ двухъ нашихъ проводниковъ одинъ никогда еще не бывалъ въ пещерв, а другой однажды только, нёсколько лётъ тому назадъ, отважился въ нее проникнуть, чтобы достать изъ нея черепъ для какого то иностраннаго путешественника. Онъ также увёрялъ насъ, что скоро послё того впалъ въ тяжкую болёзнь, отъ которой съ трудомъ оправился, и потому всячески старался насъ отклонить отъ посёщения Бимъ-башикобы. Тёмъ не менёе, когда мы объявили положительно, что непремённо въ ней побываемъ, еслибъ даже и не послёдовали за нами туда ни наши проводники, ни наши слуги, то какъ тё, такъ и другіе рёшились намъ сопутствовать.

Входъ въ Бимъ-баши-кобу очень тесный; на разстоянии 50 шаговъ приходится почти постоянно полоти на четверинкахъ. Самая же пещера довольно простории и раздъляется на ивсколько неправильныхъ галерей, до конца которыхъ въроятно никто еще не доходилъ. Все дно ея усъяно черепами и другими человъческими костями, которыя сделались уже очень хрупкими и начинаютъ приходить въ разрушение. Не сохранилось никакого върнаго преданія о томъ, какимъ образомъ сюда попали эти кости. Надобно полагать, что въ одну изъ войнъ, которыми въ прежнее время такъ часто бываль опустошаемъ Таврическій полуостровъ, въ пещерв искалъ убъжища остатокъ побъжденныхъ и тутъ былъ заморенъ голодомъ, или закуренъ дымомъ жестовими побъдителями. Въдь и въ нашъ гуманный въкъ маршалъ Пелисье, прежде чъмъ прівхаль громить Севастополь, не усумнился прибъгнуть къ подобному средству, чтобы истребить въ Алжиріи горсть храбрыхъ Кабиловъ, искавшихъ спасенія въ неприступной пещеръ.

Когда мы хотели оставить пещеру, въ которой воздухъдействительно быль несколько удушливь, то первоначально залезли было въ фальшивый проходъ, ведущій вероятно въ какую нибудь другую боковую пещеру; но скоро мы заметили свою ошибку, возвратились назадъ, отыскали настоящій выходъ, и все шестеро выбрались благополучно на открытый воздухъ, какъ разъ въ то вреля, когда догорали наши свечи. Никакихъ дурныхъ послед-

ствій отъ этого подземнаго путешествія мы на себі не испытали и потому подагаемъ, что также и провожавшіе насъ татаре не пострадали на этотъ разъ въ своемъ здоровью.

Изъ птицъ на всей яплъ было встръчено нами только два чекканчика (Saxicola oenanthe) и около Сулу-кобы два голубя-клиндуха (Columba oenas).

Во второмъ часу по полудни мы пустились въ обратный путь и въ три часа были опять въ Біюкъ-янков, гдв быль приготовленъ для насъ роскошный татарскій объдъ, состоявшій изъ шорбы (размазня изъ проса, п)дправленная катыкомъ), кавурмы (соусъ изъ баранины), шашлыка (кусочки баранины, изжаренные на вертель) и курабіе (особенное сладкое пирожное). Посль объда г. Чоху, который отлично рисуетъ, захотълось набросать карандашомъ портреты нъсколькихъ молодыхъ татарокъ. Долго онъ церемонились, но когда наконецъ дочь нашего хозяина, за небольшую плату, позволила снять съ себя эскюзъ, то вслъдъ за нею явилось столько охотницъ, что нельзя было удовлетворить желанію всъхъ ихъ.

## 7. Отъ Симферополя до Севастополя.

Утромъ 24 Августа я вывхалъ снова изъ Симферополя и направился на этотъ разъ въ Севастополь, чтобы тамъ наконецъсоединиться опять съ г. Ельскимъ.

Почти на половинъ пути между Симферополемъ и Севастополемъ, а именно въ 30 верстахъ отъ перваго города и въ 40
верстахъ отъ послъдняго, находится Бакчи-сарай, древняя столица
Крымскихъ Хановъ, кот рый конечно нельзя было не осмотрътъ.
Дорога между Симферополемъ и Бакчи-сараемъ пересъкаетъ красивую долину Альмы, но впрочемъ тянется по довольно однообразной, возвышенной степи. Когда я подъвзжалъ къ Бакчи-сараю и
зналъ, что онъ долженъ находиться отъ меня уже въ самомъ близкомъ разстояніи, то все искалъ его глазами, и не находя его, не
понималъ, гдъ такой значительный городъ можетъ скрываться.
Но вдругъ я очутился на краю глубокаго, горнаго ущелья и въ
немъ, съ лъвой стороны, можно сказать подъ ногами моими, от-

крыдась предъ мною длинная и густая масса домовъ и минаретовъ, образующихъ Бакчи сарай.

Въ самомъ дълъ мъстоположение Бакчи-сарая совершенно необычайное. Онъ занимаетъ дно довольно узкой лощины, заплюченной между крутыми и высокими міздовыми горами. По серединъ лошины протекаетъ небольшая ръчка Чурукъ-су (гвидая вода) и по объ стороны отъ нея, на протяжении двухъ верстъ, на скалахъ и утесахъ тъсно громоздятся дома, одни выше другихъ. Конечно только татаре могли избрать подобную местность для постройки города, они же и до сихъ поръ почти исключительно его населнотъ. Собственно говоря во всемъ Бакчи-сарав существуютъ только двв улицы, почти совершенно параллельныя рвчкв, одна на правой сторовъ, другая на лъвой, и отъ нихъ расходятся кверху и книзу узкіе, крутые переулки. Дві эти улицы, въ особенности же та, которая тянется по левой стороне Нурукъ-су. съ обоихъ боковъ густо унизаны открытыми мастерскими и давками, гдв цвлый день сидять татаре, съ скрещенными ногами и съ трубкою во рту, то занимаясь своею работою, то призывая жъ Между мастеровыми едва ли не первую роль себъ покупателей. играють тв, которые занимаюття изготовленіемь башмаковь, туфлей, ремней и разныхъ другихъ кожевенныхъ издълій; между лавками своето многочисленностію наиболье привлекають вниманіе мясныя (гдв продается баранина) и овощныя.

Почти въ серединъ города, нъсколько ближе къ восточному его концу, стоитъ, на самомъ берегу Чурукъ су, знаменитый ханскій дворецъ, окруженный исполинскими пирамидальными тополями. Миъ была отведена въ немъ комната, убранная на восточный ладъ, съ коврами на полу, съ широкими турецкими диванами по стънниъ. Не буду впрочемъ здъсь распространяться объ этомъ замъчательномъ строеніи, многократно описанномъ; скажу только, что правительство тщательно заботится о поддержаніи въ первоначальномъ видъ ханскихъ теремовъ и приняло мъры, чтобы исправить въ нихъ повъщался временный госпиталь. Внутри дворцовой ограды, подлъ мечети, украшенной двумя стройными минаретами, находится

также кладбище, съмногочисленными памятниками, воздвигнутыми надъ прахомъ Хановъ и другихъ важныхъ сановниковъ бывшаго Татарскаго парства. На врядъ ли во всей Европъ найдется другое кладбище, на которомъ покоилось бы столько владътельныхъ князей, какъ на кладбищъ Бакчи-сарайскаго дворца.

Прівхавъ въ Бакчи-сарай во второмъ часу по полудни, я въ тотъ же день отправился верхомъ осмотрвть два достопримв-чательныя мъста, находящіяся по близости города, а именно Успенскій монастырь и Джуфутъ-кале. Проводникомъ моимъ въ этой экскурсіи былъ молодой отатарившійся цыганъ, который страшно мнв надовлъ своими докучливыми разспросами.

Успенскій пещерный монастырь или Скить находится въ трехъ верстахъ отъ восточнаго конца Бакчи-сарая, въ глубокомъ ущеліи, котораго почти отв'всныя стіны иміноть въ вышину приблизительно до 500 футовъ

Скромная Успенская церковь высъчена въ огромной скаль, на которой нъкогда, одному греческому пастуху, чудесно явилась икона Богоматери. Въ тойже скалъ, пониже церкви, высъчены также келлін для монаховъ, а у подножія ея построены трапеза и домъ для Архимандрита; наконедъ дно ущелія, по которому протекаетъ небольшой ручей, занято пространнымъ фруктовымъ и винограднымъ садомъ. Во все время владычества надъ Крымомъ татаръ въ этой угрюмой мъстности продолжало существовать греческое поселеніе, которое называлось Маріанополемъ; только въ 1777 году греки вышли изъ Крыма и основали на берегу Азовскаго моря городъ Маріуполь, куда унесли съ собою также чудотворную икону Богоматери. Новый скить Успенскій, по распоряженію Святвашаго Правительствующаго Синода, устроенъ не раньше, какъ въ 1850 году. О последней кровавой войне, веденной въ Крыму, напоминають находящіяся на монастырскомъ владбищъ гробницы генераловъ Веймарна и Вревскаго, павшихъ въ битвъ на Черной ръчкъ.

Въ близкомъ разстояніи отъ Успенскаго скита, на вершинѣ утесистой горы, образующей какъ бы мысъ между двумя глубокими ущеліями, расположенъ небольшой городовъ Джуфутъ-кале (жидовская крѣпость).. Узкою дорожкою, которая извивается по крутому, каменному склону горы и доступна только для пѣшеходовъ и для татарскихъ лошадей, мы туда поднялись.

Сплошной камень устилаеть дно, какъ на главной улицъ, проръзывающей городъ въдлину, такъ и на всехъ боковыхъ переулкахъ. и составляеть конечно самую надежную мостовую, какую только можно придумать. Невысокіе каменные дома построены на татарскій ладъ. Толстая ствиа окружаеть городъ съ той стороны. гдв мысъ, на которомъ онъ стоить, соединяется съ примыкающею къ нему горною площадью. Пещеры, выдобленныя въ скалъ подъ городомъ, и развалины старыхъ ствиъ, находящіяся на самой скаль. свидътельствують о томъ, что скала эта была обитаема еще въ тв отделенныя времена, когда мъстность, избираемая для жилья. считалась тымъ болые выгодною, чымъ была меные доступною и въ слъдствіе того болье безопасною. Впрочемъ и самые татарскіе ханы, когда завладели Крымомъ, здесь первоначально основали свою столицу, которой дали название Киркоръ. И теперь еще показывають путешественникамъ два свода, высвченные въ камив, одинъ надъ другимъ, которые будтобы служили гробницею одной дочери Тохтамышъ-хана, сдванвшеюся жертвою несчастной любви. Только въ концъ 15 стоявтія ханъ Менгли-гирей построиль дворецъ Бакчисарайскій и туда перенесъ свою резиденцію. Съ техъ поръ Киркоръ мало по малу населился караимами и отъ того получилъ наименование Джуфутъ-кале.

Въ настоящее время Джуфутъ-кале почти совсъмъ запустълъ, осталось въ немъ не болъе тридцати бъдныхъ семействъ, а другіе караимы нашли болъе выгоднымъ для себя переселиться въ Евпаторію и другіе торговые города. Впрочемъ и до сихъ поръ находится въ Джуфутъ-кале караимская синагога (хотя и менъе богатая, нежели синагоги Евпаторійскія) и при ней раввинъ.

Въ верхней части лощины, по которой пролегаетъ главная дорога изъ Джуфутъ-кале въ Бакчи-сарай, можно сказать у подножія Джуфутъ-кале, находится красивая дубовая роща. Ею осънвется общирное кладбище, украшенное множествомъ памятниковъ, сдъланныхъ изъ бълаго мъловато камня. Говорятъ, что са-

Digitized by Google

мые древніе изъ этихъ памятниковъ, судя по надписямъ на нихъ, восходятъ до половины 13 въка. Караимы называютъ это мьсто долиною Іосафата. Въ той же лощинъ, ближе къ Успенскому монастырю, находится большое старинное зданіе, въ которомъ помъщается татарская школа (Медрессе́), и подлъ него богатоукрашенная гробница Менгли-гирея.

Въ Джуфутъ-кале я посътилъ караимского раввина и нашелъ у него довольно значительное собраніе ископаемыхъ раковинъ изъ окрестныхъ горъ, между которыми были исполинскія острем и грифеи. Очень сожалью только, что наступавшіе уже сумерки не позволили мив воспользоваться лыбезнымъ предложеніемъ г. раввина, чтобы подробиве разсмотрать коллекцію и выбрать для себя наиболве интересныя штуки.

Утромъ 25 Августа я отправился изъ Бакчи-сарая въ дъльнъйшій путь, провхаль чрезъ долины Качи и Бельбека, занятыя обширными фруктовыми садами и виноградниками, и поднялся наконецъ на плоскую возвышенность, которою долина Бельбека отдъляется отъ Черной ръчки и отъ бухты Севастопольской. Съюжнаго края этой возвышенности я впервые увидълъ Севастополь. Былъ второй часъ по полудни, солнце ярко свътило и предо мною растилался, по холмистому берегу чуднаго залива, общирный, бълокаменный городъ. Долго не върилось глазамъ; не могъ я представить себъ, чтобы Севастополь такъ быстро могъ воскреснуть изъ праха! Увы! Разстояніе не позволяло мнъ ризличить слъдовъ разрушенія и разсмотръть, что предо мною находится не живой, а мертвый Севастополь.

Въ долинахъ Качи и Бельбека и вообще по всей дорогъ, отъ Бакчисарая до Севастополя, мнъ попадались большія стада щурокъ, которыя очевидно уже готовились къ отлету. Огромныя вереницы малыхъ журавлей тянулись на югъ.

## 8. Севастополь.

Въёхавъ въ Севастополь, я былъ пораженъ печальнымъ зрѣлищемъ, которое онъ представляетъ; весь городъ, можно сказать, лежитъ еще въ развалинахъ. Многочисленныя казенныя строенія, живонисно окружающія Корабельную бухту, въ самомъ разрушеніи еще сохраняють слёды прежней своей красоты; длинные ряды частныхъ домовъ, безъ оконъ и крышъ, уныло окаймляють безлюдныя улицы; огромныя груды мелкаго щебня, на берегу залива, занимають мёста, гдё нёкогда стояли грозныя башни. Одна только улица, параллельная заливу, немного обновлена и оживилась магазинами и лавками, но и тё пом'ящаются почти исключительно въ временныхъ, деревянныхъ балаганахъ, купленныхъ отъ Французовъ и перенесенныхъ сюда изъ Камышевой бухты.

Я остановился въ гостинницъ Марсель, у графской пристани, и тотчасъ же пустился отыскивать г. Ельскаго, котораго скоро и нашель въ другой гостинницъ. Онъ пріъхаль изъ Ялты на пароходь еще 20 Августа и успъль уже сдълать нъсколько экскурсій, энтомологическихъ и ботаническихъ, по окрестностямъ Севастополя. Вмъстъ съ нимъ мы съ слъдующаго же утра принялись прилежно посъщать рыбный базаръ и вообще приложили полное стараніе къ тому, чтобы по возможности подробно ознакомиться съ ихтіологическими отношеніями Севастопольской бухты.

Большой Севастопольскій заливь врізывается въ землю, по направленію съ запада на востокъ, приблизительно на 10 версть и иміветь въ ширипу около 1½ версть, при чемъ однако къ вершинів нісколько съуживается. Оба берега его извилисты, въ особенности же южный, который содержить нісколько довольно значительныхъ, второстепенныхъ заливовъ или бухтъ. На большомъ отлогомъ холму, разділяющемъ двіз изъ этихъ бухтъ, Южную и Артиллерійскую, расположена главная часть Севастополя. По обіз стороны главнаго залива берегь, то постепенно, то круто поднимается до высоты 400 или 500 футовъ, такъ что заливъ заслоненъ такимъ образомъ отъ всіхъ візтровъ, и образуеть самую безопасную гавань, какую только можно себіз представить. Надобно удивляться по этому, какъ уже въ старыя времена ни одинъ изъ народовъ, владівшихъ Таврическимъ полуостровомъ, не основалъ здісь большаго города, и можно навітрное предсказать, что въ

<sup>&#</sup>x27; Греческій городъ Херсонъ находился около самаго устья залива и для него служиль гаванью не самый заливъ, а второстепенная бухта Стрвлецкая.

симый непродолжительный срокъ Севастополь должень размейсть лучше прежняго. Жаль только, что склоны горъ, окружающихъ заливъ, не покрыты лъсомъ, а состоитъ изъ известковаго камия, на которомъ произрастають, между редкою травою, лишь мелкіе кустарники. Въ вершину залива вливается небольшая ръчка Біюкьузень, иначе Черная ръчка, которая вытекаеть изъ Байдарскихъ горъ. Глубокая и широкая долина Черной ръчки составляетъ канъ бы продолжение Севастопольской бухты, и выбств съ нею отдыляеть отъ свверной части Крыма ту возвышенную, югозападную губу, на которой стояль древній Херсонесь. Дно долины довольно болотисто, въ особенности ближе къ устью ръчки, которое опоясано **мирокими полосами тростника.** Очень въроятно, что въ прежнее время заливъ гораздо дальше вдавался въ нынъшнюю долину Черной рачки, но потомъ мало по малу быль засыпань землистыми частичками, вносимыми въ него ръчкою. Постепенное выдвиганье устья Черной рычки доказывается ныкоторымы образомы тымы, что всв остатки отъ древнихъ мостовъ, построенныхъ чрезъ нее, находятся значительно выше противъ теперешняго моста.

Какъ въ вершинъ залива, такъ вообще во всъхъ мълкихъ его частяхъ, въ особенности въ нъкоторыхъ второстепенныхъ бухтахъ, дно покрыто густыми морскими травами (Zostera marina et Potamogeton pectinatus). Обстонтельство это очень важно въ отноменіи къ рыбной фаунъ залива. На травахъ и между травамъ живетъ множество разныхъ мелкихъ животныхъ, полиновъ, улитокъ, червей, раковъ и насъкомыхъ, такъ что всякія небольшів рыбки въ чащъ травъ находятъ для себя и довольно безопасное пристанище и обильную пищу, а за малыми рыбками охотиться приходятъ большія. Вотъ безъ сомнѣнія одна изъ важнѣйшихъ причинъ, почему Севастопольская бухта всегда славилась количествомъ и разнообразіемъ въ ней рыбъ.

Рыбною ловлею въ Севастополъ по преимуществу занимаются отставные матросы, посредствомъ мережъ, плавныхъ сътей, бредниковъ, наметовъ, разнаго рода саковъ и удочекъ. Настоящіе рыбаки, греки, производящіе ловлю неводами и рогожами, живутъ на Съверной оторонъ, въ такъ называемой Паніотовой балкъ. До

войны существовало неополько кефалевыхъ заводовъ при устьй залива, но ныиче неть на одного.

Наить уделось составить сивдующій списокъ рыбъ, частью востоянно живущих въ Севастопольской бухтъ, частью временно туда заходящихъ:

- 1. Trachinus draco L. называется эдёсь морскимъ дракономъ, встрёчается по одиночкъ.
- 2. Uranoscopus scaber L., морская корова, водится довольно изобильно кругый годь и потому почти ежедневно привозится на базарь. Голова втой рыбы имветь довольно странную форму; глаза и роть обращевы вверхь, отчего и произошло греческое ея назмане (небетлядь). Наименованіе морской коровы дано ей по причим телетой, тупой морды и двухь роговидишкь отростковь. находящихся на плечевыхъ костяхь. Обіз мисистыя губы усажены небольшими усиками и къ вершиніз нижней челюсти прикріпляется помистый отростокь, который оканчивается длинною, лопастинчатонадрізамною питью. Говорять, что морская корова зарывается віз песокъ и выставляєть оттуда означенную червевидную нить, чтобы приманить ею рыбокъ, которыми питается. Замічателень также чрезвычайно толстый и крізпкій ся языкъ, который составняєть отличное орудіе для раздавливанія схваченныхь ею рыбокъ, въ чемь мы многократно иміли случай убідиться собственными глазами.
- 3. Trigla hyrax Pall., морской пітухъ, называется здісь карандичь (по татарски) и попадается изрідка, въ одиночку. По свидівтельству Палласа и Нордмана, подъ Севастополемъ встрічаются два вида морскихъ пітуховъ, но второй, приводимый ими видъ, Trigla cuculus Pall., не попадался намъ въ руки.
- 4. Scorpaena porcus L., морской ершъ или скорпида, почти ежедневно бывала на базаръ въ значительномъ числъ. Эта колючая и неуклюжая, праснобрюхая рыба придерживается предпочтительно каменистыхъ мъстъ морскаго дна, гдъ ее ловятъ руками жан бьютъ небольшою остью.
- 5. Corvina nigra Cuv., горбыль, доскирь или мелокопія, ежедневно възначительномъ количествъ привозилась на базаръ. Цвъть ся нализаце бываеть темноголубой, только брюхо серебристое.

Губы на внутренней поверхности усвяны медкими бородавками, а снаружи пробуравлены довольно большими дырочками. Въ желудкъ мы находили разныхъ рыбокъ, рачковъ, двустворокъ. Самыя большія недълимыя, намъ попадавшіяся въ руки, были длиною не больше фута.

- 6. Sargus annularis Cuv., морской карась или спаруст. тогже въ значительномъ количествъ привозится на базаръ. Рыба эта питается, кажется, исключительно морскими травами, для растиранія которыхъ вполнъ приспособлены ея тупые, коренные зубы, расположенные въ верхней челюсти въ три ряда, а въ нижней въ два ряда. Въ травянистыхъ бухтахъ Севастопольскаго залива мы находили множество рыбокъ этаго вида, имъвшихъ въ длину не болъе полутора дюймовъ, и чотому въроятно выклюнувшихся изъ яичекъ въ томъ же году.
- 7. Smaris chryselis Cuv., морской окунь или смарида, значительными табунами вращается около береговъ Крыма и неръдко заходитъ въ Севастопольскій заливъ. Мы находили его почти ежедневно на базаръ, а небольшихъ рыбовъ, длиною въ два дюйма, сами ловили въ мълкихъ бухтахъ. Самый большой экземпляръ изъ тъхъ, которыхъ приходилось намъ видъть, былъ длиною въ 6 "1".
- 8. Mullus barbatus L., султанка (Султанъ-балыкъ по татарски) ежедневно привозилась на базаръ въ достаточномъ количествъ, но и тутъ самыя большія недълимыя, какихъ случалось намъ видъть, были длиною не больше 7 дюймовъ.
- 9. Mugil cephalus Cuv., л юбанъ, привозился на базаръ нъсколько разъ изъ Балаклавы. Приходитъ зимовать въ Севастопольскій заливъ.
- 10. Mugil chelo Cuv., сингиль, кефаль или остроносикъ, также привозился изъ Балаклавы цълыми возами, такъ что сотня продавалась по десяти рублей. Осенній ловъ этой рыбы впрочемъ здъсь только что начинался. Вечеромъ 27 Августа съ десятокъ лодокъ, нагруженныхъ рогожами, выъхали изъ Паніотовой балки и направились вдоль берега къ Евпаторіи, откуда ожидался приходъ кефали, но къ утру 29-го числа еще не возвратились, такъ что мы не могли узнать, какой они имъли успъхъ. Сингиль, подобно лабану, остается зимовать въ Севастопольскомъ заливъ.

- 11. Mugil saliens Risso, ларичъ, кефаликъ, во всякое время встрвчается во множествѣ, между морскими травами, отчего также называется травянкою.
- 12. Atherina hepsetus L., снятокъ-морякъ, морская атеринка, придерживается открытаго моря и никогда глубоко въ заливъ не вдается. Намъ удалось добыть одинъ только экземпляръ, длиною немного болъе 3", но говорятъ, что часто она бываетъ длиною до 5". Глаза у ней примътно меньше и тъло круглъе, нежели у другой, песочной атеринки, такъ что ее съ перваго взгляда можно отличить отъ этой послъдней.
- 13. Atherina pontica Eichw., снятокъ-пескарь или песочная атеринка, живетъ во множествъ въ самомъ заливъ, на мъстахъ песчаныхъ, или между травами, гдъ мы сами ее находили.
- 14. Scomber scombrus L. скомбрія или макрель, еще не приходила отъ съвернаго берега Чернаго моря, гдъ проводить лъто. Севастопольскіе рыбаки насъ увъряли, что она только осенью, при переходъ съ съвера на югь, придерживается западнаго берега Таврическаго полуострова, потомъ на зиму удаляется къ Анатолійскому берегу, а весною подвигается съ уга на съверъ вдоль Турецкаго берега.
- 15. Pelamys sarda Cuv., паламида, изръдка попадается въ открытомъ морѣ, но въ заливъ почти никогда не заходитъ.
- 16. Caranx trachurus L, ставрида (неправильно также скомбрія) на лътнее время, подобно скомбріи, отправляется къ съверному берегу, но приходить сюда зимовать и метать икру. Намъ случилось поймать въ заливъ нъсколько ставридокъ, которыя были ростомъ немного только больше двухъ дюймовъ и имѣли въ желудкъ водяныхъ жучковъ (Dytiscus) и рачковъ.
- 17. Temnodon saltator Cuv., луфарь, довольно изобильна, цёлыми стадами встрёчается подъ Севастополемъ, въ разныя времена. Мы находили въ заливе молодыхъ луфаривовъ, ростомъ отъ 2 до 21/4 дюймогъ.
- 18. Blennius sanguinolentus Pall. называется просто собачкою, жавъ и всё другіе виды того-же рода, и водится около каменистыхъ береговъ залива во множестве. Самыя большія неделимыя,

какихъ случалось намъ видёть, были ростомъ въ 6 дюймовъ и имъли въ верхней челюсти отъ 38 до 40 ръзцовъ, а въ нижней отъ 26 до 28. Нижніе клыки были примётно больпе верхнихъ.

- 19. Blennius lepidus Pall. Между экземплярами, нами добытымл, самый большой быль ростомъ въ 3 дюйма и имель въ верхней челюсти 24 резца, въ нижней 18.
- 20. Blennius auritus Pall. Эта собачка встръчается въ значительномъ числъ въ Севастопольскомъ заливъ, около симаго берега, между камнями. Мы насчитывали, смотря по величитъ недълимыхъ, въ верхней челюсти отъ 22 до 28 ръзцовъ, въ нижней отъ 20 до 22, и кромъ того постоянно находили по два клыка въ каждой челюсти (о которыхъ Палласъ вовсе не упоминаетъ).

Между собранными нами экземплярами быль одинь, длиною въ 3", который по цвъту близко подходиль къ разности, о которой Кювье упоминаеть на страницъ 214 (Cuvier et Valenciennes, Poissons. T. X1), но кромъ того отличался отъ всъхъ другихъ меньшею относительною величиною глазъ и нитей, замъняющихъ собою брюшные плавники.

21. Blennius melanio, nova species. Мы поймали руками, между камнями у берега Южной бухты, двухъ маленькихъ собачекъ, которыя отличаются отъ всёхъ описанныхъ видовъ и которымъ мы дали названіе собачекъ черныхъ, Blennius melanio. Новый этотъ видъ можно охарактеризовать слёдующимъ образомъ:

Надъ глазомъ находится небольшой, кожистый, гладкій, нитеобразный отростокъ; въ нижней челюсти, позади ръзцовъ, съ каждой стороны стоятъ два кръпкіе, изогнутые клыка; цвътъ тъла и плавниковъ черновато-бурый.

D. 12/22. A. 24-25. P. 13. V. 3. C. 13.

Широкая нижняя губа по серединъ содержить выемку. Въ верхней челюсти находится отъ 18 до 22 рівцовъ, въ нижней отъ 12 до 14. Нитеобразные лучи брюшныхъ плавниковъ вдвое короче грудныхъ плавниковъ. Плавники спинкой и заднепроходный сохраняютъ, на всемъ протяженія, почти равномърную вышину и ножистою каймою связаны съ плавникомъ хвостовымъ, который сильно закругленъ и по серединъ слегка усъченъ. Лучи задне-проходнаго плавника имъютъ бълые кончика.

На живыхъ рыбкахъ мы замъчали широкую бълую полоску, которая простиралась отъ середины головы до начала спиннаго плавника, но какъ скоро мы ихъ положили въ спиртъ, то полоска эта совершенно исчезла.

Изъ двухъ нашихъ рыбокъ одна была ростомъ въ 12 линій, другая въ 18 линій, но мы видьли и значительно крупнъйшихъ, только не могли ихъ поймать.

- 22. Gobius batrachocephalus Pall. Этотъ большой бычокъ встръчается довольно изобильно и называется здёсь кнутовиком».
- 23. Gobius exanthematosus Pall. во множествъ, по причинъ короткаго, толстаго тъла называется крумышом.
- 24. Gobius cephalarges Pall. также не ръдокъ, но спеціальнаго названія его мы не узнали.
- 25. Gobius melanostomus Pall. водится изобильно въ песчаныхъ мъстахъ, и оттого именуется песчаникомъ.
- 26. Gobius melanio Pall., бычокъ черный, постоянно держится между каменьями.
- 27. Gobius ophiocephalus Pall. встръчается во множествъ въ частяхъ залива, поросшихъ морскими травами и потому называется травяникомъ.
- 28. Gobius marmoratus Pall попадается въ заливѣ изобильно и потому привозится на базаръ, не смотря на незначительную его величину. Экземпляры, которые мы имѣли въ рукахъ, наичаще были ростомъ отъ 3 до 3 /4 дюйма и отличались отъ тѣхъ, которые встръчались намъ въ Одессъ, въ Николаевѣ и въ Херсонъ, болье свътлымъ цвътомъ тьла.
- 29. Gobius jozo L. Нѣтъ сомнѣнія, что у Падласа и Нордмана подъ названіемъ Gobius quadricapillus смѣшаны между собою два вида, изъ которыхъ одинъ составляетъ лишь разность вида Gobius jozo L., водящагося въ Средиземномъ морѣ. Эту разность, т. е. Gobius jozo, var. pontica, можно охарактеризовать слѣдующимъ образомъ:

Глава очень большіе, равдъленные между собою увкимь проме-22 жутком; четыре средніе луча перваю спиннаю плавника на вершинь бывают вытянуты въ болье или менье длинныя нити; жаберныя крышки совершенно не содержать чешуй; чешуи, покрывающія туловище, къ заднему концу его примьтно крупнье. Цвыть тыла свытлобурый, съ большими темнобурыми пятнами, вдоль боковой линіи; плавники спинные и хвостовый испещрены темными полосками.

D. I. 6. D. II. 1/12—13. A. 1/11—12. P. 17—18. V. 1/10/1. C. 13. Lin. lat. 39—43.

Экземпляры этого бычка попадались намъ часто, между другими мелкими рыбками, пойманными бредниками. Самые большіе изъ нихъ были длиною въ 3½ дюйма и стало быть далеко не доходили до того роста, какъ въ Средиземномъ моръ. Что касается до другаго вида, смъшаннаго съ предъидущимъ, которому и слъдуетъ оставить названіе Gobius quadricapillus Pall., то мы его въ Севастополъ не находили.

30. Gobius leopardinus Nordm. Изъ этого вида, открытаго Нордманомъ, попались намъ, между другими мелкими рыбками, два экземпляра, ростомъ около 20 линій. Нордманъ имѣлъ въ рукахъ также одну только рыбку, ростомъ въ 3 дюйма, и выразилъ сомнѣніе, была ли она взрослая. Судя по тому, что изъ нашихъ двухъ экземпляровъ одинъ содержалъ вполнѣ развитую, весьма крупнозернистую икру, надобно полагать, что бычокъ этотъ не долженъ достигать большаго роста. Характерные признаки вида Gobius leopardinus можно выразить слѣдующимъ образомъ:

Тъло длинное, круглое; темя, затылокъ и передняя часть спины, почти до начала перваго спинаго плавника, не содержатъ чешуй, а покрыты мелкими бородавочками; брюшные плавники очень длинны, такъ что вакрываютъ собою задній проходъ. Спина и бока туловища желтовато-съры, съ продолговатыми бурыми пятнами, вдоль боковой линіи; большое черное пятно на подбородкъ; всъ плавники испещрены темными полосками или пятнышками.

- D. I. 6. D. II. 1/9. A. 1/9. P. 18. V. 1/10/1. C. 15. Lin. lat. 44.
- 31. Motella tricirrata Nils. Рыбъ этой, которая довольно часто

привозится на базаръ, матросы дають названіе *морской налимъ*. Самый большой экземпляръ, намъ попадавшійся, былъ ростомъ въ 10 дюймовъ.

- 32. Ophidium barbatum L. водится изобильно възаливъ, и также причисляется къ морскимъ налимамъ. Спина, на красноватосъромъ грунтъ, испещрена продолговатыми бълыми пятнышками, въ двухъ перекрестныхъ направленіяхъ. Въ желудкъ мы находили остатки морскихъ раковъ и улитокъ. Самый большой экземпляръ былъ длиною въ 9 дюймовъ.
- 33. Platessa luscus Pall. встръчается здъсь относительно ръже, нежели подъ съвернымъ берегомъ и въ соленыхъ озерахъ.
- 34. Rhombus macoticus Pall. ловится мережами при усть залива, бываетъ иногда исполинской величины.
- 35. Solea nasuta Pal! на базаръ не привозится и вообще попадается въ маломъ только числъ.
- 36. Labrus prasoctictes Pall. По словамъ Нордмана эта красивая рыба встрѣчается часто около Севастополя, но намъ удалось видъть на базарѣ только одинъ экземпляръ, и тотъ попорченный.
- 37. Crenilabrus lapina Forsk. Дапина или большая зеленуха (зеленчуха) очень изобильно ловится въ Севастопольскомъ заливъ, и ежедневно привозится на базаръ. По пестротъ и яркости цвътовъ она едва ли не занимаетъ первое мъсто между всъми Черноморскими рыбами. Можно подумать, когда увидишь ее совершенно свъжую, только что взятую изъ воды, что искусный живописецъ раскрасилъ ее, на зеленомъ грунтъ, синими, красными и желтыми полосками и пятнышками. Но къ сожалънію цвъта ея очень непрочны и на воздухъ скоро тускнъютъ, а на экземплярахъ, положенныхъ въ спиртъ, даже почти совсъмъ пропадаютъ. Только зеленый цвътъ глазъ, по нашимъ наблюденіямъ, довольно долго сохраняется. Самый большой изъ разсмотрънныхъ нами экземпляровъ былъ длиною въ 10 дюймовъ.
- 38. Crenilabrus fuscus Pall. Эта зеленуха также встрвчается подъ Севастополемъ очень изобильно и подвержена значительнымъ измъненіямъ въ цвътъ.

По нашему мивнію описанные Нордманомъ Crenilabrus Staitii

- и Crenilabrus pusillus не составляють самостоятельныхъ видовъ, а суть лишь разности вида Crenilabrus fuscus. Самый большой нашъ вяземиляръ быль длиною около  $4\frac{1}{2}$  дюймовъ.
- 39. Степіватиз ocellatus Forsk. Этотъ відъ зеленухъ встрівчается подъ Севастополемъ еще едва ли не чаще, нежели два предшествующіе; притомъ же онъ, по видимому, далье распространенъ, такъ какъ мы находили его даже подъ Очаковымъ (о чемъ въ своемъ мъсть было упомянуто). Въ особенности характерна для него голая площадка, которая находится на заднемъ краю жаберной крышки и занята чернымъ очкомъ, съ красною и голубою каемкою. По цвъту можно отличить въ этомъ видъ двъ разности, одну травяно-зеленую, другую красноватую, но кромъ того бываютъ измъненія въ цвъть, зависящія отъ возраста и отъ мъстности. По нашему мпънію Crenilabrus Morelli Нордмана также составляетъ лишь разность отъ Crenilabrus ocellatus. Самые больпіїе наши экземпляры были длиною немного болье 4 дюймовъ.
- 40. Crenilabrus aeruginosus Pall. И эта зеленуха находится въ заливъ во множествъ и потому ежедневно бываетъ на базаръ. Она также подвержена значительнымъ измъненіямъ въ цвътъ, но постоянно содержитъ три косвенныя, черноватыя полоски на щекъ, два черныя пятна на задней части спиннаго плавника и темное пятно при основаніи хвостоваго плавника. На молодыхъ недълимыхъ черныя полоски и пятна выказываются обыкновенно ръзче, нежели на старыхъ. По нашему мнънію, къ этому же виду слъдуетъ отнести, какъ разности, Labrus frenatus и Labrus capistratus Палласа. Между собранными нами экземплярами самый большой былъ ростомъ немного больше 5 дюймовъ.

Кстати тутъ замѣтимъ, что различные виды зеленухъ чрезвычайно сходны между собою, особенно въ молодомъ возрастъ, такъ что точное различение ихъ бываетъ довольно затруднительно. Относительные размѣры различныхъ частей широкаго тъла, число лучей въ плавникахъ, величина чешуй, образование губъ и зубовъ у всъхъ видовъ почти совершенно одни и тъже. Руководствуются обыкновенно, для распознания ихъ, цвътораспредълениемъ, темными полосками и пятнами, которыя встръчаются на различныхъ

частяхъ твла, но признаки эти весьма ненадежны, твиъ болве, что всв зеленухи представляють въ этомъ отношении множество измвнений, зависящихъ отъ ихъ возраста. отъ времени года и отъ другихъ причинъ. Широкое поприще тутъ открывается для охотниковъ до созиданія новыхъ видовъ.

По нашимъ наблюденіямъ довольно хорошіе видовые признаки зеленухъ заключаются: 1) въ присутствіи или отсутствіи голой площадки на жаберной крышкъ (что уже было замьчено и Нордманомъ); 2) въ распредъленіи чешуєкъ на подглазныхъ косточкахъ. Приведенные нами четыре вида зеленухъ можно, въ этомъ отношеніи, охарактеризовать слъдующимъ образомъ:

Crenilabrus lapina. Жаберная крышка до задняго края покрыта чешуями; на подглазной кости чешуйки расположены въ пять рядовъ.

Crenilabrus fuscus. Жаберная крышка до задняго края покрыта чешуями; на подглазной кости чешуйки расположены въ два ряда.

Crenilabrus ocellatus. У задняго края жаберной крышки находится голья площадка; на подглазной кости чешуйки расположены въ три или четыре ряда, занимающіе всю ширину кости.

Crenilabrus aeruginosus. У задняго края жаберной крышки находится голая площадка; на подглазной кости чешуйки расположены въ три или четыре ряда, которые не занимаютъ однако всей ширины кости, а оставляютъ обнаженнымъ нижній ея край.

- 41. Chromis castanea Cuv. небольшая рыбка, темнобураго цвъта, которую матросы называють зубарикъ, и которая попадается иногда между другими мелкими рыбами, привозимыми на базаръ.
- 42. Belone rostrata Faber., игла-рыба, по татарски сарганъ, встръчается довольно изобильно почти круглый годъ и бываетъ иногда ростомъ болъе аршина.
- 43. Clupea pontica Eichw. Селедка заходить густыми табунами въ Севастопольскій заливъ въ Мартъ мъсяцъ, когда направляется къ съверному берегу для метанія икры, лътомъ же и осенью встръчается только по одиночкъ, а потому между рыбаками распространено миъніе, что она совершаетъ обратное путе-

шествіе, съ съвера на югъ, вдоль Турецкаго берега. Во все время бытности нашей въ Севастополъ, намъ случилось видъть одну только небольшую селедку, которая была поймана неводомъ, вмъстъ съ разными другиян рыбками, въ Паніотовой бухтъ.

Что касается до тюльки и до сардельки (Alosa cultiventris et delicatula), то мы не могли получить върныхъ свъдъній, попатаются ли онъ когда либо подъ Севастополемъ.

- 44. Engraulis encrasicholus Cuv. Анчоусъ, по гречески хамса, вращается огромными табунами около береговъ Крыма и иногда заходитъ въ Севастопольскій заливъ, въ особенности зимою.
- 45. Salmo salar L? Всё рыбаки намъ разсказывали, что лососи ловятся иногда изобильно въ Севастопольскомъ заливе, преимущественно въ позднюю осень, и бываютъ весомъ более пуда, но намъ ни одного видёть не посчастливилось.
- 46. Syngnathus variegatus Pall. Игла полосатая встръчается подъ Севастополемъ въ большомъ числѣ и бываеть очень значительнаго роста, до 1 фута длиною. Рыло у ней короче, нежели у серебристой иглы, но примътно длиннѣе, нежели у пухлощекой; цвъту она красноватаго, съ бурыми поперечными полосками. У всъхъ мужескихъ недълимыхъ, которые попадались намъ въруки, подхвостный пріемникъ успълъ уже опорожниться отъ молодаго потомства и даже закрыться. Въ желудкъ мы находили мелкихъ рачковъ (Crangon).
  - P. 13. D. 38-39. A. 3. C. 10.

Брюшныхъ поперечныхъ поясковъ 18—19.

Хвостовыхъ поперечныхь поясковъ 39-40.

47. Syngnathus argentatus Pall. Игла серебристая также находится въ заливъ во множествъ. Въ подхвостномъ пріемникъ нъкоторыхъ мужескихъ недълимыхъ еще попадались яички или молодыя рыбки. Довольно часто встръчалась разность рыжеватая, которая едва ли не была описана Палласомъ какъ самостоятельный видъ, подъ названіемъ Syngnathus ponticus.

P. 14-15. D. 35-38. A. 2. C. 10.

Брюшныхъ поперечныхъ поясковъ 18.

Хвостовыхъ поперечныхъ поясковъ 33-36.

- 48. Syngnathus bucculentus Rathke. Пухлощекая игла встръчается въ заливъ еще изобильнъе двухъ предшествующихъ. По отношенію къ цвъту тъла находятся многія разности, особенно часто попадается разность рыжеватая. Между мужескими недълимыми у иныхъ подхвостный мъшокъ еще бывалъ наполненъ дътенышами.
  - P. 12-13. D. 32-37. A. 3. C. 10.

Брюшныхъ поперечныхъ поясковъ 16-17.

Хвостовыхъ поперечныхъ поясковъ 37-40.

- 49. Scyphicus teres Rathke. Круглая игла водится въ достаточномъ числъ въ травянистыхъ бухтахъ Севастопольскаго залива. У одного мужескаго недълимиго мы насчитали около 60 яичекъ въ подбрющномъ жолобкъ.
  - 50. Hippocampus guttulatus Cuv. Морской конёкъ, какъ намъ говорили, не составляетъ рёдкости около устья залива; однако и здёсь намъ не удалось добыть ни одного экземпляра.
  - 51. Acanthias vulgaris Risso (Spinax acanthias Cuv.). Морская собака, катрань, въ продолжении лъта гуляетъ по морю, а осенью входитъ въ заливъ и остается тутъ зимовать, такъ что тогди ловится тутъ во множествъ. Легко берется на удочку, на мясо, и даже на рачковъ. Въ пищу не употребляется, но изъ нея вытапливается жиръ и снятая съ нея шкурка употребляется столярами.
  - 52. Trygon pastinaca Cuv. Морской котъ попадается довольно часто въ мережи, разставляемыя на камбалу, по преимуществу осенью.
  - 53. Raja clavata Rond. Морская лисица также довится изобильно, но въ пищу не употребляется.

Вотъ всё рыбы, которыхъ намъ привелось видёть въ Севастополе, или объ нахождении которыхъ въ Севастопольскомъ заливе мы получили достоверныя сведения. Надобно при этомъ заметить, что ловля рыбы въ Севастопольскомъ заливе бываетъ вообще самая обильная въ зимніе месяцы. Многія породы рыбъ, которыя на лётнее время уходятъ кормиться или нереститься къ северному берегу Чернаго моря, постоянно возвращаются оттуда зимовать при югозападныхъ и южныхъ берегахъ Крымя. Лабаны, сингили, ставриды, спарусы, султанки, сарганы и разныя другія рыбы густыми массами наполняють тогда всю Севастопольскую бухту.

Два раза мы вздили также на лодкв въ Черную рвчку, чтобы попытаться познакомиться съ рыбами првсноводными, тутъ водящимися, но не имвли почти никакого успвха. Въ первый разъ мы не взяли съ собою никакихъ рыболовныхъ снастей, такъ какъ надвялись застать на рвчкв бреденьщиковъ, но обманулись въ этомъ ожиданіи; во второй разъ пригласили съ собою рыбака съ коническою волокушею, но поймали этою свтью не болве четырехъ рыбокъ. Рыбки эти принадлежали къ породв маленькихъ лещей, описанной Нордманомъ подъ названіемъ Abramis tenellus. Бывній съ нами рыбакъ не зналъ имъ особаго имени, а называлъ ихъ просто плотичками. Породу эту, которая до сихъ поръ была находима исключительно только въ Черной рвчкв, можно охарактеризовать следующимъ образомъ.

Тъло нъсколько продолговатое; носъзыпуклый, немного выдающійся; вдоль середины спины, начиная от головы до основанія жвостоваго плавника, проходить возвышенное ребро; глоточных вубовь съ каждой стороны по пяти.

P. 1/14. V. 1/9. D. 3/7—8. A. 3/16—17. C. 19. Lin. lat 50 
$$\frac{1x-x}{y}$$
 57.

Самый большой изъ добытыхъ нами экземпляровъ былъ длиною въ 5 "3".

Вершина залива, куда вливается Черная ръчка, какъ мы уже замътили, наполнена густыми травами, произрастающими на днъ ея, а самое устье ръчки окружено тростниковымъ болотомъ. Мъсто это служитъ притономъ множеству черепахъ и ужей, которые производятъ дъятельную охоту за лягушками и рыбками. Черепахи придерживаются больше берега, гдъ громоздятся на кочкахъ и гръются на солнцъ; ужи же заплываютъ далеко въ самый заливъ и безпрестанно выставляютъ изъ воды свою черную (Tropidonotus hydrus) или желтополосую (Tropidonotus natrix) головку. Намъ случилось видъть, какъ одинъ черноголовый ужъ схватилъ довольно крупнаго кефалика и сталъ его изъ всъхъ силъ трясти надъ водою,

оченидно съ тою цвлею, чтобы сначала его задушить и получить такимъ образомъ возможность потомъ спокойно его проглотить. Ударъ весломъ на этотъ разъ лишиль ужа его добычи.

Въ вершинъ залива плавали также пъсколько нырцовъ (Podiceps cristatus) и стада лысокъ (Fulica atra), а на берегу, тамъ и сямъ, торчали сърыя цапли (Ardea cinerea), но другія части залива вообще были пусты отъ птицъ, временно только оживлялись пролетающими рыболовами или крячками. Совсьмъ другое, какъ намъ говорили, бываетъ зимою. Тогда многими тысячами слетаютси сюда гуси, утки, бакланы, гагары, разныхъ породъ кулики, густо покрываютъ всю поверхность воды и берега залива, и наполниютъ воздухъ крикомъ и свистомъ.

Сенастопольские охотники удивлялись впрочемъ, что въ этомъ году такъ долго заставляли себя ожидать разные пролетные кулики, и говорили, что кулики начинаютъ обыкновенно показываться значительно раньше. Въ ожидании ихъ, здёшние охотники занимались стръляниемъ щурокъ, сивоворонокъ, иволгъ, горлипъ, перепелокъ и стрепетовъ, которыхъ перелетъ уже наступилъ. Охотники изъ матросовт вообще бъютъ и вдятъ всякихъ птицъ, каки имъ попадутся, даже луней (Circus cyaneus et rufus) и кобчиковъ (Falco tinnunculus et cenchris).

На сухихъ, каменистыхъ холмахъ, въ окрестностяхъ Севастополя во множествъ водится ящерица таврическая (Lacerta taurica
Pall.), съ которою я успълъ уже познакомиться въ ущельи Кызилькобы, а г. Ельскій въ Ялтъ. Красивая эта ящерица очень проворна
и увертлива, такъ что намъ всегда стоило довольно труда, чтобы
ее поймать. Въ тъхъ же мъстахъ попадались намъ, подъ камнями,
большія сороконожки (Scolopendra cingulata), длинныя стоножки
(Julus), разныя ракообразныя животныя изъ разряда равноножекъ
(Творода) и нъкоторые пауки. Изъ пауковъ въ особенности обратили на себя наше вниманіе совершенно черные, изъ рода Latrodectus (Latrodectus erebus Sav.), которые считаются обыкновенно
ядовитыми. Въ ядовитости ихъ мы не имъли случая убъдиться, но
замътили, что имъ достаются въ добычу наичаще разные крупные,
вемялные жуки, и сдълати наблюденіе, что каждая самка, для по-

мъщенія яичекъ, сплетаеть изъ паутины три мъшечка, которые прикръпляетъ подъ краями лежащихъ на землъ камней. жуками, собранными г. Ельскимъ въ окрестностяхъ Севастополя, можемъ назвать слъдующихъ: Cimindis miliaris F. et lineata Schoenh. (подъ камиями), Brachinus crepitans L., explodens Duft. et psophia Dej. (во множествъ подъ камиями, производятъ довольно громкіе выстрвлы, когда ихъ взять въ руки), Daptus vittatus Fisch., Licinus cassideus F. (подъ камиями), Pristonychus cimmerius Dej. (весьма красивый, подъ камнями), Acinopus tenebroides Duft. (замъчательный по огромной величинъ головы), Ophonus columbinus Germ. (подъ камнями), Pelor blaptoides Creutz (въ необыкновенно большомъ числъ, подъ камнями), Carabus Dejeanii Steven (подъ камнями), Ocypus olens Müller (тамъ же), Astrapaeus ulmi Rossi (знаменитый по своей ръдкости), Silpha laevigata Fabr. (встъ живыхъ улитокъ изъ рода Helix), Ontophagus nigellus Illig. (въ пометь, очень обывновенень), Oryctes silenus Fabr., Timacha tenebricosa Fabr.

Чрезвычайно миого наконецъ находилось въ окрестностяхъ Севастополя разныхъ улитокъ, преимущественно изъ родовъ Нейх, Виlimus и Clausilia. Улитки двухъ первыхъ родовъ держались на кустарникахъ и травахъ, а клаузиліи подъ камнями. Случалось, что на большомъ пространствъ всъ кустарники и пучки травъ бывали буквально усъяны бълыми улитками (Helix cespitum Drap. et filimargo Kryn., Bulimus fuscilabrus Kryn.) и казались издали какъ бы увъщанными бълыми ягодами. Никогда прежде ничего подобнаго намъ не приходилось видъть.

Изъ экскурсій, предпринятыхъ нами по ближайшимъ окрестностямъ Севастополя, одна была направлена на Малаховъ курганъ, другая въ Инкерманъ и третья къ развалинамъ древняго греческаго города Херсона.

Малаховъ курганъ находится при юговосточной оконечности города, владычествуетъ надъ такъ называемою Корабельною стороною и вообще надъ всею частью города, окружающею Южную бухту. Человъкъ, даже совершенно неопытный въ военномъ дълъ, сразу увидитъ, что отъ владънія этимъ холмомъ должна была зависъть участь Севастополя, и пойметъ, почему шла за него такая

упорная и кровопролитная борьба. Нынче Малаховъ курганъ имъетъ видъ самый грустный. Отъ стоявшей на немъ башни не осталось почти и слъда, блиндажи завалились, представляется глазамъ лишь лабиринтъ изъ полуразрушенныхъ валовъ и полузасыпанныхъ рвовъ. За нимъ растилается общирное, пустынное поле, на которомъ видивются остатки отъ роковыхъ редутовъ, Камчатскаго и Волынскаго, и отъ непріятельскихъ траншей, подведенныхъ къ нему на изумительно близкое разстояніе. Воспоминанія о геройской защить кургана и о павшихъ на немъ доблестныхъ воинахъ сменялись въ насъ роемъ различныхъ печальныхъ размышленій. Намъ невольно пришли на память слова Дюбоа, которыя мы недавно вновь прочли въ изданномъ имъ въ 1843 г. путешествия: 1 Ce qui m'avait le plus frappé à Sevastopol, c'était de voir ce port de guerre si fortifié du côté de la mer, tandis que du côté de terre il n'etait pas à l'abri du plus faible coup de main. La ville dans tout son pourtour, était complétement ouverte; pas une porte, pas le plus léger pétit rempart; и потомъ далъе: Aujourd'hui, je suppose que tout ceci a changé et que l'ideé qui était venue, que les Anglais en cas de guerre pourraient opérer une descente sur un point quelconque de la Chersonèse et tourner ainsi la position de Sevastopol, aura fait construire le mur d'enceinte projeté pour sa défense. La ville n'y gagnera pas en agrement; mais la prémière condition d'une ville de guerre, c'est de pouvoir se défendre. Когда Дюбоа писалъ эти строки, то конечно ему и въ голову не могла прійти мысль, чтобы нъкогда его соотечественники, французы, покорные абсюлютной воли новаго Наполеона и соединенные par une entente cordiale съ гордыми англичанами, вмъстъ съ этими послъдними пришли разорять Севастополь.

Кстати тутъ упомянемъ объ особомъ промыслъ, который послъ войны развился въ Севастополъ. Многіе отставные матросы и дъти ихъ отправляются ежедневно собирать, съ одной стороны—картечи и осколки бомбъ и гранатъ, съ другой стороны—пули и пистоны, и такимъ образомъ заработываютъ въ день отъ 50 ко-

Dubois de Montpereux, Voyage autour du Caucase et dans la Crimée. T VI. p. 213. Дюбов посъщвать Севастополь въ 1833 году.

прекъ до 1 рубля, не смотря на то, что получають за овой товаръ самую ничтожную плату. Нъсколькихъ такихъ собирателей чугуна и свинца мы застали на полъ за Малаховымъ курганомъ.

Инкерманъ, то есть кръпость пещеръ, находится на правомъ берегу Черной ръчки, верстахъ въ двухъ выше ея устья, и мъстоположениемъ своимъ очень напоминаетъ о Джуфутъ-кале. горы, опоясывающей съ этой стороны долину Черной ръчки, выдается въ нее крутымъ мысомъ. На вершинъ этого мыса находятся развалины древней кръпости, а подъ ними, въ отвъсномъ боку доры, высвчены многочисленныя пещеры, служившія когда - то жильями людей. Пещеры большею частію обращены въ югу, н расположены въ нъсколько друсовъ; иныя изъ вихъ очень просторны и состоять изъ двухъ или трехъ отделеній, какъ бы образующихъ отдельныя комнаты. На уступъ, близкомъ уже въ подножію кріпости, высічена также въ скалі церковь, которая посредствомъ крутой внутренней лъстницы имъла сообщение съ кръпостію. По всей віроятности этоть пещерный городь быль выдолбленъ въ горъ еще древними Крымскими туземцами, таврами, а потомъ уже перешелъ во владение грековъ, которые соорудили на вершинъ горы кръпость и устроили подземную церковь. всякомъ случав, во время покоренія Крыма татарами, Инкерманъ составляль резиденцію независимаго греческаго жнязя и назывался Только въ концъ 15-го стольтія завладьди имъ турки. Теодори. На самой Черной ръчкъ, насупротивъ Инкермана, существуютъ остатки отъ бывшаго туть накогда каменнаго моста, а въ гордуъ дъваго берега ръчки, ближе къ устью ен, также сохранилось множество обширныхъ пещеръ, выдолбленныхъ руками человъка. Тамъ же ломается и знаменитый, по своей плотности и красоть, Инкерманскій известковый намень, изъ котораго были построены почти всъ казенныя Севастопольскія зданія и длинный (въ 18 версть) водопроводъ, служившій для проведенія присной воды изъ Черной ръчки (отъ деревни Чоргуны) въ Севастопольские доки. Горы лъваго берега Черной ръчки, около самаго устья ея, составляютъ тъ Инкерманскія высоты, на которыхъ происходила страшная битва 5 Ноября 1854 года.

Павтущій нівогда греческій городь Херсонь или Корсунь, гдъ принялъ крещеніе Великій князь Владиміръ, находился въ немногихъ верстахъ въ западу отъ Севастополя, стоялъ на небольшомъ полуостровъ, образуемомъ двумя глубокими бухтами, Карантиньою (съ востока) и Стредецкою (съ запада). Онъ былъ повторительно опустошаемъ, мечемъ и огнемъ, литовскими князьями Гедиминомъ и Ольгердомъ, и послъ того не могъ уже оправиться; навонецъ турки окончательно его разорили, и потому русскіе, когда покорили Крымъ, нашли уже одет развалины. Достойно сожалънія однако, что не позаботились тотчась же о сбережени въ возможной целости этихъ развалинъ, столь богатыхъ историческими воспоминаніями, такъ что большое количество камня было взято отсюда не постройку частных домовъ въ Севастополъ. Только въ новъйпрес время Правительство обратило внимание на древний Херсонъ, и принато муры ко расчищению и сохранению глав зраших остатковъ отъ прежнихъ зданій. Между этими остатками, особеннаго вниманія заслуживаеть почти вполив уцільвшій фундаменть одной небольшой церкви, которая была построена въ видъ креста и въ доторой, дакъ догадываются, было совершено врещение Великаго янкая Владиміра. Недавно также было положено основать на развылинахъ древняго Херсона монастырь въ память Св. Владиміра, и новал церковь во имя Св. Владиміра уже построена. Назначенный жеуменомъ новаго Херсонскаго монастыря отецъ Евгеній, съ воторымъ мы имъли честь познакомиться, принималь живой интересъ въ памятинкахъ древняго города, и потому можно надъяться, что онъ двятельно будеть заботиться о дальнайшемъ ихъ расчищении и поддержаніи.

Древній Херсонъ быль построень выходцами изъ города Гераклен и составляль первоначально колонію Гераклен, а потому у древнихъ грековъ весь небольшой полуостровъ, заключающійся между задивами Севастопольскимъ и Балаклавскимъ, который находился въ зависимости отъ Херсона, назывался Херсонесомъ. Гераклеотическимъ. Полуостровъ этотъ, по геологическому своему строенію, образуетъ отдъльный, треугольный кусокъ возвышенной Крымской степи. Въ ширину, между Севастополемъ и Балаклавою,

онъ имъетъ около 12 верстъ, а въ длину, отъ Черной ръчки до мыса Херсонеса, около 20 верстъ.

Севастопольскій заливъ до сихъ поръ еще не очищенъ отъ судовъ, въ немъ затопленныхъ во время последней войны; тамъ и сямъ печально выглядывають изъ воды разснащенныя, голыя мачты. Американцы, которые взялись поднять затопленные корябли, подвигають это дело чрезвычайно медленно и успели вытащить только два или три изъ самыхъ малыхъ судовъ, но за то твиъ строже наблюдають за тымь, чтобы никто не могь утащить куска дерева, случайно оторвавшагося и выплывшаго на поверхность воды. По всей въроятности впрочемъ потопленные корабли, въ непродолжительномъ времени, должны разрушиться отъ дъйствія древоточцевъ (Teredo navalis); по крайней мъръ я нашелъ, что всв деревянныя части вытащенных судовъ были уже сильно разъъдены этими червевидными моллюсками. Вообще интересно было разсмотръть кусокъ дерева, взятаго съ такого судна: вся его внутренность была просвердена ходими древоточцевъ, выложенными известковою корою, а наружная поверхность была усвяна коническими домиками усоногихъ балановъ (Balanos). Ходы древоточцевъ большею частью шли въ длину, параллельно древеснымъ волокнамъ, только при переступленіи изъ одного слоя въ другой, принимали направление косвенное или поперечное, и имъли въ діаметръ отъ одной до трехъ линій; притомъ въ дубовомъ деревъ ходы вообще были уже, нежели въ сосновомъ. Ни одного цъльнаго древоточца намъ не удалось однако высвободить изъ дерева.

Въ Южной бухтв, насъ поразила необыкновенно сильная фосфоричность воды. Въ темный вечеръ, бывало, хребты волнъ такъ и искрятся, провдетъ яликъ и оставитъ за собою огненный слъдъ, всплеснешь воду рукою и рука обольется живо мерцающимъ свътомъ. Явленіе это происходило безъ сомнънія отъ микроскопическихъ животныхъ, наполнявшихъ воду, но мы не имъли времени заняться точнымъ его изслъдованіемъ.

Изъ лучистыхъ животныхъ намъ удалось добыть одну только актинію (Actinia zonata Rathke), которая сидъла на камиъ, лежавшемъ около берега, въ самой незначительной глубинъ. Полипъ втотъ былъ бураго цвъта, съ голубымъ поясомъ кругомъ основанія. Когда онъ втягиваль многочисленныя свои щупальца, то получаль видъ неоживленнаго кусочка мяса и принималь форму усъченнаго конуса, имъвшаго въ поперечникъ, при основаніи, около одного дюйма и въ вышину до 8 линій.

Матросы намъ разсказывали, что въ песчаныхъ мъстахъ залива водятся черви, съ пучками щетинъ по сторонамъ тъла, которые собираются иногда удилыциками и идутъ наживкою на удочки, но ни разу намъ не принесли этихъ червей, не смотря на наше объщание хорошо за нихъ заплатить (нъсколько видовъщетиноногихъ червей изъ Севастопольской бухты описаны Ратке). Морскія травы, произрастающія въ Севастопольскомъ заливъ, въ особенности Zostera marina, часто бываютъ усъяны безчисленнымъ множествомъ крошечныхъ червяковъ изъ рода Spirorbis (Spirorbis pusilla Rathke). Червячки эти сидятъ въ бълыхъ, въ два плоскихъ кольца свернутыхъ раковинкахъ, имъющихъ въ діаметрѣ не больше двухъ линій. Когда они находятся спокойно въ водъ, то выставляють изъ раковинки свои красноватыя жабры, когда же ихъ вынуть изъ воды, то они такъ глубоко прячутся въ раковину, что нътъ средства ихъ оттуда достать.

Между раками, собранными нами въ Севастополъ, была одна порода, которой мы не налодили ни подъ съвернымъ берегомъ, ни въ Евпаторіи, а именно Grapsus varius. Этотъ прасивый короткохвостый ракъ, весь испещренный красными и желтыми пятнышками и крапинками, водится въ Севастопольскомъ заливъ во множествъ и иногда выходитъ даже на сущу, пробирансь между влажными прибрежными каменьями.

Въ Севастополъ, подобно какъ въ Николаевь, между декарями Морскаго Въдомства, находилось пъсколько человъкъ изъ прежнихъ слушателей Университета Св. Владиміра. Я имълъ случай видъть изъ нихъ гг. Райниша и Загоровскаго и искренно былъ обрадованъ научнымъ ихъ стремленіемъ, стараніемъ ихъ, по мъръ средствъ своихъ, слъдить за развитіемъ современной медицины. Г. Загоровскій кромъ того посвятилъ весь досугъ свой на занятія Ботаникою, обзавелся лучшими ботаническими сочине-

ніями, основательно изучиль олору окрестностей Севистополя и составиль прекрасный мъстный гербарій. Остается только желать, чтобы ему удалось окончательно разработать и публиковать собранные имъ матеріалы.

Прежде нежели мы разстанемся съ Севастополемъ, не можемъ не упомянуть еще объ одномъ отрадномъ явленіи, дошедшемъ до нашего свъдънія. Дъло въ томъ, что Севастопольскіе яльщики состоящіе преимущественно изъ отставныхъ матросовъ, образовали между собою, безъ всякаго посторонняго вывшательства, двъ компаніи, изъ которыхъ каждая управляется своими старшинами. Одна компанія занимается перевозомъ пассажировъ между городомъ и Съверною стороною, другая между городомъ и Корабельною стороною. Всв выручаемыя деньги поступають въ общую кассу и потомъ двлятся на равные пав между участниками ком-Никакой вредной монополіи при этомъ не можеть быть, потому что существуеть для перевоза казенная такса. Поступають впрочемъ въ общую кассу не только деньги, собираемыя за перевозъ, но также и тв, которыя выручаются за всякія экстреныя Такъ какъ число яльщиковъ очень значительно, то они чередуются между собою, и каждый имветь въ недвлю насколько дней свободныхъ. На ночь всегда наряжается нъсколько ядиковъ дижурныхъ. Сами ялыщики намъ хвалились, что при теперешнемъ компанейском устройствъ никогда не бываетъ между ними никакихъ серьёзныхъ споровъ и ссоръ, какіе прежде безпрестанно случались.

Ходилъ при насъ въ городъ слухъ, что знаменитые Севистопольскіе доки, частью разрушенные непріятелемъ и съ тъхъ поръ
не исправленные, будутъ переданы во владъніе Общества пароходства и торговли, но не знаемъ, оправдался ли этотъ слухъ.
Можемъ только выразить душевное желаніе, чтобы эти исполинскія сооруженія, тъмъ или другимъ путемъ, были опять возвращены ихъ назначенію, и вообще, чтобы поскоръе изъ развалинъ
возникъ новый, цвътущій Севастополь и пріобрыть то значеніе,
которое ему указано самою природою.

## 9. Монастырь Св. Георгія и Балаклава.

На южномъ берегу Херсонеса находятся два мѣста, которыя по разнымъ причинамъ заслуживаютъ особаго вниманія, именно Монастырь Св. Георгія и Балаклава.

Мы совершили повздку въ Монастырь Св. Георгія 28 Августа. Онъ отстоитъ отъ Севастополя приблизительно на 12 верстъ и дорога туда, пролегая чрезъ возвышенную Херсонесскую степь, пересъкаетъ поперегъ шоссе, которое было проведено французами изъ Балаклавы въ Камышъ. Она проходитъ вблизи хутора, на которомъ была расположена главная квартира французовъ и поддъ котораго стоитъ высокая, деревянная каланча, ими построенная. Слъды англо-французскаго дагеря впрочемъ быстро изглаживаются, на примъръ уже совершенно изчезли красивые садики, окружавше офицерскіе балаганы, о которыхъ столько разсказывали у насъ послъ заключенія мира. Вообще это мъсто, гдъ два года тому назадъ кипъла пестрая и шумная дагерная жизнь, успъло обратиться въ пустынную степь, на которой намъ попадались только стада шурокъ и сърыхъ стренатокъ (Emberiza cirlus).

Монастырь Св. Георгія расположень дивно живописно на уступь крутаго берега, на высоть 500 футовь надъ уровнемь моря. Черныя, базальтовыя скалы, дикія, остроконечныя, окружають съ объихъ сторонъ небольшую, дуговидную бухту монастыря. Непосредственно подъ монастыремъ находится нъсколько террасъ, обставленныхъ пирамидальными тополями, а ниже-крутая покатость частью покрыта дубнякомъ, можжевельникомъ и пистаціями, частью обсажена фруктовыми деревьями и виноградомъ. На одной изъ террасъ устроенъ небольшой каменный бассейнъ, куда обильный ключъ безпрестанно вливаетъ прохладную воду.

Случайно мы прівхали въ монастырь въ день имянинъ отца Архимандрита и потому застали тамъ много гостей, въ числів ихъ также Игуменовъ монастырей Херсонесскаго и Бакчисарайскаго— Успенскаго, съ которыми мы уже прежде иміли честь познакомиться. Пріємъ намъ былъ сділанъ самый радушный и насъ уго-

Digitized by Google

щали между прочимъ пятнадцатилътнимъ виномъ изъ лозъ монастырскихъ, которое было сладко, но отличной доброты.

Отецъ Архимандритъ разсказываль нямъ, что англо оранцузскіе полководцы, и даже Омеръ-Паша, въ продолженіи всей осады Севастопольской, оказывали монастырю полное свое покровительство. Только послъ Балаклавскаго дъла, не было болье позволено монахамъ выходить изъ монастыря и вообще были прерваны всю сообщенія ихъ съ Россією. Съ другой стороны солдатамъ англооранцузской арміи строжайше было запрещено вступать въ монастырскій садъ, и мы сами видьли еще прибитую къ деревянному столбу надпись, на англійскомъ и французскомъ языкахъ, извъщавшую объ этомъ запрещеніи. Единственный ущербъ, понесенный монастыремъ, состоялъ въ томъ, что была вырублена небольшая дубовая роща, находившаяся на верхней окраинъ горы и ему принадлежавшая. Генералу Пелиссье, какъ намъ говорили, нравился русскій колокольный звонъ и не разъ онъ нарочно пріважаль послушать вечерній благовъстъ.

Скоро по своемъ прівзді мы спустились, по извилистой тропинкі, внизь къ берегу моря. Путь этоть, по причині крутости горы, чрезвычайно утомителень и самъ почтенный старець Архимандрить сознавался намъ, что онъ, въ продолженіи многолітняго своего пребыванія въ монастырі, однажды только быль внизу. За то містность въ низу очень интересная. Довольно широкій, песчаный откось окаймляеть подошву горы и исполинскихъ базальтовыхъ утесовъ. По немъ раскиданы тамъ и сямъ крупные каменные обломки, а край берега густо усыпанъ мелкими кругляками, безконечно разнообразныхъ свойствъ и цвітовъ. Въ гамой бухті выставляется изъ воды нісколько базальтовыхъ скаль, въ виді высокихъ и живописныхъ каменныхъ островковъ.

День стоялъ ясный, тихій, и вода въ бухть была прозрачна до невъроятной степени; на глубинъ многихъ аршинъ можно было различить на днъ каждую песчинку. Мы не могли устоять противъ желанія покупаться въ этой кристальной влагь, и дъйствительно никогда не ощущали большаго удовольствія отъ купанья, какъ въ этотъ разъ. Одно только было неудобство: покрывающіе

берегъ камешки оказались такъ сильно раскаленными отъ дъйствія солнечныхъ дучей, что ступать на нихъ босыми ногами было почти невозможно.

На самомъ большомъ изъ базальтовыхъ острововъ, находящихся въ бухтъ, было стадо баклановъ. Очень любопытно было видъть, какъ искусно эти широколапыя птицы карабкались по крутымъ стънамъ острова и поперемънно то соскакивали оттуда въ воду, то опять изъ воды вылъзали на скалу.

Крайне удивило насъ услышать здёсь, въ такое позднее время года, пёнье одной изъ тёхъ камышевокъ, которыхъ голосъ имбетъ большое сходство съ голосомъ кузнечиковъ. Пёнье близко подходило къ пёнью знакомыхъ намъ камышевокъ рёчной и соловьевидной (Salicaria fluviatilis et luscinioides), но отличалось какою то особенною, протяжною и острою трелью въ концё каждой строоы. Мы полагали, что эта поздняя пёвунья должна быть камышевка прятливая (Salicaria locustella), но не могли однако убёдиться въ справедливости нашей догадки. Птичка такъ упрямо держалась въ чащё тростника, которымъ была покрыта плоская ложбина небольшаго ручейка, сочащагося по покатости горы, что намъ, не смотря на все стараніе, не удалось хорошенько ее разсмотрёть.

У подножья горы, а также вездё на покатости ея, было множество красивыхъ ящерицъ, такихъ, которыхъ мы прежде нигдё еще не встрёчали. Онё были такъ увертливы и бёгали такъ шибко, даже по отвёснымъ бокамъ скалъ, что намъ удалось поймать очень немногихъ, да и то преимущественно небольшихъ. Оказалось, что онё принадлежали виду Lacerta muralis Merr., и наиближе подходили именно къ той разности, которая въ сочинени Дюмериля и Биброна описана подъ буквою d. Тамъ же вездё валялись



<sup>&#</sup>x27; Вдоль спяны, на сфромъ грунтв, тянутся два ряда неправильно очерченных, поперечныхъ, черныхъ пятенъ, а также и бока твла испещрены иногочисленными черными полосками, между которыми книзу проглядываютъ голубыя пятнышки; кончикъ хноста зеленый, брюхо свътложелтое. Безъ всякаго сомвънія къ тому же виду должно отнести ящерицу, описанную Ратке подъвазваніемъ Lacerta grammica.

больныя мертвыя стоножим (Julus), которыя въронтно не находини больше нотребнаго имъ корма. Наконецъ на берегъ было выброшено водою довольно много мертвыхъ морскихъ жуковъ, цев рода Hydrophilus (Hydrophilus piceus L.).

Неизвъстно съ точностію, когда быль основань Монастырь Св. Георгія, но по всей въроятности въ очень древнія времена. Нъсколько пещерь, высъченныхъ въ горъ, которыя до сихъ порътуть сохранились, позволяють предполагать, что весь монастырь быль первоначально пещерный. Въ послъднее время, когда еще существоваль Черноморскій олоть, на монахахъ Георгієвскаго монастыря, лежала обязанность исполнять церковныя требы на корабляхъ, уходившихъ въ море.

Въ самомъ близкомъ разстояни отъ монастыря, по направлению къ Балаклавъ, находится высокій мысъ Ая-бурунъ, которымъ кончается юрская горная цъпь, опоясывающая южный борегь Крыма. На этомъ мысъ стоялъ мъкогда храмъ Таврической Діаны или Ифигеніи, и до сихъ поръ глубокое ущелье, обграничивающее мысъ съ западной стороны, сохранило вазвание Діановой балки. По недостатку времени намъ однако мевозможно было посътить эту любопытную мъстность.

Балаклава, подобно Георгієвскому монастырю, находитов отъ Севастополя на разстояніи 12 верстъ. Мы вывхали туда 30 Августа и снова пересвили поперегъ Херсонесскую степь, мимо того мъста, гдъ была расположена Англійская главная квартира,

Мы прежде уже много слышали и читали о Балаклавъ, и потому у насъ невольно составилось въ головъ объ ней извъстное представление. Мы воображали, что она лежить въ глубокомъ котлъ, со всъхъ сторонъ окруженномъ утесистыми горами, такъ что ее можно увидъть только съ края этихъ горъ. Вышло однако не совсъмъ такъ. Она и дъйствительно лежитъ въ глубокомъ котлъ, но только котелъ этотъ широко отверстъ со стороны материка, и если ее не скоро можно увидъть, то потому, что она вся прилепилась къ одной сторонъ котла, заслоненной съ съвера горнымъ выступомъ.

Балаклавская бухта, въ сравнении съ Севастопольскою, очень

новначительна, ниветь нь длину немного болве одной версты, а въ ниврину около 170 сажень. Глубина ся, отъ южнаго волца въ съверному, постоянно уменьщается отъ 80 сажень до одной сажени. Вообще она имветъ видь продолговатаго озера, поторов съ цажнаго конца посредствомъ узкаго манала сообщается съ моремъ, а на сфверномъ концъ принимаетъ въ себя мебольшую. бодотистую рачку. Притомъ же канель или проходъ, соединяющой бухту съ открытымъ моремъ, пролегаетъ между двумя высокими горани и такъ изогнутъ, что видъ на море совершенно закрытъ и что бунта является глазамъ, какъ бы вподна замкнугою. Трудво себа вообразить гавань, которая была бы лучше запрыта отъ поякаро вътра; только узность прохода въ нее съ моря и малая величина составляють не совстви благопріятныя условія. Вода въ бухтъ, по причинъ большой высоты окружающихъ ее горъ, ностоянно является черноватою; до впрочемъ и дво ся, ближе нь сверному концу, гдв вынвается въ нее рвчка, очень наовато.

Самый городъ Балаклава расположенъ на восточной сторонъ бухты, на нъсколькихъ узкихъ террасахъ, которыми тутъ окаймияется подошва горы. Англичане его украсиди многими новыми деревянными домами. Ими же устроена и деревянная пристань, поторая занимаетъ понти исю длину восточнаго берега бухты.

Самое древнее извастие о Балаклавской бухта содержится въ Одиссев Гомера. По прайней мара описание, сдаланное Гомеромь, той гавани, въ которой было произведено Дестригонами такое стращное побоище между спутниками Одиссев, какъ нельзя лучие приходится къ Балаклавской бухта.

Въ последствии Балаклава иногократно переходила изъ рукъ пъ руки и вибста съ темъ манала название. Скиом, греки, генувацы, турки и татары попеременно ею владели; Палакіонъ, Символонъ, Цимбало были названія, которыя она носила. Еще и теперь стены и башни довольно общирной генувзской крепости стоятъ на горе, обнимающей проходъ въ бухту съ восточной стороны. Около 1780 года Балаклава была отдана баталіону арнаутовъ, навербованному въ Греческомъ Архипелаге, и эти арнауты и по настоящее время составляють почти исключительное

жаселеніе города. Безконечно діятельная жизнь, кипівшая въ Балаклавской бухтів, когда она временно находилась въ рукахъ англичанъ, опять замолкла, гавань по прежнему опустыва и даже деревянная набережная начинаеть уже разваливаться.

Валаклавской бухта всегда славилась обиліемъ въ ней рыбъ, въ особенности въ зимнее время. Скомбрія, селедка, хамса (анчо-усъ) заходять въ нее густыми массами при періодическихъ сво-ихъ странствованіяхъ, огромные табуны кефали, саргановъ (Belone rostrata) и султановъ являются сюда зимовать. Въ зиму съ 1857 на 1858 годъ набилось въ бухту столько кефали, что цѣна 1000 штукъ (сингилей) понизилась до 6 рублей. Рыбные заводы расположены частью въ самомъ проходъ, ведущемъ изъ бухты въ море, частью при устьъ этого прохода. Ловля кефали, подобно какъ въ Евпаторіи и въ Севастополь, производится также и посредствомъ рогожъ. Весною и осенью свъжая рыба посылается на Севастопольскій базаръ, а зимою отправляется также и въ Симферополь.

## 10. Южный берегъ.

Подъ названіемъ Южнаго берега Крыма, въ тъсномъ смыслъ слова, разумъютъ только тотъ участокъ окраины Таврическаго полуострова, который простирается отъ деревни Ласпи до мъстечка Алушты—и центромъ котораго служитъ уъздный городъ Ялта. Весь этотъ берегъ образуется довольно крутымъ, южнымъ склономъ Крымской горной цъпи, Яйлы, которая на всемъ означенномъ протяженіи является сплошнымъ, неразрывнымъ хребтомъ. Къ западу отъ деревни Ласпи хребетъ подступаетъ почти къ самой чертъ морскаго берега, къ востоку же постепенно болъе отъ ней



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ Одесскомъ Въстникъ недавно было помъщено извъстіе, что 26 Декабря 1859 въ Балаклавскую бухту вошла такан огромвая масса хамсы, какой не запомнятъ. Множество ея пропало и легло густымъ слоемъ на дно залива, такъ что надобно было принять особыя мъры къ очищенію бухты отъ гимлой рыбы.

отходить и наконець, по близости Алушты, оканчивается Бабуганьяйлою, за которою уже, въ видъ отдъльной горы, возвышается могучій Чатыръ-дагъ. Между Ласпи и Алуштою находятся всъ тъ южнобережскія имънія и дачи, которыя столько славятся своимъ живописнымъ мъсгоположеніемъ, своими чудесными садами и виноградниками.

Мы выбхали изъ Балаклавы рано утромъ 31 Августа, и чрезъ деревни Комару и Варнутку, направились въ село Байдаръ, гдъ находится почтовая станція. Село это (на высоть 900 футовъ надъ уровнемъ моря) лежитъ при западной оконечности знаменитой Байдарской долины, принадлежащей графу Мордвинову. Широкая и холмистая Байдарская долина простирается отъ югозапада въ съверовостоку на 16 верстъ и со всъхъ сторонъ окружена высокими горами, откуда вытекаютъ многочисленные ручьи, которые, постепенно сливаясь между собою, образуютъ наконецъ Біюкъ-узень или Черную ръчку. Всъ покатости горъ покрыты густымъ лъсомъ, преимущественно буковымъ, а самая долина занята росколными лугами и садами, коихъ главное богатство составляютъ исполинскія деревья грецкихъ оръховъ. Не менъе 10 татарскихъ деревень находится въ Байдарской долинъ.

Изъ Байдара извилистое шоссе идетъ на югъ въ горы и приводитъ къ Байдарскимъ воротамъ. Мы часто уже слышали прежде о Байдарскихъ воротахъ, но не наводили объ нихъ ближайшей справки и полагали, что название это дается какому нибудь узкому горному ущелью, чрезъ которое проходитъ дорога изъ Байдарской долины на Южный берегъ. Каково же было наше удивленіе, когда мы вдругъ, при крутомъ поворотъ дороги, увижали передъ собою дъйствительныя, каменныя ворота. Не знаемъ, кому пришла въ голову оригинальная мысль соорудить на этомъ мъстъ ворота. Они построены въ 1848 году и находятся какъ разъ на самой вершинъ Яйлы, на высотъ 1633 футовъ надъ уровнемъ моря. Въ одну сторону открывается черезъ нихъ видъ на крутой и живописный южный склонъ Яйлы, съ растилающимся у его подножья, неогляднымъ моремъ, въ другую сторону представнается глазамъ, во всей дивной красотъ, общирная Байдарская долина.

Отъ Байдарскихъ воротъ шосле спускается большими зитрагами внизъ до полугоры и потомъ поворачиваетъ къ востону, мимо Мукалятки и Кучукъ-коя въ Кикинеизъ, вездв плотво прижимаясь къ склону горы и следя за всеми его горбами в локиннами. Подлъ Мухалятки лежитъ имъніе извъстнаго любителя Орнивологін, Шатилова, гдв находится, какъ намъ говорили, довольно хорошая воддения Крымскихъ птицъ (приготовленныхъ извъстнымъ путещественникомъ Радде, во время бытности его въ Крыму). Кучукъ-ной есть татарская деревия, вимъчательная тэмъ, что въ Февраль 1786 года значительная часть ся, подмытая стенцющем съ горы водою, была разрушена и сброшена въ море. Въ ебимрномъ татарскомъ селеніи Кикинензъ находится первая отъ Байдара почтовая станція. Селеніе ото мометь служить типомъ почти всекъ южнобережских в татарских в деревень. Оно неправильно раскимуто по вругому восогору. Каждый отдельный домъ одимъ бощеть непосредственно прислоняется къ горъ, откуда можно свободно ступить, или пожалуй даже провхать верхомъ, на плосную его крышу; притомъ же каждый домъ окруженъ садомъ, или но крайней мірів обставлень огромными оріжовыми деревьями. селенія тянутся виноградники. Пониже Кикинеиза, ближе въ берегу моря, находится богатое имвніе генерала Ревельоти. Съ коугой стороны хребеть Яйлы, насупротивъ Кикинеиза, на протижения многихъ верстъ, приматно понижается, представляеть накъ бы широкую впадину, которая называется у татаръ Эски-богазъ (старос отверстіе).

На Кивинеизской станціи, при прівздв нашемъ, не оказалось лошадей, но почтовый смотритель объявиль намъ, что лошади скоро должны вернуться и ручался, что не далве, накъ чревъ часъ времени можно будетъ вхать дальше. На основаніи такого объщанія мы різшились оставить нашего слугу съ тарантасомъ на станціи, чтобы дождаться тамъ лошадей, а сами отправились впередъ пізшкомъ, съ цілью ділать маленькія экскурсіи по сторонамъ дороги и на досугі насмотрівться на живописные ландшаюты Южнаго берега.

Отъ Кининення до сивдующей станціи, Мизгорской, считнетен

15 верстъ и шоссе постоянно продолжаетъ змѣеобразно извиваться вдоль полугоры. По одну сторону высоко поднимается утесистый горный кряжъ, поросшій тамъ и сямъ таврическими соснами (Pinus laricio); по другую сторону, до уровня моря, спускается волнистая покатость, покрытая рощами, садами и виноградниками, между которыми выглядываютъ красивыя дачи. Мѣстами съ одного болу отвѣсныя скалы, на подобіе сплошной каменной стѣны, окаймляютъ шоссе, а съ другаго боку разверзаются подъ нимъ глубокія лощины или страшныя пропасти. Между дачами, въ особенности, останавливали на себѣ наши взоры Сименсъ, дача гг. Мальцовыхъ, построенная на самомъ берегу моря и окруженная роскошными садами, и Алупва, прекрасный дворецъ князя Воронцова.

Добыча наша, сдъланная по окраинамъ дороги, была небольшая, состояла изъ нъсколькихъ ящерицъ (Lacerta taurica) и изъ немногихъ сороконожекъ, стоножекъ и жуковъ. Изъ птицъ намъ попадались только нъкоторые соколики (Falco tinnunculus et subbuteo), луни (Circus cyaneus), полунощники (Caprimulgus europaeus), разныя стренатки (Emberiza citrinella, cirlus et hortulana) и горлицы.

Мы вышли изъ Кикинеиза въ первомъ часу по полудни, а не раньше, какъ въ восьмомъ часу вечера, когда уже мы успъли совершенно поровняться съ Алупкою (отстоящею отъ Мизгора на 4 версты) насъ догналъ нашъ тарантасъ. Вечеръ былъ очень прохладный, такъ что мы въ первый же день своего пребыванія на Южномъ берегу порядочно продрогли. Сверхъ того быстро стало темнъть, и потому мы поспъшили уже пряго въ Ялту, нигдъ болье не останавливаясь. Въ единственной Ялтинской гостиницъ всъ номера были заняты, такъ что намъ пришлось искать другое пристанище, и мы съ трудомъ могли отыскать небольшую квартиру въ частномъ домъ, за 3 рубля въ сутки.

Ялта очень небольшой городъ, содержащій едва ли больше сотни домовъ, между которыми находится однако довольно много двуэтажныхъ. Онъ основанъ въ 1537 году на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стояла греческая деревня Ялита, непосредственно на берегу моря. Позади города простирается довольно обширная, холмистая долина, по которой сбѣгаютъ въ море нѣсколько ручьевъ и въ которой

цежать предолько татарских селеній, съ большими садами и табачными плантаціями. Ядтинская долина отдичается вообще плодородієм и благодатным климатом, такъ что самая Ялта непременно разрослась бы чрезъ короткое время въ значительный говодъ, еслибъ только имъла хорошую гавань. Но къ сожальнію широкая Ялтинская бухта, заключенная между мысами Ай-тодоромъ и Никитою, остается совершенно открытою для юговосточныхъ вътровъ и потому не составляетъ надежнаго пристанища для купеческихъ судовъ. Останавливаются только въ Ялтъ, по нъсколько разъ въ недълю, пароходы Общества пароходства и торговли, съ пассажирами, которые желаютъ или временно поселиться въ городь, для употребленія морскихъ купаній, или сдълать путеществіе по Южному берегу.

Спутникъ мой г. Ельскій прожиль въ Ялть, какъ уже было уприничаль ботаническія и энтомологическія экскурсіи во всъ ближайшія окрестности, нъсколько разъ поднимался на Яйлу, и кромъ того придежно посыщаль рыбный заводь, который находится въ полуверсть отъ города, съ восточной стороны, Между рыбами, имъ добытыми, были нъкоторыя очень ръдкія, а именно слъдующія.

1, Одинъ вкземпляръ вида Serranus scriba Cuv. Первое извъстіе объ существованіи этой рыбы въ Черномъ морѣ сообщено
Нордманомъ, которому попалъ въ руки одинъ экземпляръ въ Сухумъ-кале. Рыба эта, принадлежащая къ семейству окуневыхъ,
чрезвычайно интересна въ томъ отношеніи, что почитается гермаородитною, хотя впрочемъ явленіе это еще подлежитъ нѣкоторому
сомнѣнію. Дъло въ томъ, что до сихъ поръ никогда не было накодимо мужескихъ недѣлимыхъ, а попадались постоянно одни только
недѣлимыя женскія, съ икрянымъ мышкомъ; а въ слѣдствіе того
родълось мнѣніе, будто бы особая бѣлая желѣзка, находящанся
на наружной стѣнкѣ икрянаго мѣшка и достигающая наибольшаго
развитія въ то время, когда созрѣваетъ икра, представляетъ собою
молоки. Только точнъйшее изслѣдованіе сказанной желѣзки и открытіе въ ней семянчатокъ (spermatozoa), могло бы дать окончательное рѣшеніе вопроса, но оно еще не произведено. Въ экземп-

ларв, добытомъ г. Ельскимъ, икраной мъшокъ оказался почти сог всъмъ опорожненнымъ отъ ямчекъ, а желъзка, приросіпая къ мвійку, совершенно совпавшею.

- 2. Одна небольшая собачка, принадлежащая виду Вісппіць Моптадці Fістпіць. Рыбка эта никъмъ еще не была находима прежде въ Черномъ моръ. Главные отличительные признаки си слъдующіє: по серединъ темени, непосредственно позади главъ, терчитъ поперечная, толстая, кожистая лопастинка, на верхнемъ краю зубчатонадръзанная, а дальше на затылкъ, въ одной продольной линіи, стоятъ четыре кожистыя нити; спинной плавникъ содержитъ глубокую выемку, которою передніе жесткіе лучи, числомъ 13, отдъляются отъ 17 мягкихъ заднихъ лучей. Экземпляръ, добытый г. Ельскимъ, былъ длиною въ 16 линій и имълъ въ верхней челюсти 36 рѣзцовъ, въ нижней 26, съ двумя небольшими клыками съ каждой стороны.
- 3. Одинъ небольшой бычовъ вида Gobius leopardinus Nordm.; о которомъ была уже ръчь.
- 4. Нъсколько небольшихъ вкземпляривъ вида Lepadogaster biciliatus Risso. Эта красивая рыбка, по устройству брюшныхъ плавниковъ нъсколько подходящая къ бычнамъ, была открыта въ Чермомъ моръ, а именно по близости Севастополя, гг. Ратке и Нордманомъ.
- 5. Одна небольшая зеленуха, принадлежащая по всей въронтности новох у виду, близкому, по пятнамъ и по числу плавниковниълучей, къ виду Crenilabrus ocellatus Forsk. Къ сожалънію однано она плохо сохранилась, лишилась всей чешун, такъ что мы не можемъ представить подробнаго ся описанія. Можемъ только сказать, что главный отличительный ся признакъ составляють три небольнія, роговыя, суставчатыя нити, занимающія верхній уголь на заднемъкраю жаберной прышки.

Вообще же неменистая Ялтинская бухта, какъ выходить изъ наблюденій г. Ельскаго, изобилуеть разными бычками (между ними G. ophiocephalus и G. platyrostris), зеленуками и въ особенности собачками.

Ящерицы, собранныя г. Ельскимъ въ Ялтинской долинъ, относились въ видамъ Lacerta stirpium, Lacerta taurica и Lacerta muralis. Очень часто также ему попадались поломанныя, сухія части желтопуза (Pseudopus Pallasii Cuv.), но ни одного живаго экземпляра не удалось ему найти. По всей въроятности время года было уже слишкомъ позднее для этой огромной, безногой ящерицы. Изълятушекъ онъ нашелъ нъсколько квакушъ (Hyla arborea), совершенно сходныхъ съ тъми, которыя живутъ въ нашихъ мъстехъ.

Нъсколько штукъ скорпіоновъ, пойманныхъ г. Ельскимъ, принадлежали виду Scorpio europaeus; но слышалъ я въ Симферополъ отъ Н. И. Иванова, который также доставилъ миъ съ десятокъ тъхъ же скорпіоновъ, что въ эрной какой-то мъстности Южнаго берега встръчается еще другая порода скорпіоновъ, больше ростомъ и темнъе цвътомъ противъ обыкновенныхъ.

Изъ короткохвостыхъ раковъ въ значительномъ числъ водится въ Ялтинской бухтъ Grapsus varius.

Между жуками, собранными г. Ельскимъ въ окрестностяхъ Ялты, находились: 1. Procerus tauricus Pall., замъчательный по своей величинъ и красотъ; 2. Hister inaequalis Fabr.; 3. Ontophagus nigellus Illig. въ пометъ; 4. Aphodius serulator Herbst, въ горахъ, въ пометъ; 5. Lacon crenicollis Ménétr., на берегу ручья, подъкамнями; 6. Helops coeruleus L., весьма красивый, въ горахъ, въ лъсу; 7. Timarcha tenebricosa Fabr. (an subcyanea Steven?) въ горахъ; 8. Otiorhynchus tauricus Stev. и 9. Otiorhynchus asphaltinus Stev. подъкамнями и опавшими листьями, объъдаютъ будто бы весною почки винограда.

Большая помощь во всемъ была оказана г. Ельскому, во время его пребыванія въ Ялтъ, уъзднымъ Ялтинскимъ врачемъ И. В. Билинскимъ, прежнимъ слушателемъ Университета Св. Владиміра. Мнъ было по этому очень прискорбно, что я не могъ самъ видъть и поблагодарить г. Билинскаго, такъ какъ онъ лежалъ больной сильною лихорадкою, когда я пріъхалъ въ Ялту. Чрезвычайно также хвалилъ г. Ельскій гостепріимство, оказанное ему татарами въ различныхъ экскурсіяхъ, совершенныхъ имъ въ окрестныя горы.

Утромъ 1 Сентября мы отправились верхомъ въ Алупку, такъ какъ не могли накан нъ ближе осмотръть этой знаменитой дачи, которая по живописности мъстоположения, по стараниямъ и

средствамъ, употребленнымъ на ея обдълку, занимаетъ первое мъсто на всемъ Южномъ берегу. Алупка отстоитъ отъ Ялты приблизительно на 17 верстъ, а отъ Мисгорской почтовой станціи на 4 версты. Шоссе поднимается сначала въ гору до Левадіи, богатаго имънія графа Потоцкаго, украшеннаго красивымъ дворцомъ, а потомъ идетъ дальше полугорою, мимо цълаго ряда дачъ, окруженныхъ роскошными рощами, садами и виноградниками. Между ними первенство безъ сомнънія принадлежитъ Оріандъ, которая непосредственно граничитъ съ Левадіею и составляетъ собственность Вдовствующей Императрицы Александры Өеодоровны., Мисгоръ есть обширное имъніе Нарышкина. Почти отъ самой Мисгорской станціи, насупротивъ которой находится прекрасный фонтанъ, дорога раздъляется на двъ вътви, изъ которыхъ пижняя ведетъ въ Алупку.

Любимый льтній дворецъ князя М. С. Воронцова построенъ изъ плотнаго зеленовато съраго діорита (діабаза), въ англо-готическомъ вкусъ. Въ немъ соединяются изящная наружная отдълка съ богатымъ внутреннимъ комфортомъ. Высокіе кипарисы, стоящіе подлів дворца, поражають непривычный кънимъ глазъ своею стройною формою и темною зеленью. Цвлыя рощи изъ лавровыхъ и оливковыхъ деревьевъ свидътельствуютъ о благодатномъ илимать южнаго берега Крыма. Весь общирный садъ, въ отношения къ положенію дворца, разділяется на верхній и нижній. Верхній садъ скорве впрочемъ заслуживаетъ название горнаго парка: извилистыя дорожки его окаймляются то густою листвою деревьевъ и кустовъ, то голыми скалами и грудами каменныхъ обломковъ; тутъ приводять васъ къ прозрачному пруду, населенному форедями, или къ шумящему каскаду, тамъ къ красивому гроту или въ сквозной пещеръ. Къ садамъ, съ восточной стороны, непосредственно примыкаютъ пространные виноградники, засаженные всыми лучшими сортами Европейскихъ лозъ. Въ недальнемъ разстоянім отъ княжескаго дворца, съ западной стороны, находится большая татарская деревня Алупка, при которой построена княземъ Михаиломъ Семеновичемъ красивая мечеть, съвысокимъ минаретомъ.

Спеціальнаго вниманія геолога заслуживаеть въ Алупкъ слъ-

дующее явленіе: въ такъ называемомъ верхнемъ саду, приблизительно на высотъ 300 футовъ надъ уровнемъ моря, находятся двъ глубокія, кругловатыя впадины, изъкоторыхъ каждая имъетъ въ поперечникъ нъсколько сотъ шаговъ. Какъ дно этихъ впадинъ, такъ и края ихъ усъяны огромными обломками діорита, неправильно нагроможденными одинъ на другой. Подобные же каменные обломки, только разбросанные болье по одиночкъ, покрываютъ и всю покатость горы до амаго морскаго берега, тогда какъ выше впадинъ ихъ вовсе не существуетъ. Очевидно по этому, что означенныя впадины составляютъ остатки жерлъ, пробитыхъ нъкогда въ каменной коръ земной внезапнымъ напоромъ разрушительныхъ силъ, подъ нею заключенныхъ.

Утромъ 2 Сентября мы собрались въ дальнъйшій путь по Южному берегу, при чемъ опять имъли значительную задержку въ полученіи почтовыхъ лошадей, которая на этотъ разъ происходила отъ злоупотребленія, часто дозволяемаго себъ нъкоторыми знатными лицами. Въ этомъ случав именно одинъ князь, имъвшій подорожную на три лошади, еще за нъсколько часовъ до своего выъзда изъ Ялты, потребовалъ, чтобы для него держали въ готовности на станціи шесть лошадей подъ карету и сверхъ того перекладную тройку.

По направленію къ Алупкъ первую почтовую станцію составляеть Ай-даниль, отстоящая отъ Ялты на 11 версть. Итоссе поднимается въ гору мимо Маврикіи (прежде Учь-чамъ), дачи г. Понятовскаго, въ Массандру, другое южнобережское имъніе князя Воронцова, которое простирается отъ хребта Яйлы до морскаго берега и заключаетъ до 800 десятинъ земли. Главное богатство Массандры составляютъ общирные виноградники, съ находящимися при нихъ экономическими строеніями и огромными винными погребами. Съ Массандрою граничитъ Магарачъ, казенный виноградный садъ, при которомъ находится училище винодълія, основанное въ 1828 году, съ цълью распространенія на Южномъ берегу лучшихъ сортовъ винограда и образованія опытныхъ винодъловъ. Магарачское училище состоитъ въ въдомствъ директора знаменитаго Никитскаго сада, занимающаго люкатость горы на седьмой верств отъ Ялты, ниже татарскаго селенія Никиты.

Такъ какъ г. Ельскій уже прежде, во время своего пребыванія въ Ялть, нъсколько разъ посъщаль Никиту, то онъ предпочель на этоть разъ сдёлать небольшую экскурсію въ окрестностихъ Ай-даниля, и повхалъ туда впередъ въ тарантасв, а я отправился пъшкомъ осматривать Никитскій садъ. ' Къ крайнему моему сожальнію я не засталь дома директора сада, г. Гартвиса, занявшаго это мъсто послъ Х. Х. Стевена, и потому обратился съ просьбою о показаніи мнт сада къ завтдывающему хозяйственною частью г. Келлеру, который и исполниль мое желаніе самымъ любезнымъ образомъ. Никитскій садъ есть ботаническій, предназначенный для акклиматизаціи и разведенія всёхъ экзотическихъ растеній, какія только могуть произрастать на южномъ берегу Крыма и потому въвысшей степени интересный. Онъ быль основанъ герцогомъ Ришельё въ 1812 году и находился въ завъдываніи Х. Х. Стевена по 1824 годъ. Почти всв экзотическіе кустарники и деревья, разводимые нынче на Южномъ берегу, Итальянскіе, Испанскіе, Кавказскіе, Индейскіе, Китайскіе, Японскіе, Американскіе, вышли изъ Никитскаго сада. Я любовался въ особенности различными видами дубовъ (Quercus suber L., Quercus virens Ait., Quercus glabra Siebold, Quercus castanaeofolia Meyer etc.) и собраніемъ хвойныхъ деревъ, изъ которыхъ нъкоторыя удивительно красивы, какъ напримъръ Abies Pinsabo Boiss., Abies Nordmanniana Steven, Pinus Sabiniana Dougl., Pinus cedens L., Gingko biloba Salish. и такъ далъе. Самые большіе изъ стройныхъ, остроконечныхъ кипарисовъ, которыхъ находится цълая роща, въ 1857 году имъли 104 фута вышины. Различныхъ сортовъ винограда, разводимыхъ въ Никитъ, считается около 300, изъ которыхъ однако только самые ранніе, при посъщеніи мною сада, успъли созрыть Собираніе винограда для выд'влки вина начинается обыкновенно съ половины Сентярбя. Самыя дорогія вина Никитскія, между про-



<sup>&#</sup>x27;Ст. о Ныкитскомъ свять любовытвую статью г. ак демика Кеппева: Ueber Pflanzen-Acclimatisirung in Russland, 1856 (Bulletin historico-philol. T. XIII),

чимъ одно сладкое, близко подходящее въ гладкому Венгерскому, продаются по 2 рубля бутылка, сямыя же дешевыя отъ 5 до 8 рублей ведро.

У г. Келлера случилось мий также видёть сётки, посредствомъ которыхъ производится на Южномъ берегу ловля перепелокъ, во время осенняго ихъ перелета, который продолжается обыкновенно отъ половины Августа до половины или до исхода Сентября. Сётки эти имёютъ видъ небольшаго мёшка, придёланнаго къ круглому обручу и сидящаго на длинной рукояткъ. Охота происходитъ ночью, при помощи фонаря; высмотрённыя опытнымъ глазомъ охотника, перепелки накрываются сётью. Говорятъ, что хорошій охотникъ въ продолженіи одной ночи можетъ поймать до 50 штукъ перепеловъ.

Когда я прівхаль, въ третьемъ часу по полудни, на станцію Ай-даниль, то уже засталь тамъ и г. Ельскаго, который усцівль вернуться изъ предпринятой имъ экскурсіи. Ему удалось между прочимъ наловить довольно много короткохвостыхъ раковъ, изъ вида Thelphusa fluviatilis, которые сидёли подъ камнями, устилающими дно небольшаго ручья, протекающаго чрезъ Ай-даниль.

Ай-даниль, подобно Алупкъ и Массандръ, есть имъніе внязя Воронцова, также содержащее очень богатые виноградники. Особый сортъ пвиящагося вина, въ большомъ количествъ здъсь выдълываемаго, даже извъстенъ въ продажъ подъ названіемъ Ай-даниль. Отъ Ай-даниля до следующей станціи Біюкъ-ломбатской, считается Непосредственно за Ай-данилемъ следуетъ Урсуфъ, имъніе сенатора И. И. Фундуклея (принадлежавшее нъкогда герцогу Ришельё). Имъніе это растилается по холмамъ, опоясывающимъ берега довольно глубокаго и красиваго залива и въ нъкоторыхъ отношеніяхъ, въ особенности по плодородію почвы, лучшее на всемъ южномъ берегу. Самые высокіе кипарисы, самыя роскошныя магноліи, самые величественные чинары и дубы принадлежать Вмість съ тімь Урсуфскій заливь составляеть самое удобное мъсто для морскихъ купаній на Южномъ берегу. Мы очень сожальни по этому, что по недостатку времени не могли посвтить Урсуфа и должны были ограничиться темъ, чтобы полюбоваться

на картинное его мъстоположение съ почтовой дороги. Урсусскую бухту съ западной стороны обграничиваетъ мысъ Никита, а съ восточной мысъ Аю-дагъ. т. е. медвъдь-гора. Въ самомъ дълъ придуманное татарами название какъ нельзя лучше идетъ къ продолговатой, лъсистой горъ, образующей мысъ Аю-дагъ. Она формою своею неволно наводчтъ мысль на исполинскато медвъдя, лежащаго на берегу, съ мордою, обращенною къ морю и погруженною между передними лапами. Название Криметопонъ, баранъяголова, которое давали древние греки этой горъ, привлекающей къ себъ взоры своимъ одиночествомъ и своею странною фигурою, безъ сомнъния было гораздо менъе удачно.

Кучукъ-ломбатъ принадлежитъ князю Гагарину и славится отличными виноградниками и оруктовыми садами. Въ двухъ верстахъ отъ Кучукъ-ломбата, выше въ горахъ, лежитъ Карабахъ, имъне г. академика Кеппена, гдъ нагромождены въ безпорядкъ такіе же каменные обломки, какъ въ Алупкъ. Намъ говорили на почтовой станціи, что г. Кеппенъ находится въ своемъ имъній, но такъ какъ мы непремънно желали въ тотъ же день поспъть въ Симферополь, то и должны были отказать себъ въ удовольствіи представиться знаменитому ученому.

Отъ Кучукъ-ломбата до Алушты всего 13 верстъ и дорога проходитъ по съверному склону крутой, колпаковидной Кастельгоры, которая подобно Аю-дагу, стоитъ уединенно на берегу моря. Мы прівхали въ Алушту въ шестомъ часу по полудни, но тутъ опять не оказалось почтовыхъ лошадей и насъ, безпрестанно объщая скоро отправить, продержали до слъдующаго утра. Такимъ образомъ намъ пришлось тотчасъ же горько раскаяться вътомъ, что мы не завернули къ г. Кеппену.

Алушта есть обширное татарское селеніе, занимающее южную покатость длиннаго холма, которымъ широкая Алуштинская впадина раздъляется на двъ долины, Корбеклинскую и Шумскую, составляющія ложбины двухъ ръкъ, Улу-узеня и Демирджи-узеня. Первая изъ этихъ долинъ проходитъ къ подножію Бабуганъ-яйлы, вторая връзывается между Чатыръ-дагомъ и Демирджи-яйлою; объ ваполнены богатыми виноградниками и оруктовыми садами. На

Digitized by Google

вершинъ холма, непосредственно надъ плоскими крышами Алуштинскихъ домовъ, картинно возвышаются развалины замка, построеннаго въ шестомъ въкъ императоромъ Юстиніаномъ. Часть стънъ и три башни древняго замка Алустона еще довольно хорошо сохранились.

Въ одномъ саду, расположенномъ на берегу ръчки Улу узеня, мы опять услышали голосъ той камышевки (Salicaria locustella?), которой пъніе такъ насъ поразило у подножія монастыря Св. Георгія; но и на этотъ разъ мы не были счастливъе въ попыткъ ближе разсмотръть интересную птичку. Въ томъ же саду, по стволамъ фруктовыхъ деревьевъ ползали во множествъ огромныя улитки (Helix lucorum L.). Вечеръ вообще былъ теплый и тихій и мы воспользовались имъ, чтобы въ послъдній разъ выкупаться въ моръ.

Алуштою оканчивается такъ называемый южный берегъ Крыма. Прекрасное шоссе, обязанное своимъ сооружениемъ князю Воронцову, которое вьется вдоль середины косогора, отъ Ляспи до Ялты и отъ Ялты до Алушты, здёсь круго поворачиваеть на северъ. поднимается на горную съдловину (лежащую 2623 фута надъ уровнемъ моря), отдъляющую Чатыръ-дагъ отъ Самаръ-коя и Демирджияйлы, и оттуда нисходить въ долину Ангары. Далве къ востоку нътъ уже хорошей взжалой дороги, а существують лишь тропинки и дорожки, доступныя почти только для татарскихъ лошадей; натъ тамъ и тъхъ роскошныхъ дачъ, которыми унизанъ югозападный берегь. Главный хребеть Яйлы тамъ далее отступаеть во внутренность полуострова, но за то между нимъ и моремъ воздымаются другія высокія горы, которыя прорізываются узкими, глубокими ущеліями, и часто крутою стіною обрамляють самый берегь. Намъ разсказывали, что въ горахъ юговосточнаго берега находятся татарскія селенія, куда еще не проникаль ни одинь путешественникъ и куда только одинъ разъ въ годъ, среди лъта, заглянетъ. земскій начальникъ. Впрочемъ и югозападныя горы еще далеко не вполнъ изслъдованы; на примъръ тамъ, при истокахъ Альмы, нъсколько лътъ тому назадъ, была открыта цълая роща березъ (Betula alba), тогда какъ прежде утверждали, что въ Крыму береза вовсе не произрастаетъ.

Хорошъ южный берегъ Крыма, дивно хорошъ! По благодатности климата и картинности ландшафтовъ онъ составляетъ въроятно лучшій уголокъ во всей Европейской Россіи; но мало на Человъкъ, привыкшій къ широкимъ русскимъ немъ простору. льсамъ и степямъ, чувствуетъ себя какъ-то стесненнымъ на Южномъ берегу. Тамъ нътъ почти клочка ровной земли, который быль бы способень служить пахатнымь полемь и удобень для постройки правильнаго города. Притомъ же отсутствіе на немъ всякаго безопаснаго становища для судовъ и значительная высота плотно его опоясывающаго горнаго хребта составляють весьма невыгодныя условія для развитія торговой діятельности. безъ сомнънія причины, по которымъ Южный берегъ никогда не имълъ самостоятельной жизни, никогда даже не игралъ важной роли въ богатой переворотами исторіи Таврическаго полуострова, и по которымъ онъ на всегда будетъ имъть для Россіи значеніе только огромнаго виноградника и сада.

Отъ Алушты до Симферополя считается 44 версты, которыя раздълены на три перегона. Рано утромъ 3 Сентября мы оставили Алушту; съ вершины горы, чрезъ которую пролегаетъ шоссе, въ послъдній разъ полюбовались очаровательнымъ видомъ Южнаго берега и около полудня снова възхали въ пыльныя улицы Симферополя.

## 11. Повздка въ Судакъ.

Наступила пора собираться въ обратный путь, но предъ вывадомъ изъ Крыма мив хотвлось непремвию еще повидаться въ почтеннымъ старцомъ, почетнымъ членомъ нашего Университета, Христіаномъ Христіановичемъ Стевеномъ, котораго имя такъ твсно связано съ одорою и оауною Таврическаго полуострова. Г. Стевенъ въ последнее время совершенно поселился въ своемъ Судацкомъ имъніи и потому я рёшился туда къ нему тхать, тъмъ болъе, что давно уже получилъ отъ него любезное приглашеніе. Я выъхалъ въ Судакъ 5 Сентября, а г. Ельскій, въ тотъ же день,

отправился въ Херсонъ, чтобы тамъ, въ ожиданіи моего прівзда, сдъдать еще нісколько вкскурсій на Дивпровскіе острова.

Судакъ лежитъ при устъв маленькой рвчки Таракташа, на берегу широкой, дуговидной бухты, которую съ восточной стороны обграничиваетъ большой горный выступъ, образующій мысы Килеабурунъ и Меганомъ. Отъ Симферополя до Судака считается около 100 версть, а отъ Судака до Өеодсін около 50 версть. Приходится вкать изъ Симферополя въ Судакъ по тракту Оеодосійскому, чрезъ Карасу-базаръ, до станціи Бурундудкой и тамъ уже поворотить на югь, въ горы, проседочною дорогою. Существоваль прежде почтовый трактъ до самаго Судака, но во время последней войны быль уничтожень и сътрхъ поръ не возстановленъ. Я совершиль путь отъ Симферополя до Бурундуцкой станцін въ пріятномъ обществъ директора гимназіи А. И. Смоленскаго, который отправлялся на осмотръ Өеодосійскихъ и Керченскихъ училищъ; на Бурундуцкой станціи я остался ночевать и уже угромъ 6 Сентября, на обывательскихъ лошадяхъ, продолжаль путешествіе въ Судакъ. Дорога изъ Бурундука идетъ чрезъ красивую Армянскую колонію Кышлавъ въ обширное русское селение Салы, а оттуда чрезъ Эльбузды въ татарскую деревню Суукъ-су, лежащую въ томъ мъсть, гдъ нъсколько ручьевъ, сливаясь между собою, образуютъ рвчку Таракташъ. Между Эльбузлами и Суукъ-су тянется, по направленію съ запада на востокъ, горный хребетъ, которымъ воды, текущія къ свверу, въ Сивашъ, отделяются отъ водъ, бъгущихъ на югъ, въ Червое море. Этогъ, горный хребетъ составдяетъ очевидно продолжение южнобережской Яйлы, но далеко уступаетъ ей въ высотв. Отъ Суукъ-су до самаго Судака дорога уже постоянно вьется вдоль долины, по которой течетъ ръчка Долина эта мъстами расширяется, мъстами съуживается, но вообще довольно тесна. Дно ел занято дугами, а склоны горъ, ее обрамляющихъ, покрыты красивыми, лиственными лъсами. Только около татарскаго селенія Таракташа начинаются тъ многочисленные виноградные и фруктовые сады, которые составляютъ богатство Судацкой долины и доставили ей почетную извъстность во всей Россіи.

Изъ птицъ, въроятно по причинъ поздняго времени года, миъ попадались, подлё дороги, очень немногія. Тамъ и сямъ тольно сидълъ на деревъ лънивый сарычъ (Buteo vulgaris Bechst.), или передетало вдоль опушки лъса, съ произительнымъ крикомъ, стало соекъ (Garrulus glandarius, var Krynickii Kalenicz.); около каменистыхъ ручьевъ бъгали, кивая хвостомъ, бълыя трясогузки (Motacilla alba L.). На дугахъ, около селенія Суукъ-су, мев привелось видеть, въ первый разъ въ жизни, пасущихся на свободъ буйволовъ. Неизвъстно положительно, къмъ и когда буйволы были разведены въ Крыму. Они встречаются нынче почти исключительно только въ дъсистыхъ додинахъ восточныхъ Крымскихъ горъ и очень малорослы, въроятно, въ следствие не совсемъ благоприятныхъ для нихъ жизненныхъ условій. Татары держать буйлововъ частью для молока, такъ какъ буйволовыя коровы (у которыхъ четыре сосца расположены въ одной поперечной линіи) отличаются своею молочностью, частью для перевозки тяжестей по крутымъ гористымъ дорогамъ, потому что ширококопытныя эти животныя еще лучше пригодны для этой цвли, нежели обыкновенные волы.

Двукодесныя татарскія арбы, запряженныя парою буйволовъ жды водовъ, встрѣчались мнѣ въ этотъ день почти на наждомъ шагу. Неуклюжія эти повозки имѣютъ форму узкихъ, длинныхъ ящиковъ, которые переднимъ концемъ упираются на дышло, такъ что волы или буйволы являются какъ бы припряженными къ нимъ съ боковъ. Страшный скрипъ немазанныхъ и необитыхъ желѣзомъ колесъ всегда уже издалека извѣщаетъ о приближеніи подобиой арбы. Татары говорятъ, что такимъ способомъ всякій заранѣе уже узнає́тъ, что ѣдетъ къ нему на встрѣчу честный человѣкъ; по тодько частая встрѣча съ такими честными людьми бываетъ въ высшей степени непріятна.

Я пріжхаль въ Судакь во второмь часу по полудни и нашель самый ласковый и радушный пріємь у г. Стевена и милаго его семейства. Немногіе дни, проведенные мною въ Судакь, на всегда составять для меня драгоцінное воспоминаніе; никогда не изгладится изъ моей памяти образь любезнаго старца, который столько содійствоваль разъясненію Естественной исторіи Таврическаго

полуострова <sup>1</sup> и до сихъ поръ продолжаетъ слъдить съ теплымъ участіемъ за всъми разысканіями, для этой цъли предпринимаемыми.

Вся Судацкая долина раздёлена на множество небольшихъ участковъ, занятыхъ виноградниками и оруктовыми садами и принадлежащихъ частнымъ владёльцамъ. Многіе владёльцы, подобно г. Стевену, имъютъ здёсь свое постоянное пребываніе и занимаются винодёліемъ. Судацкія вина впрочемъ въ добротё далеко уступаютъ Южнобережскимъ и вообще пріобрёли извёстность не столько своимъ качествомъ, сколько своимъ количествомъ. За ведро Судацкаго вина обыкновенно платится на мёстё отъ одного до двухъ рублей серебромъ.

Судавъ у древнихъ грековъ назывался Солдая и въ теченіи долгаго времени составлядъ цвътущую, торговую колонію. Потомъ онъ находился болье 100 льтъ во владыніи генуэзцевъ, которые построили на горь, опоясывающей съ западной стороны устье Судацкой долины, пространную крыпость. Остатки отъ стыть и башень этой крыпости до сихъ поръ сохранились и въ три яруса окружаютъ вершину горы, у подножія которой теперь находится небольшая ньмецкая колонія.

Утромъ 7 Сентября я отправился, по предложенію г. Стевена, на рыбный заводъ, который находится по близости Судака и принадлежитъ колонисту Гафнеру. Заводъ расположенъ къ западу отъ Судака, въ маленькой бухтв, въ которую открывается небольшая долина, получившая отъ владвльца ея, князя Керкеулидзева, громкое названіе Новый Свётъ. Долина Новый Свётъ отдёляется отъ Судацкой долины довольно высокими и крутыми горами, и вообще удободоступна только со стороны моря, такъ что составляетъ весьма уединенный уголокъ. Новосвётскій рыбный заводъ устроенъ на подобіе Тарханкутскихъ заводовъ и назначенъ главнымъ образомъ для ловли кефали и скомбріи. Для ловли кефали бываетъ два періода, весенній, отъ Марта до начала Мая, и осенній, отъ исхода Іюля до половины Сентября. Въ весенній періодъ



<sup>&#</sup>x27; Послъднее сочинение г. Стевена, вышелшее въ 1857 году, имъетъ заглавие: Verzeichniss der auf der taurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen. Въ невъ исчислено и частью описано 1654 вида явнобрачныхъ растения.

веоаль бываеть очень худа и идеть съ запада на востокъ, въ осений же періодъ она несравненно жирнве и идеть съ востока на западъ. Замвчено, что чвиъ раньше весною кефаль предпринимаетъ путешествіе на востокъ, твиъ раньше осенью оттуда возвращается. Лабанъ или кефалъ мечетъ икру раньше сингиля (остроносика); между сингилями попадаются иные съ икрою еще въ началь Сентября. Скомбрія осенью начинаетъ обыкновенно показываться уже посль кефали и продолжаетъ иногда ловиться до исхода Ноября мъсяца. Сти, употребляемыя для ловли скомбріи, отличаются отъ кефалевыхъ стей только меньшими ячеями. Табуны скомбріи бываютъ иногда чрезвычайно велики. Былъ такой годъ, что на Новосвътскомъ заводь поймали въ одну осень до 250000 штукъ скомбріи. Для ловли кефали, кромъ стей, употребляются также и рогожи.

Кромъ кефали и скомбріи въ Новосвътской бухть встръчаются и ловятся еще разныя другія рыбы.

Попадается изръдка Scrranus scriba Cuv. но нътъ даже особаго названія этой рыбъ; мнъ подарили сухой экземпляръ, который былъ положенъ въ соль вмъсть съ другими рыбами.

Морской скорніонъ (Trachinus draco L.) встрѣчается гораздо чаще. Морской скотъ или морская корова (Uranoscopus scaber L.) бываетъ изобиленъ почти во всякое время.

Летучая рыба (Trigla hyrax Pall.) бываетъ двоякаго цвъта, или буроватокрасная, или буроватострая, но вообще однако довольно ръдка.

Морской ершъ (Scorpaena porcus L) встрвчается изобильно. Никогда не предпринимаетъ дальнихъ путешествій, а живетъ освдло, постоянно въ одномъ и томъ же мьсть. Мечетъ икру подъ камнями.

Смарида (Smaris chryselis Cuv.) попадается въ большомъ количествъ.

Султанка (Mullus barbatus L.) также встръчается въ большомъ количествъ, ходитъ густыми табунами.

Паламида (Pelamys sarda Cuv.) всегда попадается по одиночив. Ставрида (Caranx trachurus Cuv.) приходить иногда большими табунами. Леферъ (Tennodon saltator Cuv.) также довится иногда въ большомъ количествъ.

Бычки попадаются разные, но однако въ гораздо меньшемъ количествъ, нежели подъ Өеодосіею. Они мечутъ икру въ норахъ или подъ камнями.

Окюсъ-балыкъ, волъ-рыба (Callionymus festivus Pall.) попадается изръдка, по одиночкъ. Мнъ подарили одинъ высушенный и нъс-колько испорченный экземпляръ.

Камбала (Rhombus maeoticus Pall.) довольно изобильна, бываеть иногда огромной величины.

Зеленухи или зеленчухи (Crenilabrus) встръчаются изобильно, разныхъ породъ.

Capraнъ (Belone rostrata Faber) попадается иногда значительными табунами.

Селедка (Clupea postica Eichw.) заходить весною въ Судацкую бунту огромными табунами. Г. Гафнеръ собирался обзавестись надлежащими неводами, чтобы съ 1859 года начить производить ловлю селедокъ въ большомъ видъ.

Xancà (Engraulis encrasicholus Cuv.) почти во всякое время года попадается густыми табунами.

Морская форель (Salmo trutta L.) показывается въ поздикою осень и зимою, поднимается въ ръчку Таракташъ.

Красная рыба, какъ то бълуга, осетръ и севрюга, изръдка и только въ одиночку заблуждаются въ Судацкую бухту.

Собственно для меня закидывали въ Новосвътской бухтв нъсколько разъ небольшой неводъ (въ 60 сажень), принадлежащій г. Гафнеру, но добыча была незначительна. Было поймано около сотни саргановъ, нъсколько штукъ султанокъ, нъсколько штукъ зеленухъ (Crenilabrus lapina et fuscus) и одна небольшая камбала. Рыбаки говорили, что ловля неводомъ идетъ гораздо успъшнъе послъ первыхъ морозовъ, что тогда вся рыба дълается смирнъе, такъ что можно бываеть обойти ее неводомъ даже среди бълаго дня.

Очень поразилъ меня на заводъ г. Гафнера разноплеменный составъ артели. Самъ атаманъ былъ армянинъ, а между рыбаками

находились греки, татары, малороссы, одинь намецы и одинь отстанной солдагь, изъ неликорусской губернія.

Новосвётская букта съ восточной стороны ображанется высокою, утесистою горою, которая называется Куюмъ-дагъ, гора Орловъ, отв множества орловъ, выощихъ на ней гитада. И дъйствительно, когда и пробажаль на лодив мимо Кующъ-дага, то видълъ не менъе 15 большихъ орловъ (по всей въроятности беркутовъ, Aquila fulva), которые кружились около вершины горы.

На предгоріяхъ Судацкой долины, куда я также сділать небольшую экскурсію, попадались мит перепелки и козодом. Тамъ
же собрадь и множество удитовъ (изъ родовъ Нейх и Бийния), а
въ ръчко Таракташть нашель въ большомъ количествъ рачковъскакуновъ (Gammarus pulex). Отъ г. Стевена получилъ и въ подарокъ нъсколько штукъ ръдкихъ прямокрылыхъ насъномыхъ (Gryllus pellucidus et Gryllus bipunctatus). Отъ него же и узналь тотъ
любопытный фактъ, что въ Судацкой долинъ весною довольно
часто попадаются сольпуги (Solpuga s. Galeodes агапеоіdes Оі.). Г.
Стевенъ разскавняль мив, что онъ производиль опыты съ этими
ндовитыми пауками, носредствомъ которыхъ убъдился, что онъ
взаимно другъ друга пожирають и вполнъ также събдають схваченныхъ ими насъномыхъ, не ограничиваясь выдавливаніемъ изъ
няхъ соковъ, нодобно другимъ паукамъ.

Вогатый гербарій г. Стевена завъщанъ имъ Гельсингоорспому Университету.

Около 2 часовъ по полудия 8 Сентибря, я оставиль Судажь в къ ночи быль епять въ Симоерополъ.

## 12. Обратный путь.

Подъ вечеръ 10 Сентября я окончательно выбрался изъ Симферополя и направился, опять чрезъ Перекопъ и Бериславъ, въ Херсонъ. Ярко свътила въ это время по ночамъ величественная комета, которая въ первый разъ была миъ указана вечеромъ 3 Сентября и тогда имъла еще незначительную величину.

На степи, между Перекопомъ и Бериславомъ, опять попадались миъ стада жаворонковъ, въ особенности настоящихъ степ-

Digitized by Google

ныхъ (Alauda calandra L.) и изръдка стада чибесовъ. Въ окрестностяхъ Берислава было множество грачей и сорокъ. При этомъ и вспомнилъ, что встръчалъ очень мало сорокъ въ Крыму, а на Южномъ берегу и вовсе ихъ не видалъ.

Когда я подъвзжаль къ Херсону, рано утромъ 12 Сентября, то былъ пораженъ несмътнымъ множествомъ кобчиковъ (Falco vespertinus L.), которые тутъ находились. Во всвхъ направленіяхъ сотни ихъ трепетались на воздухъ, на протяженіи нъсколькихъ верстъ ими буквально была унизана проволока электрическаго телеграфа, мъстами они густыми стаями сидъли на поляхъ, такъ что издали можно было принять ихъ за стада грачей или чибесовъ. Навърное могу сказать, что въ продолженіи получаса видълъ ихъ иъсколько десятковъ тысячъ.

Въ Херсонъ я потомъ узналъ, что большія полчища саранчи положили яйца въ Алешкинскіе пески и привлекли туда за собою многочисленныя стада красныхъ скворцовъ (Merula rosea Briss.) и рыболововъ (Larus).

Очень въроятно, что также и неимовърное накопленіе кобчиковъ въ окрестностяхъ Херсона слъдуетъ приписать той же причинъ.

- Г. Ельскій, который пробыль въ Херсонь, въ ожиданіи моего прівзда, около четырехъдней, вздиль въ это время нізсколько разъ ловить рыбу въ протекающемъ подъ Алешками рукавъ Днівпра, называемомъ Конкою, при чемъ употребляль въ діло преимущественно небольшіе бредники. Между пойманными имъ рыбами, оказались самыми интересными слідующія:
- 1. Колюшка (Gasterosteus platygaster), та же самая, которая была найдена нами въ Одесской гавани. Въ Конкъ было поймано г. Ельскимъ 14 штукъ, всъ очень незначительной величины, очевидно молодыя, длиною отъ 12 до 14 линій. Сличеніе этихъ Алёшкинскихъ колюшекъ съ Одесскими показало намъ, что у молодыхъ рыбокъ какъ брюшной костяной щитъ, такъ и боковыя костяныя пластинки бываютъ гораздо менъе развиты, нежели у старыхъ.
- 2. Бычокъ-цуцикъ (Gobius marmoratus Pall.), встръчается въ Конкъ въ большомъ количествъ и бываетъ очень темнаго цвъта, въроятно по причинъ тинистаго дна ръчки.

- 3. Пукасъ (Rhodeus amarus Bloch) также находится въ Конкъ очень изобильно. Собранные г. Ельскимъ экземпляры успъли отнереститься, но тъмъ не менъе однако самцы сохраняли еще слъды краснаго и синяго цвътовъ.
- 4. Бобырецъ (Squalius borysthenicus Nobis). Рыбка эта оказалась совершенно новою, нигдъ еще неописанною. По образованію зубовъ и заднепроходняго плавника, она наиближе подходитъ къ головню и должна быть отнесена къ одному съ нимъ роду; но съ другой стороны значительною шириною тъла, обращенною кверху нижнею челюстью и крупною чешуею приближается къ красноперкъ (Scardinius erythropthalmus). Мы дали ей названіе Squalius borysthenicus, по мъстонахожденію. Характерная ея формула такая:

P. 
$$1/13$$
—14. V.  $1/8$ . D.  $2/8$ . A.  $3/9$ —10. C. 19. Lin. lat. 37  $\frac{VII}{II-III}$  38.

Между экземплярами, собранными г. Ельскимъ, самые большіе были длиною въ 4 дюйма. Что касается до названія бобырецъ, то оно не совсёмъ опредёлительно, такъ какъ въ разныхъ мёстахъ употребляется для разныхъ медкихъ рыбокъ.

Забравъ жестянки съ рыбами, которыя были оставлены нами у г. Раевскаго, и окончательно уложивъ всё наши коллекціи, мы оставили Херсонъ 13 Сентября и отправились (на этотъ разъ почтовою дорогою, 63 версты) въ Николаевъ. По дорогѣ попадались намъ, во множествѣ, тѣ же кобчики (Falco vespertinus), которые уже наканунѣ удивили меня своею мпогочисленностію. Въ особенности ихъ было много, также съ этой стороны, въ окрестностяхъ самаго Херсона, а дальше къ Николаеву число ихъ постепенно ум'янъ-шалось и наконецъ они стали встрѣчаться только изрѣдка, въ оди 10чку.

Въ Николаевъ мы пріобръли еще нъкоторое количество бычковъ, преимущественно гонцовъ и горлачей, и потомъ чрезъ Бобринецъ, Елисаветградъ и Новоміргородъ совершили обратный путь въ Кіевъ, куда и прибыли 16 Сентября. Комета, развернувшая уже вполнъ пышный свой хвостъ, украшала небо какъ по вечерамъ, такъ и по утрамъ, и потому въ народъ прошелъ слухъ о двухъ различыхъ кометахъ—и вмъстъ съ тъмъ о страшныхъ бъдствіяхъ, которыя будто-бы ими предвъщаются.

# Нъкоторыя общія замычанія.

1. Число встать видовъ рыбъ, до сихъ поръ найденныхъ въ съверозападной части Чернаго моря и въ пръсныхъ водахъ Россів, туда издивающихся, простирается до 152.

Виды эти по семействамъ распредвияются сладующимъ об-

Percoidei	ŗ	•	•		•	111					
Cataphracți	•					8					
Sciaenoidei						2	A 41 4 5				
Sparoidei		•				4					
Mugiloidei						6)	Acanthopteri				
Scomberoid	ei		•			5					
Blennioidei			•			7					
Gobioidei	•		•	•	•	20					
Gadoidei.	•	•				3)					
Aphidini .	•			•		1 }	Anacanthini				
Pleuronecta	e.					3)					
Labroidei o	yclo	oide	i.	•	•	9					
Chromides						1 }	Pharyngognathi				
Scomberes	ces					1)					
Siluroidei.			•			1)					
Cyprinoidei		•			•	42					
Salmones	•	•				5	Physostomi				
Esoces .		•				2					
Clupeoidei	•	•	•	•		4)					
Syngnathoi	dei		•			6	Lophobranchii				
Sturiones					•	6	Chondrostei				
Squali .					•	1)	Plagiostomi				
Rajae .	,	•		•	•	2	- 148.0000				
Hyperoartia		•	•			2	Cyclostomi				

По способу распространенія они могуть быть разділены на пять категорій, а именно морскихь, проходныхь, обоюдоводныхь, уставыхь и прісповодныхь.

Морскихъ	•	•	•	•	<b>6</b> 8
Проходныхъ .	٠		٠		11
Обоюдоводныхъ	•				6
Устьевыхъ.					7
Пресноводныхъ					60

Проходными им называемъ рыбъ, которыя живутъ собственно въ моръ, но проходять въ ръки для метанія икры и поднимаются жиотда въ никъ вверхъ, на огромное разстояміе отъ устьевъ, накъ на примъръ осетры, лососи, селедки.

Обоюдоводными мы называемъ рыбъ, которыя могутъ житъ постоянно жакъ въ мерѣ, такъ и въ ръкахъ, какъ на примъръ ивноворыя желющин, къкоторые бычки и пухлощекая игла.

Названіе устыевыхъ мы даемъ такимъ породамъ рыбъ, которыя придерживаются почти исключительно ръчныхъ устыевъ, и не открытъ отъ нихъ далеко, ни въ открытое море, ни вверхъ въръки, каковы сопачъ, нъкоторые судаки и бычки, пуголовка, шамая.

2. Осетровыя рыбы (осетръ, бёлуга и севрюга) придерживаются тёхъ частей моря, въ которыя впадають значительныя рёки и гдё въ слёдствіе того вода бываеть менёе соленою, нежели въ открытовъ морю. Если эти рыбы бывають распространены по цёлому морю Каспійскому, то потому, что вода Каспійского моря содержить примѣтно меньше поваренной соли, нежели вода Чернаго моря. 1 Стерлядь должна быть отнесена въ рыбамъ прёсноводнымъ.

Въ 1000 частяхъ по въсу содержится въ водъ:

	Каспійскаго		моря	Чернаго моря	Средиземнаго.	
Хлористаго натрія	_	8,95		<b>— 13,02 —</b>	_ 27,22	
Хлористаго магнія	_	"	-	<b>—</b> 0 <b>,29</b> —	6,14	
Сърновислой магневін	_	3,26		<b>- 1,48 -</b>	- 7,02	
Сърновислой извести	_	0,56	-	<b>–</b> 0,10 <b>–</b>	- 0,15	
Разныхъ другихъ соле	<b>H</b> —	1,23		<b>— 0,60 —</b>	0,21	
	14,00		15,49	40,74		

- 3. Никакія породы изъ семейства короповыхъ рыбъ (Сургіnoidei) не имъютъ постояннаго жительства въ моръ, и даже немногія временно заходятъ въ море, да и то только въ такія его
  части, которыхъ соленость уменьшается большими притоками пръсной воды. Одна только шамая можетъ быть причислена къ рыбамъ
  устьевымъ, такъ какъ почти постоянно придерживается ръчныхъ
  устьевъ и только для метанія икры входить въ самыя ръки.
- 4. Относительное количество разныхъ солей, содержимыхъ морскою водою, безъ сомивнія оказываетъ сильное вліяніе на животную жизнь и главивйшимъ образомъ обусловливаетъ тв чрезвычайныя различія, которыя мы находимъ въ ихтіологической фаунъ близкихъ между собою морей. Такъ на примъръ въ Каспійскомъ моръ, гдъ приходится на 1000 частей воды всего только около 9 частей поваренной соли, число всъхъ видовъ рыбъ не превышаетъ 20, да и тъ принадлежатъ къ проходнымъ, обоюдоводнымъ и устъевымъ, за исключеніемъ развъ только одной атеринки; въ съверной части Чернаго моря, гдъ на 1000 частей воды приходится 13 частей поваренной соли, число видовъ рыбъ доходитъ до 85, между которыми 17 проходныхъ и обоюдоводныхъ; въ Эгейскомъ моръ, омывающемъ Цикладскіе острова, гдъ въ 1000 частяхъ воды содержится около 27 частей поваренной соли, число видовъ рыбъ, чисто морскихъ, 1 простирается до 179.
- 5. Кром'в рыбъ проходныхъ, обоюдоводныхъ и устьевыхъ, для Чернаго моря въ особенности характерны тв, которыя или постоянно придерживаются береговъ (каковы бычки и собачки), или же совершаютъ правильныя періодическія путешествія изъ одной части моря въ другую (каковы рыбы скомбріовидныя и кефалевыя).
- 6. Многія рыбы, общія морямъ Средиземному и Черному, въ этомъ послѣднемъ морѣ бываютъ примѣтно меньше ростомъ, нежели въ первомъ, что зависитъ вѣроятно отъ меньшей температуры и отъ меньшей солености Чернаго моря.

Анализъ воды Каспійскаго моря, по приглашенію Академика Бера, произведенъ Аптекаремъ Менеромъ, воды Чернаго моря (съ южнаго берега Крыма) Профессоромъ Гассгагеномъ, воды Средиземнаго моря Марсе (Marcet).

<sup>&#</sup>x27; Смотри: Erhard, Fauna der Cycladen. 1858.

- 7. Обоюдоводныя рыбы вървкахъ бываютъ меньшаго роста, нежели въ морв.
- 8. Лиманы Дивстра, Буга и Дивпра представляють каждый свои особенности, имвющія важное значеніе въ отношеніи къ ихтіологіи. Лиманъ Дивстра отличается мвлководіемъ, лиманъ Буга соленостію воды, лиманъ Дивпра првсностью воды и болотистою окраиною съ Таврической стороны.
- 9. Низменные острова, находящіеся при устыяхь Днѣстра и Днѣпра и извѣстные подъ названіемъ плавней, заслуживають особеннаго вниманія касательно нереста рѣчныхъ рыбъ и въ отношеніи къ законамъ о рыболовствъ.
- 10. Слёдуеть обратить особенное вниманіе на химическій составь воды въ тёхъ лиманахъ и соленыхъ озерахъ, въ которыхъ до сихъ поръ продолжають жить рыбы, каковы на примёръ лиманъ Телегульскій, озера Шаболотское и Караджинское. Г. Гасстагенъ, сколько намъ извёстно, произвелъ анализъ только такихъ озерныхъ и лиманныхъ водъ, въ которыхъ перестали уже держаться рыбы.
- 11. Путешественнику, желающему ознакомиться съ рыбами Чернаго моря, непремънно слъдуетъ имъть при себъ хорошій бредникъ и другія рыболовныя снасти, для ловли мелкихъ рыбъ.
- 12. Почти вся цённая рыба, ловимая при сёверномъ берегё Чернаго моря или же въ устъяхъ Днёпра, Буга и Днёстра, отвозится или въ Одессу, или въ Николаевъ, а потому эти два города составляютъ самые важные пункты для ихтіолога.
- 13. Бухты Севастопольская и Балаклавская наиболье интересны въ зимнее время, потому что тогда наполняются рыбою, приходящею въ нихъ зимовать.
- 14. Рыбная промышленность при съверномъ берегъ Чернаго моря вообще еще мало развита. Многія рыбы, которыя заслуживали бы приготовленія въ прокъ, какъ на примъръ барбуля, анчоусъ, сарделька, теперь не имъютъ почти никакой цънности. Да и такія рыбы, какъ селедка, скомбрія, кефаль, солятся или вялятся большею частью какъ-нибудь и потому не имъютъ надлежащаго хода.

## приложение первое.

I. Списокъ рыбъ, пріобрътенныхъ во время путвивствія для Зоологическаго Кабинета Универсинета Св. Владиміра.

Звъздочкою обозначены тъ виды, которыхъ находится больнюе число экземпляровъ, могущихъ служить для мъны.

- 1. Perca fluviatilis L.
- 2. Lucioperca marina Cuv. juv.
- \*3. Lucioperca sandra Cuv.
- \*4. Percarina Demidoffii Nordm.
  - 5. Acerina vulgaris Cuv.
  - 6. Acerina rossica Cuv.
  - 7. Serranus scriba L.
  - 8. Trachinus draco L.
- \*9. Uranoscopus scaber L.
- 10. Trigla hyrax Pall.
- \*f1. Scorpaena porcus L.
  - 12. Gasterosteus aculeatus L.
- \*13. Gasterosteus platygaster, nov. sp.
- \*14. Corvina nigra Cuv.
- \*15. Sargus annularis Cuv.
- \*16. Smaris chryselis Cuv.
- \*17. Mullus barbatus L.
  - 18. Mugil chelo Cuv.
  - 19. Mugil auratus Risso.
- \*20. Mugil saliens Risso.
  - 21. Atherina hepsetus L.
- \*22. Atherina pontica Eichw.
  - 23. Scomber scombrus L.
  - 24. Pelamys sarda Cuv.
- \*25. Caranx trachurus L.

- 26. Tempodon saltator Cuv.
- \*27. Blennius lepidus Pallas.
  - 28. Blennius sanguinolentus Pall.
- \*29. Blennius auritus Pall.
  - 30. Blennius Montagui Flemm.
  - 31. Blennius melanio, nova sp.
- \*32. Gobius batrachocephalus l'all.
- \*33. Gobius gymnotrachelus Kessler.
- \*34. Gobius platycephalus Kessler.
  - 35. Gobius platyrostris Pall.
- \*36. Gobius cephalarges Pall.
- \*37. Gobius Syrman Nordm.
- \*38. Gobius Ratan Nordm.
- \*39. Gobius exanthematosus Pall.
- \*40. Gobius ophiocephalus Pall.
- \*41. Gobius Trautvetteri, nova sp.
- \*42. Gobius fluviatilis Pall
- \*43. war. lacteus Nordm.
- \*44. Gobius melanostomus Pall.
- \*45. Gobius melanio Pall.
- \*46. Gobius marmoratus Pall.
- \*47. Gobius jozo L. var. ponticus.
  - 48. Gobius leopardinus Nordm.
- \*49. Gobius pellucidus, nova sp.
- \*50. Benthophilus macrocephalus Pall.
  - 51. Callionymus festivus Pall.
  - 52. Lepadogaster biciliatus Risso.
  - 53. Motella tricirrata Nils.
- 54. Ophidium barbatum L.
- \*55. Flatessa luscus Pall.
  - 56. Rhombus maeoticus Pall.
  - 57. Solea nasuta Pall.
- \*58. Crenilabrus lapina Forsk.
- \*59. Crenilabrus fuscus Pall.
- \*60. Crenilabrus ocellatus Forsk.

- \*61. Crenilabrus aeruginosus Pall.
  - 62. Belone rostrata Faber.
  - 63. Cyprinus hungaricus Heckel.
  - 64. Cyprinus Nordmanni Heckel.
  - 65. Carpio Kollarii Heckel.
  - 66. Carassius gibelio Nils.
- \*67. Rhodeus amarus Bloch.
  - 68. Leuciscus Friesii Nordm.
  - 69. Leuciscus Heckelii Nordm.
- 70. Leuciscus rutilus L.
- \*71. Squalius dobula L.
- \*72. Squalius borysthenicus, nova sp.
- \*73. Alburnus lucidus Heckel.
- \*74. Alburnus mentoides, nova sp.
- 75. Alburnus tauricus, nova sp.
- \*76. Alburnus maculatus, nova sp.
- 77. Abramis melanops Heckel.
- 78. Abramis brama L.
- 79. Abramis tenellus Nordm.
- \*80. Barbus fluviatilis Agass.
  - 81. Gobio fluviatilis Cuv.
- 82. Cobitis taenia L.
- \*83. Cobitis merga Kryn.
- \*84. Phoxinus laevis (chrysoprasius Pall).
  - 85. Salar Ausonii Val.
- \*86. Clupea pontica Eichw
- \*87. Alausa cultiventris Nordm.
  - 88. Alausa delicatula Nordm.
- 89. Syngnathus variegatus Pall.
- \*90. Synguethus argentatus Pall.
- \*91. Syngnathus bucculentus Rathke.
- \*92. Scyphicus teres Rathke.
  - 93. Hippocampus guttulatus Cuv.
  - 94. Accipenser stellatus Pall.
  - 95. Raja clavata, var. pontica Pall.

## II. Списочь ракообразныхы.

- \*1. Carcinus moenas L.
- \*2. Grapsus varius Latr.
  - 3. Pilumnus spinulosus Nob.

Отличительные признаки: грудной черепокъ, довольно гладкій, около краевъ покрыть густыми волосками; передне-боковые края его вооружены каждый 4 обращенными впередъ шипами (не считая пятаго, занимающаго наружный уголъ орбиты), которые неръдко бывають дву или трехраздъльны.

Зазубренный лобъ (14 зазубринъ) по серединъ, небольшою щелкою, раздъленъ на двъ половины.

Края орбить зазубрены, но снизу зазубрины бывають крупиве, нежели сверху; кромв того въ каждой орбитв находится сверху маленькая выемка.

Объ влешни, изъ которыхъ правая гораздо больше лъвой, совершенно гладки.

Цвътъ черепка красноватобурый, съ бъловатыми пятнами; клешни буроватокрасны, съ темнобурыми пальцами.

Длина груднаго черенка, у самаго большаго изъ нашихъ вкземиляровъ, 17 миллиметровъ, ширина 24 миллиметра.

Отъ разности вида Pilumnus villosus, съ гладкими клешнями, о которой упоминаетъ Риссо (Hist. nat. de l'Europe mérid. V. р. ll и Hist. nat. des crustacés de Nice р. 13), отличается значительною шириною груднаго черепка.

- \*4. Cancer rivulosus Rathke.
- \*5. Thelphusa fluviatilis Latr.
  - 6. Pisidia (Porcellana) longicornis Leach.
- \*7. Pagurus ponticus Nobis.

Отмичительные признаки: грудной черепокъ, очень продолговатый, по бокамъ бугроватый, въ задней части покрытъ волосками.

По серединъ лба, повыше глазныхъ стебельковъ, сидятъ двъ небольшія, треугольныя, чешуевидныя, на вершинъ зубчатыя пластинки, а между ними находится едва примътный, подвижный шипикъ.

Стеблеобразныя части сяжковъ, какъ внёшнихъ, такъ и внутреннихъ, немного длиниве глазныхъ стебельковъ; а напротивъ

того шиповидные присажний вийшника самковы приметно короче глазных стебельковъ.

Въ роговой оболочив глазъ находится, на перхией сторойв, небольшая выемка.

Лъвая клешня несравненно больше правой; она немного про долговата, снизу плеска, на внутреннемъ прако содержитъ тупос ребро, усъяна мелкими бородавками и усижена ръдинми волосками; оба пальца ея, довольно короткіе, снутри вооружены тупыми зубчиками.

Ноги второй и третьей паръ, равныя между собою, въдливъ не уступаютъ большой къвой клешнь.

Длина всего тъла составляетъ около 19 миллиметровъ, пиринау груднаго черенка около 4 миллиметровъ. В около ви

Почти постоянно этотъ ракъ-отмельникъ быль находивъ нами въ улиткахъ Euccinum reticulatum и Buct-num reciteum, однажды только въ раковинъ Trochus varius:

- 8. Astacus angulosus Rathke
- #9. Astacus leptodactylus Eschh.
- \*10. Astacus pachypus Rathke
- \*11. Crangon maculosus Rathke
- \*12. Palaemon adspersus Rathke
- \*13. Paläemon elegans Rathke.
  - 14. Gammarus pulex L.
- #15. Gammarus locusta Leach.
- 16. Amathia carinata Rathke
- \*17. Idothea Basteri Audouin.
  - 18. Isopoda varia terrestria.

#### III. Cnucoks Moasiockobs.

Такъ какъ въ описании путешествія мы очень мало говорили о моллюскахъ, то считаемъ не безполезнымъ прибавить нъсколько замътокъ о нихъ здъсь, при исчисленіи собранныхъ нами видовъ ихъ. Кромъ того находимъ нужнымъ указать на нъкоторыя сочиненія (изъ числа тъхъ, которыми мы пользовались для опредъленія пашихъ моллюсковъ), въ которыхъ можно найти, или точ-

ныя описанія, или візрами изображенія исчисляємых видовъ. Со-

- 1. Eichwald, E. Zoologia specialis. 3 voll 1829.
- 2. Eichwald, E. Fauna caspio-caucasica, cum tal. XL. 1841 (Nouveaux Mémoires de la Société des naturalistes de Moscou, T. VII).
  - 3. Hartmann, J. D. W. Erd und Süsswasser-Gasteropoden. 1840.
- 4. Krynicki, J. Novae species aut minus cognitae e Chondri, Bulimi Heticisque generibus. 1833. (Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou. T. VI).
- 5. Krynicki, J. Helices proprie dictae etc. 1836 (Bulletin de la Société des naturalistes de Moscou. T IX).
- 6. Middendorf, A. Beitraege zu einer Malacozoologia rossica. 1847 (Mémoires de l'Academie Impériale des sciences de St. Petersbourg T. VI).
  - 7. Pfeiffer, L Monographia heliceorum viventium 4 voll. 1848-59.
  - 8. Philippi, R. A. Enumeratio molluscorum Siciliae 2 voll 1836-44.
- 9. Philippi, R. A. Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien. 3 voll. 1845-51.
  - 10. Poli, J. X. Testacea utriusque Siciliae etc. 2 voll fol. 1791 95.
- 11. Rossmaessler, E. A. Igonographie der Land und Süsswasser-Mollusken. 18 Lief. 1835-59.

Еще мы должны замётить, что измёренія различных раковинь, нами приводимыя, выражены въ миллиметрахъ.

## А Сухопутные и прысноводные моллюски.

\*1. Helix cellaria Müll.

Pfeiffer, Monogr. I. 111.

Rossmaessler, Iconogr. I. n. 22. VIII. n. 527.

Въ окрестностяхъ Симоерополя, встръчается въ значительномъ числъ, на влажныхъ мъстахъ. Большой поперечникъ раковины 12,5.

\* \*2. Helix fruticola Kryn.

Krynicki, Bull. Mosc. VI. 429. IX. 181. Pfeiffer, Monogr. I. 136.



Въ окрестностякъ Севастополя, встръчается довольно часто на кустарникахъ. Большой поперечникъ раковины 19, малый поперечникъ 16,5, вышина 13,8. На послъднемъ извиткъ, нъсколько ближе къ верхнему краю, почти постоянно бываетъ примътна бъловатая, продольная полоска.

\*3. Helix carthusiana Müll.

Pfeiffer, Monogr. 1. 132 (var. \$\beta\$, major).

Rossmaessler, Iconogr. VI. 366 (H. carthusianella Drap.).

Въ окрестностяхъ Инкермана. Большой поперечникъ раковины 16, малый поперечникъ 13,7, вышина 10. Г. Ельскій сдълаль наблюденіе, что жукъ Phosphuga laevigata нападаетъ часто наживыхъ улитокъ этаго вида и начинаетъ ихъ пожирать.

\*4. Helix cespitum Drap.

Pfeiffer, Monogr. I. 161.

Rossmaessler, Iconogr. I. 16. VIII. 513-15.

Въ окрестностяхъ Севастополя, водится на кустарникахъ, въ несмътномъ множествъ. Раковина то бываетъ совершенно бъдая, то является украшенною одною продольною, неразрывною, черноватою полоскою, то наконецъ бываетъ испещрена многими темными полосками, болъе или менъе прерывистыми, отъ бълыхъ поперечныхъ черточекъ. Большой поперечникъ раковины 17, малый поперечникъ 14, вышина 9,2.

\*5. Helix ericetorum Müll.

Pfeiffer, Monogr. I. 163.

Rossmaessler, Iconogr. I. 17. VIII. 517.

Въ окрестностяхъ Севастополя, водятся въ травъ, во множествъ. Раковина наичаще бываетъ украшена продольными бурыми полосками, числомъ отъ 1 до 5, изъ которыхъ верхняя почти всегда шире нижнихъ, но встръчаются и совершенно бълыя раковины. Большой поперечникъ раковины 16, малый поперечникъ 14, вышина 8.

\*6. Helix candicans Ziegl.

Pfeiffer, Monogr. I. 164. II. 132. Rossmaessler, Iconogr. VIII. 519-20. Hartmann, Gasteropoden. Taf. 45. Въ окрестностяхъ Ялты, во множествъ. Раковина ръдко бываетъ совершенно бълая (Н. arenosa Ziegl. Kryn.), гораздо чаще испещрена прерывистыми и какъ бы размытыми бурыми полосками (Н. obvia Ziegl. Hartm.). Большой поперечникъ раковины 15, малый поперечникъ 12,3, вышина 7,2.

\*7. Helix filimargo Ziegl
Krynicki, Bull. Mosc. VI. 435. IX. 188.
Pfeiffer, Monogr. I. 172. III. 135.
Rossmaessler, Iconogr VI. 358.

Въ окрестностяхъ Севастополя, водится въ травъ, во множествъ. Раковина наичаще бываетъ совершенно бълая, ръже украшена одною или нъсколькими бурыми полосками. Чъмъ больше раковина, тъмъ менъе примътно бываетъ обывновенно продольное на ней ребро. Большой поперечникъ раковины 17,3, малый поперечникъ 15, вышина 7,3.

\*8. Helix striata Müll.

Pfeiffer, Monogr. IV 141.

Rossmaessler, Iconogr. VI. 353.

Въ окрестностяхъ Одессы, водится на землъ, подъ листьями, во множествъ. Раковина почти всегда испещрена прерывистыми бурыми полосками, ръдко бываетъ совершенно бълая. Большой поперечникъ ея 9,6, малый поперечникъ 8,5, вышина 6,7.

\*9. Helix lucorum L.

Pfeiffer, Monogr. I. 233.

Rossmaessler, Iconogr. V. 291.

Въ опрестностяхъ Севастополя и на южномъ берегу Крыма; водится на деревьяхъ и кустарникахъ, во множествъ. Разность Н. taurica Kryn. встръчается гораздо ръже нормальной формы. Большой поперечникъ раковины 35,5, малый поперечникъ 28, вышина 26,2.

Helix hortensis Müll.
 Pfeiffer, Monogr. I. 277. III. 223.
 Rossmaessler, Iconogr. I. 6. V. 299.

Въ окрестностихъ Аккермана, водится въ садахъ и виноградникахъ. Большой поперечникъ раковины 25,2, малый поперечникъ 21,1, вышина 15,5.

11. Bulimus apenninus Jan.

Pfeiffer, Monogr. II. 121.

Rossmaessler, Iconogr. VI. 385.

Krynicki, Bull. Mosc. VI. 413 tab. VIII (B. rupestris).

Въ окрестностяхъ Ялты, въ горныхъ ущеліяхъ. Всё наши экземпляры (числомъ 6) короче и при основаніи сильнёе раздуты, нежели на рисункахъ Россмеслера. Число оборотовъ 7½, вышина 17,2, ширина 7,1, діаметры устья 6,9 и 5.

\*12. Bulimus tridens Müll.

Pfeiffer, Monogr. II. 129.

Rossmaessler, Iconogr. I. 33. V. 305.

Krynicki, Bull. Mosc. VI 405. tab. VII.

Въ окрестностяхъ Одессы и въ южно-крымскихъ горахъ, при истокъ Салгира, около Ялты и т. д. Любитъ мъстности скалистыя и часто въ такихъ мъстностяхъ всеръчается во множествъ, подъ камнями, въ травъ. Всъ наши Одесскіе виземиляры примътно крупнъе Крымскихъ. Число оборотовъ 8, вышина 16,5, ширина 5,3, діаметры устья 5,3 и 3,7.

\*13. Bulimus bidens Kryn.

Krynicki, Bull. Mosc. VI. 401. tab. VII.

Pfeiffer, Monogr. II. 138.

Rossmaessler, Iconogr. VI. 382, 383 (B. clausiliaeformis).

Въ южно-крымскихъ горахъ (при истокъ Салгира, на Чатырдагъ, около Кызиль-кобы, въ окрестностяхъ Ялты), мъстами въ значительномъ числъ. Между раковинами совершенно бълыми попадаются также такія, которыя бываютъ испещрены бурыми черточками. Всъ наши Ялтинскіе экземпляры примътно уже остальныхъ. Число оборотовъ 9—10; у нормальнаго экземпляра вышина 16,5, ширина 5,8, діаметры устья 5,6 и 4,1; у Ялтинскаго экземпляра вышина 16,5, ширина 4, діаметры устья 4,6 и 3,1.

\*14. Bulimus gibber Kryn.

Krynicki, Bull Mosc. VI. 416. tab. VIII.

Pfeiffer, Monogr. II. 118. Rossmaessler, Iconogr. VI. 389 (B. revolutus).

На Чатырдагь и при истовъ Салгира, въ достаточномъ числъ, подъ камиями. Число оборотовъ 8, вышина 19, ширина 7, діаметры устья 6,8 и 4,4.

\*15. Bulimus lineatus Kryn. (B. fusiformis Menke).
Krynicki, Bull. Mosc. VI. 395. tab. VI.
Pfeiffer, Monogr. II. 226 (B. tauricus, var. \$).
Rossmaessler, Iconogr. VI. 380 (fig. 2).

Въ южно-крымскихъ горахъ, въ несмътномъ множествъ, въ травъ и на землъ, подъ камнами. По нашимъ наблюденіямъ экземпляры, украшенные бурыми черточками, встръчаются примътно ръже, нежели совершенно бълые. Число оборотокъ 11-12, вышина 37,7, ширина 8,3, діаметры устья 9,6 и 6,3.

\*16. Bulimus fuscilabrus Kryn.

Krynicki, Bull Mosc. VI. 398. tab. VI. Pfeiffer, Monogr. II. 226 (B. tauricus var. 7.). Rossmaessler, Iconogr. VI. 380 (fig. 1).

Въ окрестностяхъ Севастополя, въ травъ, въ огромномъ множествъ, также въ окрестностяхъ Ялты. Попадаются изръдка вкземпляры, испещренные бурыми черточкими. Число оборотовъ 9-10, вышина 23,3, ширина 7,5, діаметры устья 7,2 и 5,4.

Примичаніе. По нашему мивнію В. fuscilabrus Kryn. двйствительно составляєть отдільный видь, который различаєтся оть В. lineatus Kryn. слідующими признаками: а) раковина короче, шире, имість форму боліве коническую и содержить меніве оборотовь; b) устье относительно шире и край его почти кругомъ немного отворочень, какъ бы нісколько утолщень; с) губа и столбикъ немного толще; d) устье снаружи почти постоянно окаймлено боліве или меніве примітною буроватожелтою полоскою. Что же касается до видовь В. turgidus Kryn. и В. concolor Kryn., то по всей віроятности слідуєть ихъ считать разностями оть В. fuscilabrus.

17. Achatina lubrica Müll.

Pfeiffer, Monogr. II. 272. Rossmaessler, Iconogr. I. 43. Въ окрестностяхъ Симоерополя, подъ камнями. Число оборотовъ 6, вышина 6,2, ширина 2,4, діаметры устья 2,5 и 1,3.

18. Pupa avenacea Brug.

Pfeiffer, Monogr. II. 347.

Rossmaessler, Iconogr. I 36. V. 319.

На вершинъ Чатырдага, на южной сторонъ отвъсныхъ скалъ. Число оборотовъ 7, вышина 5,4, ширина 2,3, діаметры устья 1,7 и 1,2.

\*19. Pupa taurica, nova species?

Видъ этотъ, по всей въроятности еще не описанный, наиближе подходитъ въ виду Pupa rhodia Roth. Число оборотовъ 7, вышина 5,8, ширина 2,1, діаметры устья 1,7 и 1,2. Найденъ г. Ельскимъ въ окрестностяхъ Ялты, на приморскихъ скалахъ.

Примпчание. Краткая характеристика этого вида слъдующая: Testa perforata, fusiformi-turrita, confertim striato-costulata, pallide brunnea; spira turrita, acutiuscula; anfractus 7 convexi, ultimus subascendens; apertura oblonga, 5 plicata: parietali 1 profunda, columellaribus 2, palatalibus 2, marginem non attingentibus, subaequalibus; peristomium albidum, expansiusculum, marginibus convergentibus.

20. Clausilia canalifera Rossm.

Rossmaessler, Iconogr. III. 183.

Pfeiffer, Monogr. II. 410.

Въ окрестностяхъ Симоерополя и Ялты, подъ камиями. Число оборотовъ 13, вышина 19, ширина 4,3, діаметры устья 4,2 и 2,8.

\*21. Clausilia detersa Ziegl.

Rossmaessler, Iconogr. III. 182.

Pfeiffer, Monogr. II. 411.

Въ окрестностяхъ Симоерополя, въ огромномъ множествъ, подъ листьями и камиями. Число оборотовъ 12, вышина 16,3, ширина 4,3, діаметры устья 4,3 и 3.

Примъчание. Встръчаются неръдко экземпляры какъ бы средніе, переходные между видими СІ. canalifera и СІ. detersa, а потому едва ли не будеть справедливъе принимать эти двъ формы лишь разностями одного и того же вида.

\*22. Clausilia gracilicosta Ziegl.

Rossmaessler, Iconogr. III. 184.

Pfeiffer, Monogr. II 411.

Въ окрестностяхъ Севастополя подъ камнями, въ несмътномъ множествъ, также при истокъ Салгира. Видъ втотъ, смотря по мъстности, значительно измъняется въ величинъ. Такъ напримъръ непосредственно подлъ Севастополя мы находили весьма крупные экземпляры (число оборотовъ 14—15, вышина 21,5, ширина 4,2, діаметры устья 4,4 и 3.1), а напротивъ того нъсколько далъе, между развалинами древняго Херсонеса, очень мелкіе экземпляры (число оборотовъ 12, вышина 14, ширина 3,4, діаметры устья 3,3 и 2,4).

23. Clausilia Duboisi Charp.

Pfeiffer, Monogr. IV 727.

На Чатырдагъ, подъ камнями. Раковина чрезвычайно ломка, такъ что всъ собранные нами экземпляры въ дорогъ болъе или менъе попортились.

24. Limnaeus palustris Müll.

Rossmaessler, Iconogr I. 51, 52.

Въ прудахъ около Симферополя. Число оборотовъ 7, вы-

25. Paludina impura Lam.

Rossmaessler, Iconogr. I. 65.

Въ лиманъ Дивстра, подъ Аккерманомъ.

26. Melanopsis Esperi Fér.

Rossmaessler, Iconogr. IX. 668-71.

Въ лиминъ Дивстра, подъ Аккерманомъ.

\*27. Neritina fluviatilis Müll.

Rossmaessler, Iconogr. II. 118, 119.

Въ лиманъ Дивстра, подъ Аккерманомъ, во множествъ, са-

28. Dreissena polymorpha Pall.

Rossmaessler, Iconogr. I 69 (Tichogonia Chennitzii).

Въ лиманъ Дивстра, подъ Аккерманолъ, во множествъ.

#### В. Морскіе брюхоновіе моллюски.

29. Patella tarentina Lam.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 26.

Philippi, Mollusc. Sic. II. 84.

При южномъ берегъ Крыма, около Ялты, въ значительномъ числъ. Рыбаки собираютъ моллюсковъ этого вида на подводныхъ скалахъ и употребляютъ ихъ въ пищу, подобно устрицамъ.

\*30. Rissoa variabilis Mühlf.

Middendorf, Malacozool ross. II. 44.

Около Евпаторіи и въ Круглой бухть подъ Севастополемъ, въ значительномъ числь. Число оборотовъ 7, вышина 6, ширина 3,2.

\*31. Rissoa costata Desm.

Philippi, Mollusc. Sic. II 123.

Въ Севастопольской бухть, во множествъ. Число оборотовъ 7, вышина 5,4, ширина 2,4. Отличается отъ предидущаго вида болъе утолщенными ребрышками, стекловатымъ цвътомъ и бъловатою губою.

\*32. Rissoa oblonga Desm.

Middendorf, Malacozool. ross II 42.

Philippi, Mollusc. Sic. II. 124.

Въ Одесской гавани, между морскими травами, во множествъ. Число оборотовъ 7, вышина 6, ширина 3.

33. Rissoa lactea Mich.

Philippi, Mollusc Sic. I. 152. II. 129.

Въ Севастопольской букть, очень ръдка. Намъ достался одинъ только экземпляръ этой красивой раковинки.

34. Truncatella truncatula Drap.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 46

Philippi, Mollusc. Sic. II. tab. XXIV. fig. 4.

Въ Севастопольской бухть, довольно ръдка. Число оборотовъ 4, вышина 6,2, ширина 2.

35. Cerithium vulgatum Brug.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 48.

Philippi, Mollusc. Sic. I. tab. XI. 3-6,8,9,

Въ Севастопольской буктв, довольно ръдка. Всв наши экземиляры сильно потерты.

\*36 Cerithium ferrugineum Brug

Middendorf, Malacozool ross. II. 49.

Eichwald, Zool. spec. I. tab. V. 10, 11.

Въ Круглой бухть, подъ Севастополемъ, въ значительномъ количествъ. Число оборотовъ 10, вышина 12,4, ширина 3,5.

37. Littorina neritoides L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 66.

Philippi, Abbild. und Beschr. II. Taf. III 24.

При южномъ берегъ Крыма, около Ялты, въ маломъ числъ. Число оборотовъ 5, вышина 7, ширина 5, діаметры устья 4,8 и 3,2.

38. Trochus divaricatus L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 77.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 177. II. 151.

При берегахъ Таврическаго полуострова, около Евпаторіи и Севастополя, не составляєть ръдкости.

\*39. Trochus Adansonii Payr.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 80.

Philippi, Mollusc. Sic I. tab. X. 24.

При берегахъ Таврическаго полуострова, въ достаточномъ числъ. Число оборотовъ 6, вышина 11, ширина 10.

\*40. Trochus villicus Philippi.

Middendorf, Malacozool. ross. II 82.

Philippi. Mollusc. Sic II. tab. XXV. 14.

При берегахъ Таврическаго полуострова, въ большомъ числъ. У всъхъ нашихъ экземпляровъ пупокъ узокъ или даже совсъмъ закрытъ, какъ уже замътилъ и г. Миддендороъ. Число оборотовъ 6, вышина 7,5, ширина 9.

41. Trochus varius Gm.

Philippi Mollusc. Sic. I. 180. tab. X. 19.

При берегахъ Таврическаго полуострова, ръже предидущихъ. Число оборотовъ 5, вышина 10, ширина 15. Пупокъ также иногда бываетъ незначительный. Въ одномъ изъ нашихъ экземпляровъ седитъ ракъ-отшельникъ (Pagurus).

42. Phasianella speciosa Mühlf.

Middendorf, Malacozool, ross, II. 87.

Philippi, Mollusc. Sic. II. 158.

Намъ достался одинъ только экземпляръ, въ Евпаторіи. Число оборотовъ 5½, вышина 8,5, ширина 4.

43. Phasianella intermedia Scacchi.

Philippi, Mollusc. Sic II. 188. tab XXV. 21.

Намъ также достался одинъ только экземпляръ, въ Севастополъ. Число оборотовъ  $5\frac{1}{2}$ , вышина 7, ширина 4.

\*44. Phasianella pulla L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 87.

Philippi, Mollusc. Sic II. 158.

При берегахъ Таврическаго полуострова, подъ Евпаторіею во множествъ. Число оборотовъ 41/4, вышина 5, ширина 3,5.

\*45. Calyptraea chinensis L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 99.

Philippi, Mollusc. Sic. II. 93 (C. vulgaris).

При берегахъ Таврическаго полуострова, около Евпаторіи и Севастополя, въ достаточномъ числь. Вышина 4,7, ширина 12.

?46. Pleurotoma taeniatum Desh.

Philippi, Mollusc. Sic II. 167. tab. XXVI. 3.

Намъ достался одинъ только вкземпляръ, въ Ялтъ. Вышина всей раковины 6,8, вышина послъдняго извитка 4, ширина 2,8. Возвышенныхъ поперечныхъ складовъ на послъднихъ извиткахъ по 10. Цвътъ желтовато-бурый, съ узкими, бълыми продольными полосками.

\*47. Buccinum reticulatum L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 175.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 220. II. 188.

При берегахъ Таврическаго полуострова и также на съверномъ берегу Чернаго моря, подъ Одессою, въ значительномъ числъ. Раки-отшельники очень охотно избираютъ раковину эту своимъ пристанищемъ.

\*48. Buccinum neriteum L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 178. Philippi, Mollusc. Sic. I. 223. II. 189.

При берегахъ Таврическаго полуострова, начиная отъ Евпаторіи до Ялты, во множествъ. Раковина бываетъ самыхъ различныхъ цвътовъ и часто служитъ пристанищемъ ракамъ-отщельникамъ.

49. Columbella rustica L.

Middendorf, Malacozool. ross. II. 180. Philippi, Mollusc. Sic. I. 228. II. 194.

Достался намъ одинъ только экземпляръ, и то потертый, въ Севастопольской бухтъ.

50. Conus mediterraneus Brug.

Middendorf, Malacozool. 1088. II. 182.

Philippi, Mollusc Sic. I. tab. XII. 16-22.

Также достался намъ одинъ только потертый экземпляръ, въ Севастополъ.

#### С. Морскіе пластинчатожаберные моллюски

51. Ostrea adriatica Lam.

Middendorf Malacozool, ross, III. 6

При берегахъ Таврическаго полуострова и также подъ Одессою, въ скалистыхъ мъстностяхъ.

52. Pecten sulcatus Lam.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 7.

Philippi. Mollusc. Sic. I. 79. II. 56.

Нъсколько красновато-желтыхъ экземпляровъ, болъе или менъе потертыхъ, и одинъ бълый достались намъ въ Севастополъ. Число лучеобразныхъ ребръ наичаще простирается до 12. На краю правой створки, подъ переднимъ ушкомъ, находится 5 небольшихъ зубчиковъ.

53. Mytilus minimus Poli.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 22. Taf. XV. 1-9. Poli, Testacea utr. Sic. II. tab. XXXII. 1.

Намъ достался одинъ только экземпляръ, шириною въ 12, въ Севастопольской бухтъ. На одной створкъ сидитъ усоногій баланъ (Balanus), на другой находятся нъсколько червяковъ рода Spirorbis.

\*54. Mytilus latus Chemn.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 22. Taf. XIV. 9—12. Philippi, Mollusc. Sic. I. tab. V. 12, 13.

Водится во множествъ при берегахъ Таврическаго полуострова и также подъ Одессою, въ скалистыхъ мъстностяхъ. Извъстенъ у рыбаковъ подъ названіемъ мидіи и употребляется ими въ пищу. Раковина весьма часто бываетъ обсажена баланами.

55. Cardium plicatum Eichw.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 75. (Phaladomya plicata).

Eichwald, Fauna Caspio-cauc. 280. tab. XXXIX, fig. 3, a, b, c. (Adaena plicata).

Вълиманъ Днъстра, подъ Аккерманомъ, на иловатомъ грунтъ. Длина 23, ширина 34, толщина 20. Г. Миддендороъ причисляетъ втотъ видъ къ роду Phaladomya, съ чъмъ однако не соглашается Филиппи (Handbuch der Conchyologie und Malacozoologie. p. 338).

56. Cardium ponticum Eichw.

Eichwald, Fauna Caspio-cauc. 274.

? Middendorf, Malacozool. ross. III. 32 (С. pseudocardium). Въ лиманъ Днъстра, подъ Аккерманомъ. Длина 23, ширина 30, толщина 17,5; число шировихъ, лучеобразныхъ ребръ простирается отъ 23 до 26. Раковина вообще неравнобокая, очертаніемъ значительно похожая на раковину вида Cardium rusticum. На заднемъ удлиненномъ концъ ея между двумя створками остается широкая скважина; отпечатокъ епанчи, находящійся на внутренней поверхности створокъ, содержитъ, пониже отпечатка отъ задняго закрывательнаго мускула, значительную, кругловатую выемку. У одного экземпляра замочный зубчикъ примътно больше и толще, нежели у остальныхъ.

57. Cardium rusticum L.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 35.

Philippi, Mollusc. Sic. I. tab. IV. 12-14.

При съверномъ берегъ Чернаго моря. Въ Крыму, подят Шейхлара, попадались намъ раковины этого вида въ состояни полуонаменъломъ (subfossil).

58. Cardium edule L.

Middendorf, Malacozool, ross, III. 32.

Philippi, Mollusc. Sic. I. tab. IV. 16.

При съвернемъ берегъ Чернаго моря. Около Шейхлара также попадались намъ раковины полуокаменълыя.

59. Lucina commutata Phil.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 50.

Philippi, Mollusc. Sic. I. tab. III. 15.

При берегъ Тарханкута. Длина 8,5, ширина 8,8.

60. Lucina lactea Lam.

Middendorf, Malacozool, ross. III. 50.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 33. II. 25.

Въ бухтахъ Севастопольской и Шейхларской, въ достаточномъ числъ. Около Шейхлара также въ полуокаменъломъ состояни. Длина 21, ширина 21,3.

61. Venerupis Irus L.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 51.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 21. II. 20.

Найдена нами только въ полуокаменъломъ состоянів, около Шейхлара.

62. Venus aurea Mat. et Rack.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 53.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 47. II. 53.

При съверныхъ берегахъ Чернаго моря, подъ Одессою.

63. Venus gallina L.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 54.

Poli, Testacea utr. Sic. II. tab. XXI. 6,7.

При берегахъ Тарханкута, въ значительномъ числъ. Всъ замътки г. Миддендорфа касательно этого вида совершенно върны. Между нашими экземплярами находится одинъ, у котораго вся внутренняя поверхность раковины буровато-красная.

64. Venus laeta Poli.

Poli, Testacea utr. Sic. II. tab. XXI. 1. Philippi, Mollusc. Sic. I. 46. II. 35.

Намъ достались, на съверномъ берегу, отъ 4 экзеппляровъ по одной только мъвой створкъ.

65. Tellina fragilis L.

Middendorf, Malacozook ross. IH. 59.

Poli, Testacon um. Sic. I. tab. XV. 22, 24.

Наиъ достался одинъ только эксемпляръ, на съверномъ берегу. \*66. Tellina tennis Dal.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 58. Philippi, Mollusc. Sic. I. 26. II. 22.

При берегахъ Таврическаго полуострова, во множествъ. Розовая разность встръчается примътно чаще, нежели бълая.

67. Tellina donacina Gm.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 25. II. 21. Poli, Testacea utr. Sic. I. tab. XV. 10.

Мы пріобрали одина только небольшой вкземпляра, ва Севастопольской бухта.

\*68. Donax trunculus L.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 64.

Poli, Testacoa utr. Sic. II. tab. XIX. 12, 13.

Подъ съвернымъ берегомъ и при берегахъ Таврическаго подуострова, во множествъ. Совершенно бълые экземпляры (D. Julianae Andrz.) очень ръдки.

69. Mesodesma donacilla Desh.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 64.

Philippi, Mollusc. Sic. I. 37 (Donacilla Lamarckii).

Poli. Testacea utr. Sic. II. tab. XIX. 8-11.

Подъ Севастополенъ, ръже подъ съвернымъ берегомъ. Всъ наши виземпляры бёлые. Самый большой изъ нихъ импеть възданну 11, въ ширину 18.

70. Corbula Swainsoni Tort.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 68. Taf. XIX. 9—12. Philippi, Mollusc. Sic. I. 17. tab. I. 18 (C. mediterranea).

Въ Севестоцильской бухтъ и цодъ съвернымъ берегомъ, между мидіями и на мидіяхъ (Mytilus lalus); на корбуляхъ въ свою очередь часто сидятъ мелкіе баланы. По нашему митнію С. Swainsoni и С. mediterranea тождественны, такъ какъ относительная інприна раковины подлежитъ замътнымъ измъненіямъ. Самый больщой изъ нашихъ экземпляровъ имъетъ въ длину 6, въ ширину 10, въ толщину 3,5. Одивъ изъ никъ красноватожелтый, другіе бълые или желтоватобълые.

71. Solen vagina L.

Middendo f, Malacozool. ross. III. 79.

Philippi, Abb. und Beschr. Taf. I. 4.

Намъ достались два небольшіе, потертые вклемпляра, одинъ на съверномъ берегу, другой въ Севастополъ.

72. Teredo novalis L.

Middendorf, Malacozool. ross. III. 79.

Въ Севастопольской бухть, во множествъ, разълдаетъ подводныя части судовъ.

## приложение второе.

Алфавитный указатель названій рыбь, употребительных в югозападной Россіи.

Авдюшка, авдотка (Cobitis barbatula L.) почти во всей Малороссін.

Анчоусь (Engraulis encrasicholus Cuv.) въ Одесссъ.

Атеринка (Atherina pontica Eichw.) въ Одессъ.

Бабка (Gobius) по Дивстру и Дивпру.

Баламуть (Scomber scombrus L.) по съверному берегу Чернаго моря.

Балыкт-прупнан кефаль въ Крыму.

Барбуля, барбунь (Mullus barbatus L.) въ Одессв.

Бекасъ морской (Beione rostrata Faber) въ Одессъ.

Библица, библя, бублица (Leuciscus rutilus L,) почти во всей Малороссіи.

Бланкеть (Gobius pellucidus Nobis) въ Одессъ.

Бобырь, бобырчикъ (Acerina rossica Cuv.) въ Кіевъ; въ другихъ мъстахъ названіе это дается разнымъ другимъ рыбкамъ (въ особенности изъ родовъ Gobius и Gobio).

Бобырець (Squalius borysthenicus Nobis) въ Алешкахъ.

*Въливна* (Aspius гарах L.) почти во всей южной Россіи.

Бълоокъ (Abramis sopa l'all.) въ Бендерахъ.

Еплуга (Accipenser huso L.) во всей южной Россіи.

Быстрянка, быстряночка (Alburnus Baldneri Val.) въ Полтавской губерніи.

Бычокъ (Gobius et Cottus) по берегу Чернаго моря и при устыяхъ Дивстра, Буга и Дивпра.

Вербакт, вербовикт, вербичт — лещь, который мечетъ икру въ то время, когда цвътетъ верба.

Вертельчикъ (Cobitis taenia L.) по Ипути.

Верховодъ, верховодка, верхоплавка (Alburnus lucidus Heckel) почти во всей южной Россіи.

Визъ (Accipenser Schypa Güld?) при устьяхъ большихъ рѣкъ. Названіе это даютъ впрочемъ всѣмъ вожатымъ или князькамъ табуновъ рыбъ осетровыхъ и потому говорятъ: визъ бѣлужій, визъ севрюжій и т. д.

Волкъ морской (Xiphias gladius L.) въ Очаковъ.

Волг-рыба, по татарски окюсъ-балыкъ (Callionymus festivus Pall.) на южномъ берегу Крыма.

Вырезубъ, вырьзъ (Leuciscus Friesü Nordm.) во всей южной Россіи. Вязь — язь.

Выонь (Cobitis fossilis L.) во всей южной Россіи.

Гава, залга (Mugil chelo Cuv.) въ Аккерманъ.

Глосса (Platessa luscus Pall.) по берегу Чернаго моря.

Голець (Cobitis barbatula L.) во многихъ мъстахъ.

Головачъ, бычовъ-головачъ (Gobius platycephales Nobis) въ Николаевъ.

Головень, золовль (Squalius dobula L.) почти во всей южной Россіи. Гольшь (Phoxinus laevis Ag.) въ Симферополъ.

Гонецъ, бычокъ-гонецъ (Gobius gymnotrachelus Nobis) въ Николаевъ. Название это дается впрочемъ и другимъ бычкамъ, имъетъ такое же значение для бычковъ, какъ визъ для осетровыкъ рыбъ.

Горбыль (Corvina nigra Cuv.) въ Севастополъ.

Горлачь, бычокъ-горлачь (Gobius Trautvetteri Nobis) въ Николаевъ.

Горчакъ, 10рчанка, 10рькушка (Rhodeus amerus Bl.) во многихъ мъстахъ южной Россіи.

Губанъ, бычокъ-губанъ (Gobius melanostomus Pall.) въ Николаевъ.

Густера, *пустыра*, *пустырька* (Abramis blicca Bl.) почти во всей южной Россіи.

Долгулька (Atherina pontica Eichw.) въ Очаковъ.

Драконъ морской (Trachinus draco L) въ Крыму.

Дубовикъ-лещь, который трется, когда начнетъ распускаться дубъ. Евдотка — авдотка.

Елець (Squalius leuciscus Heckel) почти во всей Малороссіи.

Ершь, ершинь (Acerina vulgaris Cuv.) во всей южной Россіи.

Ерши морской (Scorpaena porcus L.) въ Севастополь.

Живець. Названіе это въ разныхъ містахъ употребляется для означенія верховодки или другихъ мелкихъ рыбокъ, служащихъ наживкою на удочки.

Зворлучь (Syngnathus increalentus Rathke) въ Вознесенскъ.

Зеленуха, веленьчуха (Crenilabrus) по берегамъ Таврическаго полуострова.

Зубарь, вубарить (Chromis castanea Cuv.) въ Севастополь.

Игла, иголка (Syngnathus) въ Одессъ и въ Крыму. Иногда также называется иглою морской бекасъ (Belone rostrata).

Калека (Lota vulgaris Cuv.) на Ипути.

Кальма (Acerina rossica Cuv) въ Херсонъ.

Кальмант таже рыбка въ Бериславъ.

Камбала (Rhombus moeoticus Pall.) по берегамъ Чернаго моря.

Карась (Carassius) во всей южной Россіи; различають впрочемъ различныя породы карасей, по цвъту и формъ тъла.

Карась морской (Sargus annularis Cuv) по берегамъ Крыма.

Карандичь (Trigla) въ Севастополъ.

Кара-сырта мелкая кефаль въ Крыму.

Катрань (Acanthias vulgaris Risso) въ Крыму.

Кефаль (Mugil cephalus Cuv.) у Крымскихъ грековъ. Въ Могилевъ на Дивстръ дають это название также рыбцу.

Кефаль (Mugil) по берегамъ Чернаго моря; иногда название это спеціально прилагается виду Mugil saliens Risso.

Кленёкъ (Squalius leuciscus Heckel) въ многихъ мъстахъ на Укравиъ.

Клень (Squalius dobula L.) по Дивстру.

Клепеца, кляпеца (Abramis sopa Pall.) по Дивпру.

Кнутовикъ, бычокъ-кнутовикъ (Gobius bratrachocephalus Pall.) въ Севастопояв.

Кнуть, бычокъ-кнуть, та же рыба въ Одессв.

Кобль, кобликъ, колбь (Gobio fluviatilis) вы губерніяхъ Подольской и Волынской.

Коваль, бычокъ-коваль (Gobius melanio Pall.) въ Одессъ.

Колюшка, колючка (Gasterosteus) въ Одессв и по Дивпру.

Конёка, конекъ морской (Hippocampus guttulatus Cuv.) по берегамъ Чернаго моря. Ronaiá самая мелкая кефаль въ Евпаторіи.

Корова морская (Uranoscopus scaber L) по берегамъ Чернаго моря.

Róponz (Cyprinus carpio L. et hungariens Heckel) во всей южной Россіи.

Кострикъ (Acerina volgaris Cov.) въ Бакотъ на Днъстръ.

*Постякъ, костяникъ, костяничекъ, костяньчикъ*, молоденькія рыбки изъ семейства осетровыхъ, которыя изъ ръкъ уходять въ море.

Коть морской (Trygon pastinaca Cov.) по берегать Чернаго моря.

Rowka морская (Trygon pastinaca Cuv. et Raja clavata Rond.) въ Опессъ.

Красница-прасноперка.

Красномерка (Scardinius enytropthalmus L.) въ разныхъ мъстахъ южной Россіи.

Круглышъ, бычокъ-круглышъ (Gobius exanthematosus Pall.) въ Севастополъ.

Кружельники (Cobitis taenia L.) на Ипути.

Кувнець, бычовъ-кузнецъ (Gobius melanio Pall.) въ Одессв.

Курланчую (Trigla) въ Евпаторіи.

Лакерда (Thynnus vulgaris L.) въ Крыму.

Лапина (Crenilabrus lapina Forsk.) у Крымскихъ грековъ.

Ларичь (Mugil saliens Risso.) въ Крыму.

Лещь (Abramis brama L.) во всей южной Россіи.

Леферъ (Temnodon saltator Cuv.) въ Судавъ.

**Лиманка** молодая селедка, живущая въ лиманъ Днъпра (въ Очакогъ).

Линь (Tinca vulgaris Cuv.) во всей южной Россіи.

Лисица морская (Raja clavata Rond.) въ Одессъ.

Лобань или лабань (Mugil cephalus Cuv.) въ Крыму.

Лобаст таже рыба въ Аккерманъ.

Поскиря, лоскирь, лоскирка (Abramis blicca Bl.) по Дивпру и въ Малороссіи. Въ Севастополъ матросы называють лоскиремъ горбыля.

Лосось (Salmo salar?) по берегамъ Чернаго моря.

Лупирка мелкая густера въ Малороссіи.

Муфарь (Temnodon saltator Cuv.) въ Одессъ.

Лящь-лещь.

Май-балыкъ мелкая селедка въ Балаклавъ.

Макрель (Scomber scombrus L.) въ Севастополь.

Маляека очень молодая или мелкая рыбка, какъ на примъръ овсянка.

Марена или марина (Barbus fluviatilis Ag.) во всей южной Россіи. Мелокопія (Corvina nigra Cuv.) въ Балаклавь.

Ментусъ или минтусъ (Lota vulgaris Cuv.) въ Волынской и Подольской губерніяхъ.

Мень или менёкъ, таже рыба по Дивпру и мъстами по Дивстру. Милька — малявка.

Миюхъ (Lota vulgaris Cuv.) мъстами въ Волынской губернів.

Налимъ (Lota vulgaris Cuv.) въ Кременьчугъ.

Налимъ морской (Motella tricirrata Nils et Ophidium barbatum L.) въ Севастополъ.

Никольникъ-лещь, который трется около дня Св. Николая (9-го Мая).

Ногтикъ (Acerina vulgaris Cuv.) въ Могилевъ на Днъстръ.

Носарь, носарикъ, носурикъ (Acerina rossica Cuv.) въ Малороссів. Облица—библица.

Овсянка (Aspius Owsianca Czernay) во всей южной Россіи.

Окунь (Perca fluviatilis L.) во всей Россіи.

Окунь морской (Smaris chryselis Cov.) въ Севастополъ.

Ольшанка въ разныхъ мъстахъ различная рыбка, наичаще овсянка.

Оселедсит=селедка.

Осетръ (Accipenser Güldenstaedtii Brandt) во всей южной Россіи.

Остроносикъ (Mugil chelo Cuv.) въ Севастополъ.

Паламида (Pelamys sarda Cuv.) по берегамъ Чернаго моря.

Пацюкъ (Rhodeus amarus Bl.) мъстами въ Полтавской губернін.

*Пестрюга* — севрюга. Иные рыбаки впрочемъ отличаютъ пестрюгу отъ севрюги.

Пескарь мъстами Cobitis barbatula L., мъстами Gobio fluviatilis Cuv. Сиятокъ-пескарь (Atherina pontica Eichw.) въ Севастополъ.

Песочникъ, бычокъ – песочникъ (Gobius melanostomus Pall.) въ Одессъ, (Gobius fluviatilis Pall.) въ Николаевъ.

Печкуръ (Gobius fluviatilis Pall.) въ Кременьчугъ и въ другихъ мъстахъ по Днъпру.

Иисарка, писарь (Alburnus Baldneri Val.) въ Могилевъ и Ямполъ на Днъстръ.

Плотва, плотица, плоскушка, небольшів плосків рыбки, по преимуществу Scardinius erytropthalmus, Leuciscus rutilus, Abramis blicca.

Плоскиря, плоскирка поскиря, лоскирка.

Подлещикь ивстами молодой лещь.

Нодроекъ, подрыекъ (Cyprinus Nordmanni Heckel) по Дивпру.

Подтумокъ, селедка средней величины, въроятно двугодовалая, которая идетъ нереститься въ ръки, въ Очаковъ, Херсонъ, Бериславъ.

Подусть (Chondrostoma nasus L.) во всей южной Россіи.

Пстрона форель, въ Подольской губернів.

Пуголовка (Benthophilus macrocephalus Pall.) при устыяхъ Дивстра и Буга.

Пувинёть селедка средней величины въ Одессъ и Аккерманъ.

Пука́съ, пука́сикъ (Rhodeus amarus Bl.) въ Малороссів, по всему Дивпру.

Пучемавикь (Abramis sopa Pall.) мъстами въ Малороссіи.

Пытухъ мо; ской (Trigla hyrax Pall.) въ Одессъ.

Ратанъ, ратанчикъ, бычовъ-ратанъ (Gobius Ratan Nordm.) въ Одессв.

Руссакъ самая крупная селедка, въ Одессъ.

Рыбець, рыбиикь (Abramis vimba L.) во всей южной Россіи.

Рыжикъ, бычовъ-рыживъ (Gobius cephalarges Pall.) въ Одессъ.

Савань симый крупный коропь, при устью Дивпра.

Саранецъ = шаранецъ.

Capianans (Mugil auratus?) въ Крыму.

Саргана (Belone rostrata Faber) въ Крыму.

Сарделька (Alausa delicatula Nordm.) въ Одессъ.

Свистука особое прозвание чехони, въ Очаковъ.

Себель, себеликь, сибиль (Alburnus lucidus Heckel) во многихъ мъстахъ Малороссій.

Севрюта (Accipenser stellatus Pall.) во всей южной Россіи.

Cerpems (Lucioperca volgensis Cuv.) при устыв Дивира; ивстами называются секретами также небольшие судами.

Селедка (Clupea pontica Eichw.) по берегамъ Чернаго жоря.

Селкека = шамайки, въ Станиславъ.

Семза (Salmo labrax?) въ Севастополъ.

Сиковка, сикъ, сциколка (Cobitis taenia L.) во многихъ мъстахъ южной Россіи.

Синчиль (Mugil chelo Cuv.) у Крымскихъ грековъ.

Синьць, синыя, синыя (Abramis ballerus L.) во всей южной Россів.

Синець подкрыженый въ Никополь, шамая?

Синитка (Atherina) въ Евпаторія.

Сирмань, бычовъ-сирмань (Gobius Syrman Nordm.) въ Одессь.

Сирота, сиротка (Acerina rossica Cuv.) по Дивстру.

Скомбрія, скумбрія (Scomber scombrus L.) въ Одессь и въ Крыму.

Chopnions морской (Trachinus draco L.) въ Одессъ.

Скоть морской (Uranoscopus scaber L.) въ Судакъ.

Скубрія (Aspius clupeoides Pall.) въ Николанв и Вознесенска.

Смарида (Smaris chryselis Cuv.) въ Крыму.

Снитокъ, сиптокъ (Atherina) въ Севастополъ.

Собака морскай (Acanthias volgaris Risso.) по берегамъ Чернаго моря.

Собачка (Blennius) въ Одессв и въ Крыму.

Come (Silurus glanis L.) Bo Beet tomeof Poccin.

Conaus (Percarina Demidoffii Nordm.) въ Очаковъ и Николаевъ.

Спарусь (Sargus annularis Cuv.) у Крымскихъ грековъ.

Cmaspuda (Caranx trachurus L.) во Одессъ и въ Крыму.

Стерлядь, стерля (Accipenser ruthenus Patt.) по берегамъ Чернаго моря, по Дивиру и Дивстру.

Столбець, столбиикь (Gobio fluviatilis Cuv.) во многихъ мъстахъ южной Россіи.

Судакъ (Lucioperca sandra Cuv.) во всей южной Россіи.

Судакъ морской или лиманскій (Lucioperca marina Cuv.) въ Одессъ, Очаковъ, Станиславъ.

Сула судавъ, мъстами въ Малороссіи.

Султанка, султанъ-балыкъ (Mullus barbatus L.) въ Крыму.

Сухоребрица (Alburnus Baldneri Val.) въ Жванцъ на Диъстръ.

Таранникъ, лещь, который нерестится одновременно съ тарацью, (можеть быть Abramis Leuckartii Heckel). въ Никополъ.

Тарань, таранка (Leuciscus Heckelii Nordm.) при устью Днюпра; впрочемъ названіе тарани дають также во многихъ мюстахъ крупной библиць (Leuciscus rutilus).

Терновикъ, лещь, который трется въ то время, когда тернъ зацвътетъ.

Травянка мелкая кефаль, которая держится между морскою травою, въ Севастополъ.

Травяникъ, бычокъ-травяникъ, травиной бычокъ (Gobius ophioce-phalus Pall.) въ Севастополъ и Одессъ.

Тюлька (Alausa cultiven ris Nordin.) при устьяхъ Дивстра и Буга. Удотка — авдотка.

Уклея, уклейка (Alburnus) во многихъ мъстахъ южной Россіи.

Фать = хватъ, на Днъстръ.

Фиринка = атеринка, въ Одессъ.

Форель (Salar Ausonii Val.) въ Крыму.

Хамей (Engrands enerasicholus Cuv.) въ Крыму.

Хвать (Aspius гарах Ag.) по Дивстру въ Подольской губерніи. Въ Кієвской губерніи, на Роси, ложе названіе дактъ подусту.

Хемидонопсеронь (Trigia) у Крымских грек въ.

Цикунь (Cobits taensa L.) мьстами въ Подольской губерии.

Дуцикъ, бычокъ-цуцикъ (Gob us marmoratus l'all.) въ Одессъ.

Чебакь, о ень круппый лещь, во многихъ мъстихъ южнов Россіи.

Чернуха, чермоха, чермуха (Scardinus erythrophthalmus L.) почти во всей южной Россіи.

Чехонь, чеша (Pelecus cultratus Pall.) почти во всей южной Рессіи.

Yeuyra = стерлядь, при устьяхъ Днвпра и Днвстра, да и во мнотихъ другихъ мвстахъ.

Чоль (Aspro Zingel Bloch) по Дивстру въ Подольской губерній.

*Чопикъ* = м лодой судакъ, при устьяхъ Дивстра и Дивпра.

Чуларъ очень мелкая кефаль, въ Евпаторія.

Шабля, шабель (Pelecus cultratus Pall.) мъстами по Днъстру, въ Подольской губерніи.

Шамая, шамайка (Aspius clupeoides Pall.) въ Николаевъ.

**Шаранецъ, шаранъ, к**оропъ меньше 10 фунтовъ въсомъ, по низовьямъ Днъпра и Днастра.

Шеія (Alburnus lucidus Heckel) мъстами въ Подольской и Волынской губерніяхъ.

Щиповка (Cobitis taenia L.) во многихъ мъстахъ южной Россіи. Щука (Esox lucius L) во всей южной Россіи.

Щука морская (Belone rostrata Faber) мъстами при съверномъ берегу Чернаго моря.

Щупакъ тука, въ Подольской губерніи.

Юровикъ, лещь, который трется около Юрьева дня.

Явыкъ морской (Solea nasuta Pall.) въ Одессъ.

Явь (Idus melanotus Heck.) во всей южной Россіи.

Яльчикъ = елепъ.

## дополнительныя замътки.

Долгомъ считаю замътить, что рукопись моего путешествія была окончательно приготовлена къ печати еще весною 1800 года; но разныя обстоятельства, въ особенности же предпринятая мною, прошедшимъ лътомъ, поъздка за границу и заказъ рисунковъ въ Вънъ (у художника Стромайера, пріобръвшаго извъстность необыкновенною точностью въ изображеніи рыбъ), замедлили выходъ въ свътъ моего путешествія на цълый годъ. Пользуюсь этимъ замедленіемъ, чтобы прибавить здъсь, въ отношеніи къ нъкоторымъ изъ описанныхъ мною рыбъ, нъсколько дополнительныхъ замътокъ, основанныхъ на справкахъ, наведенныхъ мною въ Вънскомъ придворномъ Зоологическомъ музеъ.

- 1. Ръчной бычокъ, Gobius fluviatilis Pall., водится также въ ръкахъ Малой Азіи, впадающихъ въ Черное море. Онъ описанъ Беннетомъ, который нашелъ его въ одной ръкъ вблизи Трапезонда, подъ названіемъ Gobius sordidus (Proceedings of the Zool. Society. II. и Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte. 1836).
- 2. Gobius exanthematosus Pall по всей въроятности тождественъ съ Gobius limbatus Cuv. (Cuvier et Valenciennes, Poissons. XII. р. 26. fig. 344), но только описаніе и рисунокъ этого бычка въ сочиненіи Кювье очень неудовлетворительны.
- 3. Маленькій бычокъ, именуемый въ Одессь бланкетомъ и описанный мною подъ названіемъ Gobius pellucidus, уже прежде быль описанъ, подъ темь же названіемъ, Венеціанскимъ Зоологомъ Нардо (Nardo, Prospetto della Fauna marina volgare del veneto Estuario. 1847). Отъ вниманія Нардо ускользнуло однако то обстоятельство, что рыбка эта покрыта очень крупными, хотя и легко

спадающими чешуями; онъ считалъ ее совершенно голою. Экземпляры бланкета, сохраняемые въ Вънскомъ Зоологическомъ музев и происходящіе изъ Адріатическаго моря, имъютъ въ длину нъсколько болъе 2 дюймовъ, слъдовательно гораздо больше величиною, противъ нашихъ Одесскихъ.

4. Предположение мое, что верховодъ изъ Салгира, описанный мною подъ названиемъ Alburnus mentoides, легко можетъ быть тождественъ съ верховодомъ, описаннымъ Гекелемъ подъ названиемъ Alburnus mento, вполнъ оправдалось. Разсмотрънные мною Дунайские экземпляры постоянно имъли небольшую междужаберную кость, подобно Салгирскимъ, и вообще ни чъмъ не отличались отъ этихъ послъднихъ.


## ОБЪЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ.

- Таб. І. оиг. 1. Колюшка зеленая, Gasterosteus platygaster, въ натуральной величинъ.
- фиг. 2. Бычокъ-бланкетъ, Gobius pellucidus. у котораго чешуя спала; вт два раза увеличенъ.
- фиг. 3. Плотва-бобырецъ, Squalius borysthenicus, въ натуральной величинъ.
- оиг. 4. Вьюнъ выръзохвостый, Cobitis merga Kryn., въ натуральной величинъ.
- Таб. II. фиг. 1. Бычокъ-гонецъ, Gobius gymnotrachelus, въ натуральной величинъ.
- фиг. 1. а. Воронковидный брюшной плавникъ тойже рыбы.
- фиг. 2. Бычокъ-гордачъ, Gobius Trautvetteri, въ натуральной величинъ.
- фиг. 2. а. Воронковидный брюшной плавникъ тойже рыбы.
- Таб. III. Видъ Чатыръ-дага, изъ долины Салгира; къ стр. 151.
- Таб. IV. Видъ водопада въ лощинъ Кызиль-коба; къ стр. 125.
- Таб. V. Внутренность татарской избы въ селъ Біюкъ-янкой; къ стр. 158.

Последніе три вида рисованы съ природы И. С. Чекомъ.

## оглавленте.

$\mathbf{Bc}$	тупленіе					•		•		•		•		стр	).	1.
A.	Часть п	ервая.	Пу	теі	пес	тві	e	вдол	њ	свве	ерна	аго	бе	per	a	
	Чернаго	моря	, къ	yc	тья	TM.	Д	нфс	гра	, Б	yra	M	Диѣ	пра	ι.	3.
1.	Бълая Ц	ерьког	зь .							•		•		•		3.
2.	Вознесев	icrъ.	•		•			•			٠	٠		•	•	6.
3.	Одесса									•	•		•	•		12.
4.	Поъздка	въ А	ккер	Mae	ТЪ					•	•			•		47.
<b>5</b> .	Николае	въ.						•	•		•					<b>6</b> 0.
6.	Русская	ROCA I	и Ст	ан	ICJ.	авт	٠.					•	•			67.
<b>7</b> .	Херсонъ								•	•			•			<b>7</b> 3.
8.	Поъздка	въ Ал	ешк	И	•										•	82.
9.	Повадка	въ О	aro	въ												85.
10.	Берислав	въ.							•				•			101.
B.	Частьвто	орая. П	Гутег	130	тві	еп	οT	авр	иче	CRO	муі	104	yoc	гро	вј	<b>109</b> .
	Отъ Бер							-								109.
2.	Симферо	поль						•			•		•	•		112.
3.	Кызиль-в	гоба												•		123.
4.	Евпаторі	я.														127.
	Тарханъ-															137.
	Чатыръ-															149.
	Отъ Сим							толя	ι.					-		158.
	Севастоп	-										:=: 2		_		162.
	Монасты		Ге	opr	iя	и					_					185.
	Южный	_		_											•	190.
	Поъздка											•			•	203.
	Обратны	•								851			•		•	209
	воторыя	-									•	•	•	•		212.
	иложеніе						•	ინუ				DEI	бъ			212.
P																216.
кообразныхъ и моллюсковъ																
P	<b>уп</b> отреби												-		,	<b>236</b> .
Лог										LUC	OTH	• .		•	•	
Дополнительныя замётки												240.				



Joh Strohmayer gen u lich


.

.

.

.

.




Digitized by



. Druck v. Beiffenstein & Rosch.

.



Druck v. Reiffenstein & Bosch .



Druck v. Reiffenstein & Rösch.



